415

www.rcin.org.pl

v. 9.25.

J. Dickstein

3132

3132

www.rcin.org.pl

www.rcin.org.pl

ТЕОРІЯ СРАВНЕНІЙ.

СОЧИНЕНІЕ

П. Л. ЧЕБЫШЕВА,

АДЪЮНКТА ИМПЕРАТОРСКАГО С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА,

НЫНѢ ЗАСЛУЖЕННАГО ПРОФЕССОРА И ЧЛЕНА ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.

GABINET MATEMATYCZNY
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
L. inw. 1098

ВТОРОЕ ИЗДАНІЕ,

8003

въ пользу студенческой читальни при С.-Петербургскомъ Университетѣ.

TOWARZYSTWO NAUKOWE WARSZAWSKIE

GABINET MATEMATYCZNY
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Товарищества «Общественная Польза».
Большая Подъяческая, д. № 39.
1879.

www.rcin.org.pl

PAŃSTW. INSTYTUT MAT.
BIBLIOTEKA
5098
1628

G. M. T. 189.

www.rcin.org.pl

GABINET MATEMATYCZNY
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ.

По желанію автора Пафнутія Львовича Чебышева, бывшаго адъюнкта, нынѣ заслуженнаго профессора и ординарнаго академика, доходъ отъ этаго изданія «Теоріи сравненій» представляется въ пользу студентской читальни при С.-П.-Бургскомъ Университетѣ. —

Совѣтъ Университета ассигновалъ капиталъ въ шесть сотъ рублей на покрытіе расходовъ по изданію, чѣмъ и далъ возможность появиться въ свѣтъ столь необходимому руководству для занимающихся Теоріей Чиселъ.

С.-Петербургъ.
5 мая 1879 года.

Студентъ В. М—ій.

TOWARZYSTWO NAUKOWE WARSZAWSKIE

www.rcin.org.pl

ПРЕДИСЛОВІЕ АВТОРА КЪ ПЕРВОМУ ИЗДАНІЮ.

Не слѣдуя вполнѣ въ изложеніи Теоріи сравненій сочиненіямъ Лежандра: *Théorie des nombres* и Гаусса: *Disquisitiones arithmeticae*, я считаю необходимымъ объяснить причины, заставившія меня сдѣлать отступленія отъ этихъ превосходныхъ сочиненій двухъ великихъ Геометровъ. Для этого я войду въ нѣкоторыя подробности объ этихъ сочиненіяхъ и о современномъ имъ состояніи Теоріи чиселъ.

Эйлеромъ положено начало всѣхъ изысканій, составляющихъ общую часть Теоріи чиселъ. Въ этихъ изысканіяхъ Эйлеру предшествовалъ Ферматъ; онъ первый началъ заниматься изслѣдованіемъ свойствъ чиселъ въ отношеніи ихъ способности удовлетворять неопредѣленнымъ уравненіямъ того или другаго вида, и результатомъ его изысканій было открытіе многихъ общихъ теоремъ Теоріи чиселъ. Но изысканія этого Геометра не имѣли непосредственнаго вліянія на развитіе науки: его предложенія остались безъ доказательствъ и безъ приложеній. Въ этомъ состояніи открытія Фермата служили только вызывомъ Геометровъ на изысканія въ Теоріи чиселъ. Но не смотря на весь интересъ этихъ изысканій, до Эйлера на нихъ никто не вызывался. И это понятно: эти изысканія требовали не новыхъ приложеній пріемовъ уже извѣстныхъ и не новыхъ развитій пріемовъ, прежде употреблявшихся; эти изысканія требовали созданія новыхъ пріемовъ, открытія новыхъ началъ, однимъ словомъ основанія новой науки. Это сдѣлано было Эйлеромъ.

Между многими изысканіями Эйлера въ Теоріи чиселъ наиболѣе имѣли вліянія на успѣхъ этой науки изысканія его по слѣдующимъ двумъ предметамъ: 1) о степеняхъ чиселъ въ отношеніи остатковъ, получаемыхъ при дѣленіи ихъ на данное число и 2) о числахъ, представляющихъ сумму двухъ чиселъ, изъ

www.rcin.org.pl

которыхъ одно есть квадратъ, а другое произведеніе квадрата на данное число. Первыя положили основаніе теоріи указателей, сравненій двучленныхъ вообще и въ особенности теоріи квадратичныхъ вычетовъ; вторыя были началомъ теоріи квадратичныхъ формъ.

Основаніе теоріи указателей Эйлеръ положилъ мемуаромъ своимъ: *Demonstrationes circa residua ex divisione potestatum per numeros primos resultantia*, напечатаннымъ въ запискахъ нашей Академіи за 1773 годъ. Въ этомъ мемуарѣ онъ раскрылъ свойства указателей и первообразныхъ корней, показалъ высшій предѣлъ числа рѣшеній, допускаемыхъ сравненіями двучленными съ простымъ модулемъ и приложеніе теоріи указателей къ теоріи квадратичныхъ вычетовъ и квадратичныхъ формъ. Для совершенства теоріи указателей оставалось найти способъ опредѣленія первообразныхъ корней, не испытывая различныхъ чиселъ. Всѣ старанія Эйлера въ изысканіи этого были тщетны; онъ говоритъ: «*Via quidem adhuc non patet, tales radices primitivas pro quovis divisore primo inveniendi, neque etiam demonstratio, qua tales radices primitivas semper dari evici, methodum eas inveniedi declarat*» *). Но при всемъ успѣхѣ Теоріи чиселъ, мы до сихъ поръ находимъ первообразные корни, испытывая различныя числа, и теоремы, изложенныя мною во второмъ прибавленіи, едва ли не первый опытъ находить первообразные корни безъ предварительныхъ испытаній.

Изслѣдованія Эйлера о дѣлителяхъ чиселъ вида $a^n \pm b^n$ положили начало теоріи сравненій двучленныхъ. Эти изслѣдованія мы находимъ во многихъ мемуарахъ Эйлера; изъ нихъ особеннаго вниманія заслуживаетъ мемуаръ: *Theoremata circa divisores numerorum*. Здѣсь онъ показываетъ, что возможность удовлетворить сравненію $x^n - a \equiv 0 \pmod{mn+1}$, при $mn+1$ простомъ числѣ, предполагаетъ дѣлимость $a^m - 1$ на это число, и доказываетъ обратное, предполагая m и n простыми между собою. За исключеніемъ лишняго ограниченія m и n простыми между собою, эти теоремы суть основанія современной теоріи сравненій двучленныхъ вообще и въ особенности теоріи квадратичныхъ вычетовъ. Впрочемъ разсматривая у Эйлера доказа-

*) Op. min. col. томъ 1, стр. 523.

www.rcin.org.pl

тельство послѣдней теоремы, легко замѣтить распространеніе ея на случай m и n какихъ нибудь. Въ мемуарѣ: *De quibusdam eximiis proprietatibus circa divisores potestatum occurentibus* онъ особенно доказываетъ это для случая $m = 2$, не дѣлая никакихъ ограниченій относительно n, и показываетъ, что дѣлимость $a^n - 1$ на $2n + 1$ есть необходимое и достаточное условіе того, чтобы a было квадратичнымъ вычетомъ числа $2n+1$. Кромѣ того Эйлеръ, въ другихъ мемуарахъ, много занимался квадратичными вычетами, и въ *Observationes circa divisionem quadratorum per numeros primos*, разсматривая остатки, получаемые при дѣленіи квадратовъ на простыя числа, онъ вывелъ такое заключеніе:

Existente s numero quocunque primo, dividantur tantum quadrata imparia 1, 9, 25, 49, *etc. per divisorem* 4*s*, *notenturque residua, quae omnia erunt formae* $4q + 1$, *quorum quodvis littera* α *indicetur, reliquorum autem numerorum, formae* $4q + 1$, *qui inter residua non occurunt, quilibet littera* $\mathfrak{A}$ *indicetur, quo facto si fuerit*

divisor numerus primus formae	*tum est*
$4ns + \alpha$	+ *s residuum et* — *s residuum*
$4ns - \alpha$	+ *s residuum et* — *s non-residuum*
$4ns + \mathfrak{A}$	+ *s non-residuum et* — *s non-residuum*
$4ns - \mathfrak{A}$	+ *s non-residuum et* — *s residuum*

Это открытіе мы находимъ у Эйлера въ 1-мъ томѣ Opuscula Analytica, 1772 года. Не трудно въ немъ узнать законъ взаимности двухъ простыхъ чиселъ, обнародованный Лежандромъ въ 1785 году и положенный имъ въ основаніе теоріи квадратичныхъ вычетовъ.

Въ теоріи квадратичныхъ формъ Эйлеръ началъ свои изысканія съ суммы двухъ квадратовъ, и въ мемуарѣ: De numeris, qui sint aggregata duorum quadratorum доказалъ, что дѣлители суммы двухъ квадратовъ простыхъ между собою должны представлять подобную сумму, и вывелъ линейную форму этихъ дѣлителей. Такимъ образомъ онъ дошелъ до знаменитой теоремы Фермата о разложеніи простыхъ чиселъ вида $4m + 1$ на два квадрата. Подобнымъ образомъ Эйлеръ нашелъ квадра-

www.rcin.org.pl

тичныхъ и линейныхъ дѣлителей для квадрата, сложеннаго съ удвоеннымъ или утроеннымъ квадратомъ, и предложилъ безъ доказательства линейныя формы дѣлителей многихъ квадратичныхъ формъ. Такъ положилъ Эйлеръ основаніе теоріи дѣлителей квадратичныхъ формъ. Геніальныя открытія, сдѣланныя Лагранжемъ въ этой части Теоріи чиселъ, открыли путь Эйлеру къ новымъ изысканіямъ. Слѣдствіемъ ихъ было новое развитіе теоріи квадратичныхъ формъ со многими приложеніями ея къ изслѣдованію, что данное число простое или нѣтъ, и какъ можно найти простыя числа чрезвычайно большія.

Эйлеръ не ограничивался въ изысканіяхъ своихъ одними конечными формулами; онъ показалъ также, какимъ образомъ употребленіемъ рядовъ можно дойти до различныхъ предложеній Теоріи чиселъ. Сюда относятся изысканія его de partitione numerorum и о суммахъ дѣлителей различныхъ чиселъ.

Имѣя въ виду развитіе общей части Теоріи чиселъ, мы не будемъ останавливаться на изысканіяхъ Эйлера въ Анализѣ Діофанта, результатомъ которыхъ было рѣшеніе уравненій второй степени съ двумя неизвѣстными, изслѣдованіе уравненій вида $ax^2 + by^2 = cz^2$, доказательство невозможности нѣкоторыхъ уравненій съ двумя и тремя неизвѣстными и рѣшеніе многихъ неопредѣленныхъ уравненій весьма сложныхъ, и перейдемъ къ изысканіямъ Лагранжа, которымъ сдѣланы весьма важныя развитія въ общихъ началахъ Теоріи чиселъ. Сюда относятся изысканія его о числѣ рѣшеній, допускаемыхъ сравненіями съ простымъ модулемъ, и изслѣдованія свойствъ квадратичныхъ формъ. Мы видѣли, что Эйлеромъ найденъ высшій предѣлъ числа рѣшеній двучленныхъ сравненій; Лагранжъ доказалъ, что этотъ же предѣлъ будетъ при всякомъ числѣ членовъ. Этимъ открытіемъ Лагранжъ далъ возможность доказать многія предложенія Теоріи чиселъ, которыхъ доказательства прежде представляли непреодолимыя затрудненія. Къ числу такихъ предложеній должно отнести существованіе первообразныхъ корней для всѣхъ простыхъ чиселъ; доказательство, предложенное на это Эйлеромъ, основывается на свойствѣ двучленныхъ сравненій, которое могло быть строго доказано только послѣ открытія Лагранжа. Но изъ всѣхъ трудовъ Лагранжа въ Теоріи чиселъ

www.rcin.org.pl

наиболѣе имѣли вліянія на успѣхъ этой науки его изысканія о квадратичныхъ формахъ. Онъ далъ общія начала для тѣхъ изысканій, которыя сдѣланы были Эйлеромъ для не многихъ простѣйшихъ формъ, и эти начала, развитыя Лежандромъ, составили полную теорію дѣлителей квадратичныхъ формъ, одну изъ самыхъ главныхъ въ теоріи чиселъ и особенно важную по своимъ приложеніямъ къ опредѣленію дѣлителей даннаго числа.

Развитіе теоріи квадратичныхъ формъ, сдѣланное Лежандромъ, было слѣдствіемъ открытій его въ теоріи квадратичныхъ вычетовъ. Заключеніе, приведенное нами выше изъ сочиненія Эйлера: Observationes circa divisionem quadratorum per numeros primos содержитъ ту теорему, которая нынѣ извѣстна подъ именемъ закона взаимности двухъ простыхъ чиселъ и которой обязана своимъ успѣхомъ теорія квадратичныхъ вычетовъ. Въ запискахъ Парижской Академіи наукъ за 1785 годъ Лежандръ доказалъ ее на основаніи признаковъ возможности уравненія $ax^2+by^2=cz^2$, имъ же открытыхъ, и показалъ приложенія ея къ изслѣдованію сравненій второй степени и опредѣленію дѣлителей квадратичныхъ формъ.

Въ такомъ состояніи находились различныя части Теоріи чиселъ, когда Лежандръ написалъ сочиненіе свое: Essai sur la Théorie des nombres, изданное послѣ со многими прибавленіями, но безъ существенныхъ измѣненій въ системѣ изложенія главныхъ частей, подъ названіемъ Théorie des nombres. При всемъ развитіи отдѣльныхъ частей Теоріи чиселъ, систематическое изложеніе этой науки представляло непреодолимыя трудности. Мы видѣли, что законъ взаимности двухъ простыхъ чиселъ, служащій основаніемъ теоріи квадратичныхъ вычетовъ и вслѣдствіе того необходимый для теоріи квадратичныхъ формъ, выведенъ былъ Лежандромъ изъ свойствъ уравненій второй степени. Поэтому теорія квадратичныхъ вычетовъ и формъ могла быть изложена только послѣ предварительнаго изложенія теоріи неопредѣленныхъ уравненій второй степени, теоріи по предмету своему гораздо высшей и съ своей стороны представляющей приложеніе теоріи квадратичныхъ вычетовъ. Вслѣдствіе этого въ сочиненіи своемъ Лежандръ, послѣ предварительнаго изложенія различныхъ предложеній относительно чиселъ, начинаетъ

www.rcin.org.pl

съ рѣшенія неопредѣленныхъ уравненій, и только по изложеніи полной теоріи уравненій второй степени онъ приступаетъ къ *общимъ свойствамъ чиселъ*, гдѣ находимъ у него главныя предложенія Теоріи сравненій и полную теорію квадратичныхъ вычетовъ и квадратичныхъ формъ. Такой порядокъ въ изложеніи главныхъ частей Теоріи чиселъ, лишившій ее системы, оставался необходимымъ только до тѣхъ поръ, пока Гауссъ не показалъ, какимъ образомъ законъ взаимности двухъ простыхъ чиселъ можетъ быть выведенъ непосредственно изъ разсматриванія сравненій. Такъ открылась возможность, не нарушая естественнаго порядка въ главныхъ частяхъ Теоріи чиселъ, изложить сравненія второй степени вмѣстѣ съ другими сравненіями прежде уравненій второй степени, и потомъ, на основаніи результатовъ Теоріи сравненій, упроститъ изслѣдованіе уравненій высшихъ степеней.

Обращаемся теперь къ сочиненію Гаусса. Мы видѣли, какія развитія сдѣланы были въ различныхъ частяхъ Теоріи чиселъ трудами Эйлера, Лагранжа и Лежандра. Но Гауссъ въ сочиненіи своемъ: Disquisitiones arithmeticae не пользовался изысканіями этихъ Геометровъ. Онъ независимо отъ нихъ развилъ главныя части Теоріи чиселъ, обогативъ ее новыми пріемами, многими открытіями и весьма важными приложеніями къ рѣшенію двучленныхъ уравненій. Но при всемъ достоинствѣ сочиненія Гаусса мы не можемъ не признать, что большая часть его выводовъ лишена той простоты, которою отличаются пріемы Эйлера, Лагранжа и Лежандра. Въ этомъ отношеніи его изложеніе отдѣльныхъ частей Теоріи чиселъ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ, нельзя предпочесть изложенію Лежандра.

Изъ этого видно, что ни сочиненіе Лежандра, ни сочиненіе Гаусса не представляютъ Теоріи чиселъ въ томъ совершенномъ видѣ, въ которомъ она можетъ быть изложена послѣ развитій, сдѣланныхъ въ ней трудами этихъ Геометровъ, а тѣмъ болѣе послѣ изысканій Геометровъ позднѣйшихъ. Поэтому въ изложеніи Теоріи сравненій я долженъ былъ руководствоваться не однимъ Лежандромъ и не однимъ Гауссомъ, но вмѣстѣ и Лежандромъ и Гауссомъ и многими другими, занимавшимися этою частью Теоріи чиселъ. Но чтобы привести въ систему

www.rcin.org.pl

изысканія Геометровъ, употреблявшихъ пріемы весьма разнообразные, я долженъ былъ измѣнить большую часть ихъ выводовъ. Кромѣ того для полноты системы я нашелъ необходимымъ развить нѣкоторыя статьи. Такъ въ теоріи сравненій 1-й степени я разсматриваю отдѣльно три случая, когда это сравненіе имѣетъ одно рѣшеніе, нѣсколько и не имѣетъ ни одного. Излагая свойства сравненій высшихъ степеней, предлагаю относительно ихъ нѣсколько общихъ теоремъ, кромѣ теоремы Лагранжа. Въ теоріи квадратичныхъ формъ показываю средство узнавать, когда двѣ квадратичныя формы дѣлителей приводятся къ однимъ линейнымъ формамъ. Кромѣ того въ сочиненіи моемъ находится три прибавленія. Въ первомъ я излагаю распространеніе знакоположенія Лежандра, сдѣланное Якоби, и показываю приложеніе этого къ изслѣдованію квадратичныхъ вычетовъ; во второмъ я доказываю теоремы, опредѣляющія первообразный корень нѣкоторыхъ чиселъ по ихъ виду; въ третьемъ я предлагаю результаты своихъ изысканій относительно свойствъ функціи, опредѣляющей, сколько простыхъ чиселъ не превосходятъ данной величины.

---

www.rcin.org.pl

ОГЛАВЛЕНІЕ.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЯ ПОНЯТІЯ.

1. Предметъ Теоріи чиселъ и Теоріи сравненій 1
2. О числахъ абсолютно простыхъ 2
3. О числахъ относительно простыхъ 3
4. Свойства чиселъ относительно простыхъ . . . . . —
5. О разложеніи чиселъ на простые множители 5
6. Теоремы на этомъ основанныя 6
7. О числахъ, составляющихъ ариѳметическую прогрессію 11

ГЛАВА I.

О сравненіи вообще.

8. Понятіе о сравненіи 17
9. О свойствахъ сравненія чиселъ между собою 19
10. О рѣшеніи сравненій 23
11. О наименьшихъ вычетахъ . . . . . —
12. О числѣ рѣшеній сравненія 26

ГЛАВА II.

О сравненіи первой степени.

13. Рѣшеніе этихъ сравненій при модулѣ простомъ съ коэффиціентомъ неизвѣстнаго 29
14. Теоремы Фермата и Эйлера 30
15. Приложеніе этихъ теоремъ къ рѣшенію 1-й степени 34
16. О сравненіяхъ, въ которыхъ модуль и коэффиціентъ неизвѣстнаго имѣютъ общаго дѣлителя 36

ГЛАВА III.

О сравненіяхъ высшихъ степеней вообще.

17. Освобожденіе отъ коэффиціента высшей степени неизвѣстного . . 40
18. Высшій предѣлъ числа рѣшеній 42
19. Приложеніе этого къ доказательству теоремы Вильсона и другихъ свойствъ чиселъ 45
20. Приведеніе сравненій къ виду, въ которомъ степень его меньше модуля 49
21. Признакъ, по которому узнаемъ, что сравненіе имѣетъ столько рѣшеній, сколько единицъ въ показателѣ его 50

www.rcin.org.pl

ГЛАВА IV.

О сравненіяхъ второй степени.

22. Приведеніе полныхъ сравненій второй степени къ сравненію вида $z^2 \equiv q \pmod{p}$ 54
23. О числѣ рѣшеній сравненія $z^2 \equiv q \pmod{p}$ 58
24. О символѣ $\left(\frac{q}{p}\right)$ 59
25. Свойства этого символа 61
26. Выраженія его опредѣляющія; слѣдствія ихъ: 1) $\left(\frac{2}{p}\right)$, 2) законъ взаимости двухъ простыхъ чиселъ 66
27. Способъ находить значеніе $\left(\frac{q}{p}\right)$ 78
28. Рѣшеніе уравненій: $\left(\frac{x}{p}\right) = 1, \left(\frac{x}{p}\right) = -1$ 81
29. Рѣшенія сравненія $z^2 \equiv q \pmod{p}$, при p простомъ вида $4n+3$. 85
30. О сравненіи $z^2 \equiv q \pmod{p}$ при p составномъ. 86

ГЛАВА V.

О сравненіяхъ двучленныхъ.

31. О сравненіи $x^m - 1 \equiv 0 \pmod{p}$, при p простомъ 91
32. О сравненіи $x^m - A \equiv 0 \pmod{p}$ при p простомъ. 96
33. О сравненіи $x^m - A \equiv 0 \pmod{p}$ при p составномъ 102

ГЛАВА VI.

О сравненіяхъ вида $a^x - A \equiv o \pmod{p}$.

34. О сравненіи $a^x \equiv A \pmod{p}$ вообще и въ особенности о сравненіи $a^x \equiv 1 \pmod{p}$ 106
35. О рѣшеніяхъ сравненія $a^x \equiv A \pmod{p}$ 109
36. Объ указателяхъ. 111
37. О рѣшеніи двучленныхъ сравненій помощію таблицъ указателей. 115
38. Теоремы для опредѣленія первообразныхъ корней 120
39. Опредѣленіе первообразныхъ корней 122
40. Другой способъ опредѣленія первообразныхъ корней. 123
41. О числѣ первообразныхъ корней. 128

ГЛАВА VII.

О сравненіяхъ второй степени съ двумя неизвѣстными.

42 О сравненіи $x^2 + Ay^2 + B \equiv 0 \pmod{p}$. 131
43. О дѣлителяхъ $x^2 \pm Ay^2$. 133
44. Опредѣленіе дѣлителей $x^2 \pm Ay^2$ при A простомъ 141
45. О свойствахъ квадратичныхъ формъ. 150
46. О выраженіи ими дѣлителей $x^2 \pm ay^2$ 155
47. Опредѣленіе линейныхъ дѣлителей помощію квадратичныхъ формъ. 162

www.rcin.org.pl

ГЛАВА VIII.

Приложеніе Теоріи сравненій къ разложенію чиселъ на простые множители.

48. Разложеніе чиселъ на простые множители приводится къ опредѣленію дѣлителей 174
49. Опредѣленіе дѣлителей чиселъ вида $a^m \pm 1$ 175
50. Опредѣленіе дѣлителей чиселъ на основаніи теоріи дѣлителей $x^2 \pm ay^2$ 178

ПРИБАВЛЕНІЯ.

I. О квадратичныхъ вычетахъ 189
II. Объ опредѣленіи первообразныхъ корней 197
III. Объ опредѣленіи числа простыхъ чиселъ, не превосходящихъ данной величины. 203

Таблицы.

1) Простыхъ чиселъ до 6000 1
2) Указателей и первообразныхъ корней для простыхъ модулей, не превосходящихъ 200. 3
3) Линейныхъ дѣлителей $x^2 + ay^2$ отъ $a = 1$ до $a = 101$. 19
4) Линейныхъ дѣлителей $x^2 - ay^2$ отъ $a = 1$ до $a = 101$. 23

www.rcin.org.pl

ОПЕЧАТКИ

следуетъ читать:

стран. 35	стр. 32	$aba^{n-1}-b\equiv 0 \pmod{N}$
» 36	» 18	$x\equiv 7.2^{3.5\frac{3-1}{3}\cdot\frac{5-1}{5}} \pmod{15}$
» 37	» 13	$x\equiv\alpha+\frac{(d-1)p}{d} \pmod{p}$
» —	» 23	$\frac{a}{d}, \frac{p}{d}$
» 38	» 5	$x\equiv\alpha \left(\text{мод. } \frac{p}{d}\right)$
» —	» 24	$x=\alpha-N\frac{p}{d}$
» 42	» 17	$m-1$
» 45	» 10	$\ldots. (x-\overline{p-1})-x^{p-1}+1$
» 47	» 16	то
» 67	» 23	$z\equiv -a \pmod{p}$
» 68	» 1	$z=\frac{1}{2}p\left(1+E\frac{2a}{p}\right)-a$
» 70	» 6	$1, 2, \ldots, \frac{p-1}{2}$
» 73	» 5	$\left(\frac{a}{p}\right)=(-1)^{E\frac{a}{p}+\ldots+E\frac{\frac{1}{2}(p-1)a}{p}}$
» 74	» 6	$(-1)^{\frac{a-1}{2}\cdot\frac{p-1}{2}-\ldots.-E\frac{\frac{1}{2}(a-1)p}{2}}$
» —	» 19	$\frac{a-1}{2}$
» —	» 21	$\frac{a-1}{2}$
» —	» 23	$\frac{a-1}{2}$
» 76	» 21	$\left(\frac{a}{p}\right)=(-1)^{\frac{a-1}{2}\cdot\frac{p-1}{2}}$
» 81	» 14	имѣетъ $\frac{p-1}{2}$ рѣшеній; для этого, по сказанному въ § 21, дѣлимъ x^p-x на $x^{\frac{p-1}{2}}$ и, замѣчая, что
» 85	» 5	$a_1, a_2, \ldots. a_{\frac{p-1}{2}}$
» 87	» 5	a

www.rcin.org.pl

стран.	88	стр. 23	$x^2 \equiv q$ (*мод.* α^m)
»	98	» 17	$x^\omega \equiv A^\pi$ (*мод.* p)
»	105	» 1	30-й
»	107	» 19	кратное α
»	108	» 26	α
»	110	» 2	α
»	—	» 19	$a^{x-\lambda} \equiv 1$ (*мод.* p)
»	—	» 20	дѣлимость $\overline{x-\lambda}$ на α. Полагая же частное отъ дѣленія $\overline{x-\lambda}$ на α равнымъ a, находимъ
»	131	» 9	получаемъ 16
»	133	» 26	$U^2+A \equiv 0$ (*мод.* p)
»	137	» 17	$= \left(\frac{-A}{\alpha}\right) (-1)^{\frac{\alpha-1}{2}\cdot\frac{A+1}{2}}$
»	138	» 17	$\left(1+2\frac{\gamma-1}{2}\right)$
»	—	» 20	$\frac{\alpha-1}{2}+$
»	151	» 7	равныхъ.
»	165	» 22	$a\,(au^2+2buv+cv^2) \equiv$
»	167	» 3	$4dz+r_1$, $4dz+d+r_1$,
»	—	» 31	$4dz+r_1$, $4dz+d+r_1$,
»	174	» 18	a, c, $a+2b+c$,
»	175	» 3	то дѣлить A на α
»	—	» 33	a^m-1
»	176	» 2 и 9	$a^\omega - 1$
»	—	» 22	$2N+1$
»	177	» 22	такъ представлено:
»	178	» 23	$a^{2n+1}+1$ на p
»	178	» 26 и 29	$2^{2^n}+1$
»	179	» 3	$2^{2^n}+1$
»	—	» 23	193, 257,...
»	180	» 24	$3.3337 = 100^2+11$,
»	181	» 15	$d_{n+1} = d_{n-1}+$
»	—	» 31	$\sqrt{A-d_{n-1}}\,d_{n-2} = x_{n-2}$,
»	182	» 2	$x^2{}_2 - A = -d_3\,d_2$
»	—	» 8	$(x_2+\sqrt{A})\,(x_2-\sqrt{A}) = -d_3\,d_2$
»	—	» 29	$= (-1)^{\alpha} Z_\alpha{}^2\, d_\alpha$,
»	184	» 20	$d_9 = 4523$
»	—	» 26	$d_5 = 2.5.263$
»	—	» 29	$d_{16} = 2.5.11^2$

www.rcin.org.pl

стран. 185	стр. 1		$d_6,\ d_{10},\ d_{16},\ d_{10}\ d_{16},\ d_6\ d_{10}\ d_{16},\ d_2\ d_{16},\ d_4\ d_6\ d_{10}\ d_{16}.$
» 187	» 8		при перемѣнномъ u
» 190	» 18		$\left(\frac{a'\ a''\ldots}{\alpha}\right)\left(\frac{a'\ a''\ldots}{\beta}\right)\left(\frac{a'\ a''\ldots}{\gamma}\right)\ldots =$
» 200	» 5		$x^{8n+6} \equiv 1$ (*мод.* $8n+7$)
» 201	» 6		$3.5 \equiv 0$ (*код.* 4 N+1)
» 205	» 17		$-\log\left(1-\frac{1}{2^{1+\rho}}\right)-$
» 206	» 24		$\frac{1}{\mu^s\left(1-\frac{1}{\mu^{1+\rho}}\right)^r},$
» 209	» 3, 4, 9, 16 и 18		$\frac{\alpha x}{\log^n x}$
» 210	» 11		$\left[\varphi(a+1)-\int_2^{a+1}\frac{dx}{\log x}\right]$
» 211	» 2		x не $< a+1$
» —	» 8		$\left(1-\frac{n}{\log a}\right)$
» —	» 10		$\sum_{x=a+1}^{x=s}$
» —	» 16		$x^\rho\ dx$
» 212	» 23, 24 и 25		$\frac{\alpha x}{\log^n x}$
» 213	» 3		$\frac{\alpha x}{\log^n x}$
» 214	» 1		съ которою функція $\varphi(x)$,
» 216	» 10		$\int_2^x \frac{dx}{\log x}$
» —	» 11		$\int_2^x \frac{dx}{\log x} =$
» 217	» 25		$kx^{m'}.\log^{m''}x.e^{m'''\ x},$
» —	» 28		$u_0 y^m + u_1 y^{m-1} + \ldots + u_{m-1} y + u_m = 0,$
» 221	» 6		$\sum_{x=2}^{x=\lambda-1}\frac{\varphi(x+1)-\varphi(x)}{x}$
» 222	» 19		$+\log\left(1-\frac{1}{x}\right)$

www.rcin.org.pl

GABINET MATEMATYCZNY
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

Теорія сравненій.

Предварительныя понятія.

§ 1. Теорія чиселъ, иначе называемая Трансцендентною Ариѳметикою, есть наука о рѣшеніи неопредѣленныхъ уравненій въ числахъ цѣлыхъ. Заимствуя понятіе о числахъ изъ Ариѳметики и объ уравненіяхъ изъ Алгебры и Трансцендентнаго Анализа, она въ тоже время существенно отлична отъ этихъ наукъ. Она отличается отъ Ариѳметики тѣмъ, что разсматриваетъ числа только въ отношеніи ихъ способности удовлетворять неопредѣленнымъ уравненіямъ того или другаго вида, и слѣд. остается независимою отъ системы нумераціи, на которой основываются дѣйствія Ариѳметики. Она отличается отъ Алгебры и другихъ частей опредѣленнаго анализа тѣмъ, что, разсматривая уравненія, она ограничивается только цѣлыми значеніями неизвѣстныхъ.

Разсматривая такимъ образомъ и числа и уравненія съ особенной точки зрѣнія, Теорія чиселъ доходитъ до результатовъ совершенно новыхъ и весьма важныхъ для Ариѳметики и Теоріи опредѣленныхъ уравненій. Первой она облегчаетъ выкладки, по огромности своей, невыполнимыя безъ ея помощи; второй она открываетъ путь къ рѣшенію вопросовъ, безъ помощи ея, не разрѣшимыхъ.

www.rcin.org.pl

Всякое уравненіе, заключающее нѣсколько перемѣнныхъ, подлежитъ изслѣдованію Теоріи чиселъ. Но не всѣ они одинаково доступны изслѣдованію и не всѣ они имѣютъ одинакую важность по приложеніямъ своимъ. Теорія чиселъ до сихъ поръ ограничивается только разсмотрѣніемъ уравненій наиболѣе простыхъ и въ тоже время имѣющихъ наиболѣе важныя приложенія. Изъ этихъ уравненій особеннаго вниманія заслуживаютъ тѣ, которыя заключаютъ одно изъ неизвѣстныхъ въ первой степени; они замѣчательны какъ по свойствамъ своимъ, такъ и по приложеніямъ къ упрощенію дѣйствій Ариѳметики и рѣшенію вопросовъ, касающихся опредѣленнаго анализа. Эти то уравненія составляютъ предметъ изслѣдованія Теоріи сравненій.

§ 2. Прежде чѣмъ приступимъ къ изслѣдованію этихъ уравненій, мы остановимся на свойствахъ чиселъ, извѣстныхъ намъ частію изъ Ариѳметики, и изложимъ ихъ съ надлежащею подробностію.

Всѣ числа раздѣляются на два рода: простыя и составныя. Простымъ называется такое число, которое можетъ дѣлиться только на 1 и самаго себя. Составнымъ называется такое число, которое можетъ дѣлиться на другое число, бо̀льшее 1. Такъ 2, 3, 5, 7, 11 и проч. суть числа простыя, а 4, 6, 8, 9, 10 и проч. суть числа составныя.

Не трудно убѣдиться въ томъ, что простыхъ чиселъ безконечное множество. Въ самомъ дѣлѣ, допустивши противное и называя черезъ N наибольшее изъ простыхъ чиселъ, мы должны допустить, что всѣ числа бо̀льшія N суть составныя и слѣд. происходятъ отъ перемноженія 2, 3, 5, 7, 11, ... N, взятыхъ въ нѣкоторыхъ степеняхъ. Но несправедливость этого обнаруживается числомъ 1. 2. 3. 4. 5 ....(N—1). N+1, которое, очевидно, не дѣлится на числа 2, 3, 5, 7, 11 .... N и слѣд. перемноженіемъ ихъ степеней не можетъ быть составлено. Итакъ нельзя допустить, чтобы простыхъ чиселъ было не безконечное множество.

Для опредѣленія всѣхъ простыхъ чиселъ, меньшихъ даннаго предѣла N, самый простой способъ состоитъ въ томъ, чтобы въ ряду:

www.rcin.org.pl

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,..., N—1, N,

ыкидывать послѣдовательно числа кратныя 2, 3, 5, 7,..... и т. д. А это, очевидно, можетъ быть выполнено зачеркиваніемъ въ ряду:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,..... N—1, N,

чиселъ чрезъ 1, считая отъ 2,—черезъ 2, считая отъ 3,—черезъ 4, считая отъ 5, и вообще черезъ $n-1$ чиселъ считая отъ числа n. Такимъ образомъ въ этомъ ряду исключатся всѣ числа составныя и останутся однѣ лишь простыя числа.

§ 3. Два или нѣсколько чиселъ называются относительно простыми, если они не имѣютъ общаго множителя. Такъ числа 10 и 21 суть относителъно простыя. Изъ сказаннаго нами о числахъ, относительно простыхъ, слѣдуетъ, какъ частный случай, что если A, будучи само по себѣ простымъ числомъ, не дѣлитъ B, то A и B суть числа относительно другъ друга простыя. Въ самомъ дѣлѣ, въ этомъ случаѣ числа A и B не могутъ имѣть общимъ дѣлителемъ: 1-е) ни числа отличнаго отъ 1; ибо A будучи простымъ числомъ не можетъ дѣлиться на другое число, 2 е) ни самаго A; ибо B, по положенію, на A не дѣлится. Замѣчая, что если B меньше A, то B на A дѣлиться не можетъ, мы по предыдущему заключаемъ, что, при B меньшемъ A и A простомъ, числа B и A будутъ относительно другъ друга простыя. Это свойство чиселъ можетъ быть выражено такъ: «всякое число, мéньшее даннаго простаго числа, есть относительно его простое число». Такъ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, суть простыя относительно 11.

Отсюда не трудно вывѣсть такое заключеніе:

Два числа не равныя между собою и само по себѣ простыя суть относительно другъ друга простыя.

§ 4. Мы теперь займемся изліженіемъ свойствъ чиселъ относительно простыхъ.

1. **Теорема.** *Если A и B суть числа простыя относительно S, то и произведеніе ихъ AB есть число простое относительно S.*

*

www.rcin.org.pl

Доказательство. Для доказательства этой теоремы ищемъ общаго наибольшаго дѣлителя чиселъ A и S. Для этого, какъ извѣстно изъ Ариѳметики, должны A дѣлить на S; полученнымъ при этомъ остаткомъ должны дѣлить S; новымъ остаткомъ дѣлить первый остатокъ и т. д. Послѣдній остатокъ будетъ 1: ибо A и S, какъ числа относительно простыя, общаго дѣлителя имѣть не могутъ. Если же мы изобразимъ черезъ $q, q_1, q_2, \ldots q_n$ частныя, получаемыя при этихъ дѣленіяхъ, а черезъ r, r_1 r_2, ... r_{n-2}, r_{n-1}, r_n—остатки; то, приравнивая дѣлимое произведенію дѣлителя на частное, сложенному съ остаткомъ, и замѣчая, что послѣдній остатокъ r_n равенъ 1, получаемъ такія уравненія:

$$A=Sq+r,\ S=rq_1+r_1,\ r=r_1q_2+r_2 \ldots\ldots\ldots\ldots r_{n-2}=r_{n-1}\,q_n+1,$$

которыя, по умноженіи на B, дадутъ:

$$(1)\ldots AB=BSq+Br,\ BS=Brq_1+Br_1,\ Br=Br_1q_2+Br_2,\ \ldots\ldots\ldots$$
$$\ldots\ldots Br_{n-2}=Br_{n-1}q_n+B.$$

Первое изъ этихъ уравненій показываетъ, что общій дѣлитель AB и S будетъ дѣлить Br, второе,—что этотъ дѣлитель будетъ дѣлить Br_1, третье,—что онъ будетъ дѣлить Br_2, и т. д., наконецъ послѣднее,—что общій дѣлитель AB и S будетъ дѣлить B. Но B и S, по положенію, не имѣютъ общаго дѣлителя; слѣд. не имѣютъ его AB и S, что и слѣдовало доказать.

Распространяя эту теорему на нѣсколько простыхъ чиселъ относительно $S_0, S_1, S_2, \ldots$, мы убѣждаемся, что числа $ABCD.\ldots$ и $S_0S_1S_2\ldots.$ суть относительно другъ друга простыя, если $A, B, C, D, \ldots.$ всѣ суть числа простыя относительно каждаго изъ чиселъ $S_0, S_1, S_2, \ldots.$

2. **Теорема.** *Если S, будучи простымъ числомъ относительно A, дѣлитъ произведеніе AB, то оно дѣлитъ и B.*

Доказательство. Для доказательства этой теоремы мы выводимъ уравненія (1) и изъ этихъ уравненій замѣчаемъ, что дѣлимость AB на S предполагаетъ дѣлимость на S чиселъ Br, Br_1, Br_2,... и наконецъ дѣлимость B, что и слѣдовало доказать.

3. **Теорема.** *Если изъ двухъ чиселъ A и B, простыхъ между собою, каждое дѣлитъ S, то и произведеніе ихъ AB дѣлитъ S.*

www.rcin.org.pl

Доказательство. Называя черезъ L частное отъ дѣленіи S на A, мы для опредѣленія величины S будетъ имѣть.

$$S = AL;$$

откуда слѣдуетъ дѣлимость AL на B: ибо, по положенію, S дѣлится на B. Но, по предыдующей теоремѣ, дѣлимость AL на B, гдѣ B число простое съ A, предполагаетъ дѣлимость L на B. Называя же черезъ M число, получаемое при этомъ дѣленіи, мы будемъ имѣть

$$L = BM;$$

вслѣдствіе чего предыдущее уравненіе дастъ

$$S = ABM;$$

откуда ясно видна дѣлимость S на AB, что и слѣдовало доказать.

Распространяя эту теорему на нѣсколько чиселъ, мы заключаемъ, что S дѣлится на $ABCD\ldots$, если оно дѣлится на каждое изъ чиселъ A, B, C, D,.... и числа A, B, C, D.... простыя между собою.

§ 5. Мы приступимъ теперь къ разсмотрѣнію свойствъ чиселъ, обнаруживающихся при ихъ разложеніи на простые множители.

Извѣстно изъ Ариѳметики, что всякое число можетъ быть разложено на произведеніе простыхъ чиселъ. Означая черезъ α, β, γ,.... различныя простыя числа, входящія въ составъ N, и черезъ m, n, p,.... степени ихъ, мы будемъ имѣть

$$N = \alpha^m \beta^n \gamma^p \ldots.$$

Изъ этого уравненія, на основаніи 1-й теоремы, мы заключаемъ, что N есть простое число относительно всѣхъ чиселъ простыхъ само по себѣ и отличныхъ отъ α, β, γ,.... Въ самомъ дѣлѣ, по § 3, всякое простое число, отличное отъ α, β, γ, ... будетъ также простымъ относительно α, β, γ,.... и слѣд. относительно его будетъ простымъ числомъ произведеніе $\alpha^m\beta^n\gamma^p$ .... Отсюда мы можемъ заключить вообще, что всякое число не можетъ дѣлиться на простое число, въ составъ его не входящее. Чтоже касается до дѣлимости N, которое мы предполо-

www.rcin.org.pl

жили равнымъ $\alpha^m\beta^n\gamma^p\ldots.$, на степени чиселъ $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$ въ составъ его входящихъ, то также не трудно убѣдиться, что оно не можетъ дѣлиться на $\alpha^{m'}$ при $m' > m$, на $\beta^{n'}$ при $n' > n$ и т. д. Въ самомъ дѣлѣ, такъ какъ къ $N=\alpha^m\beta^n\gamma^p\ldots.$; то частное отъ дѣленія N на $\alpha^{m'}$ представится дробью

$$\frac{\alpha^m\beta^n\gamma^p\ldots..}{\alpha^{m'}}, \text{ или } \frac{\beta^n\gamma^p\ldots..}{\alpha^{m'-m}},$$

что, при $m' > m$, не можетъ быть числомъ цѣлымъ; ибо α, будучи числомъ простымъ отличнымъ отъ $\beta, \gamma, \ldots$, по замѣченному нами, дѣлить $\beta^n\gamma^p\ldots.$ не можетъ. Итакъ N можетъ дѣлиться только на степени $\alpha, \beta, \gamma\ldots.$, не превосходящія m, n, p, и слѣд. число N можетъ дѣлиться только на числа, въ составъ которыхъ входятъ однѣ простыя числа $\alpha, \beta, \gamma, \ldots.$ и въ степеняхъ, непревосходящихъ $m, n, p, \ldots.$ Такимъ образомъ доходимъ мы до слѣдующей теоремы:

4. **Теорема.** *Число N можетъ дѣлиться на число P только въ томъ случаѣ, когда всѣ простыя множители числа P входятъ въ составъ N и въ N степени ихъ не ниже, чѣмъ въ P.*

На основаніи этой теоремы не трудно доказать слѣдующую:

5. **Теорема.** *Для числа N возможно одно только разложеніе на простые множители.*

Доказательство. Въ самомъ дѣлѣ, если мы допустимъ для числа N два разложенія на простые множители, такъ:

$$N=\alpha^m\beta^n\gamma^p\ldots., \quad N=\alpha_1{}^{m'}\beta_1{}^{n'}\gamma_1{}^{p_1}\ldots..;$$

то, дѣля эти уравненія одно на другое, найдемъ

$$\frac{\alpha^m\beta^n\gamma^p\ldots...}{\alpha_1{}^{m'}\beta_1{}^{n'}\gamma_1{}^{p_1}\ldots.}=1, \quad \frac{\alpha_1{}^{m'}\beta_1{}^{n'}\gamma_1{}^{p'}\ldots.}{\alpha^m\beta^n\gamma^p\ldots...}=1.$$

Первое изъ этихъ уравненій, по предъидущей теоремѣ, предполагаетъ, что всѣ числа $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \ldots.$ находятся въ ряду чиселъ $\alpha, \beta, \gamma, \ldots..$, а второе обратно, что всѣ числа $\alpha, \beta, \gamma,$

www.rcin.org.pl

.... находятся въ ряду α_1, β_1, γ_1, ...; откуда слѣдуетъ, что числа α, β, γ, ... и α_1, β_1, γ_1, ... суть однѣ и тѣ-же. Принимая же $\alpha=\alpha_1$, $\beta=\beta_1$, $\gamma=\gamma_1$, ..., мы, по предъидущей теоремѣ, изъ уравненія

$$\frac{\alpha^m \beta^n \gamma^p \ldots\ldots}{\alpha_1{}^{m'} \beta_1{}^{n'} \gamma_1{}^{p'} \ldots.} = 1$$

имѣемъ

$$m' \text{ не } > m,\ n' \text{ не } > n,\ p' \text{ не } > p, \ldots.;$$

Подобнымъ образомъ уравненіе

$$\frac{\alpha_1{}^{m'} \beta_1{}^{n'} \gamma_1{}^{p'} \ldots.}{\alpha^m \beta^n \gamma^p \ldots\ldots} = 1$$

предполагаетъ

$$m \text{ не } > m',\ n \text{ не } > n',\ p \text{ не } > p', \ldots..$$

Изъ соединенія же этихъ неравенствъ съ предъидущими находимъ

$$m=m',\ n=n',\ p=p', \ldots..$$

Итакъ разсматриваемыя нами два разложенія числа N не разнятся между собою ни простыми числами, ни степенями ихъ: откуда и слѣдуетъ предложенная нами теорема.

§ 6. Разложеніемъ чиселъ на простые множители легко доказать слѣдующіи теоремы:

6. **Теорема**. *Если N дѣлитъ квадратъ числа M и не можетъ дѣлиться на квадратъ какого-либо числа, то N дѣлитъ также M.*

Доказательство. Разложеніемъ числа N на простые множители мы находимъ.

$$N=\alpha^m \beta^n \gamma^p \ldots..$$

Но такъ какъ N, по положенію, не можетъ дѣлиться на квадратъ какого либо числа, то здѣсь показатели m, n, p, ... не могутъ превосходитъ 1; ибо въ противномъ случаѣ, при m не < 2, число N, очевидно, дѣлилось бы на α^2, при n не < 2, оно дѣлилось бы на β^2, и т. д. Слѣд. въ предыдущемъ уравненіи всѣ показатели m, n, p, ... равны 1; а потому

$$N=\alpha\beta\gamma\ldots..$$

GABINET MATEMATYCZNY Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

www.rcin.org.pl

гдѣ $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$ простыя числа, различныя между собою. Убѣдясь въ этомъ, разлагаемъ M на простые множители; это даетъ намъ

$$M=\alpha_1^{m'}\beta_1^{n'}\gamma_1^{p'}\ldots\ldots\ldots(2),$$

гдѣ $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \ldots$ различныя простыя числа. Изъ этаго уравненія мы выводимъ

$$M^2=\alpha_1^{2m'}\beta_1^{2n'}\gamma_1^{2p'}\ldots\ldots,$$

и, замѣчая, что, по положенію, M^2 дѣлится на N, гдѣ $N=\alpha\beta\gamma\ldots$, мы, по теоремѣ 4-й, заключаемъ, что въ ряду $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \ldots$, заключаются всѣ числа $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$ и что степени ихъ въ составѣ M^2 не суть O. Слѣд. всѣ числа $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$ входятъ въ составъ M и слѣд. M дѣлится на $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$ и вмѣстѣ съ тѣмъ (см. теорему 3) дѣлится и на произведеніе ихъ, равное N, что и слѣдовало доказать.

Такъ замѣчая, что 15 не можетъ дѣлиться на квадратъ какого либо числа и что оно дѣлить 45^2, равное 2025, мы заключаемъ, что 15 будетъ также дѣлить 45.

7. **Теорема.** *Корень h-й степени числа N только въ томъ случаѣ есть число цѣлое, когда степени простыхъ множителей его суть числа кратныя h.*

Доказательство. Разложеніемъ числа N и корня его h-й степени на простые множители находимъ

$$N=\alpha^m\beta^n\gamma^p\ldots\ldots,\quad \sqrt[h]{N}=\alpha_1^{m'}\beta_1^{n'}\gamma_1^{p'}\ldots\ldots$$

Первое изъ этихъ уравненій и второе, по возведеніи его въ степень h, даютъ слѣдующія два разложенія числа N на простые множители:

$$N=\alpha^m\beta^n\gamma^p\ldots,\quad N=\alpha_1^{hm'}\beta_1^{hn'}\gamma_1^{hp'}\ldots\ldots$$

Но, по теоремѣ 5-й, эти разложенія должны быть тождественны. А потому числа $\alpha, \beta, \gamma, \ldots\ldots$ должны быть равны числамъ $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1 \ldots\ldots$ и числа $m, n, p, \ldots$ должны имѣть равныя въ ряду $hm', hn', hp', \ldots\ldots$; послѣднее ясно обна-

www.rcin.org.pl

руживаетъ, что m, n, p, ... суть числа кратныя h, въ чемъ и заключается предложенная теорема.

Такъ, находя число 576 равнымъ $2^6\ 3^2$ и замѣчая, что здѣсь показатели 6 и 2 имѣютъ общимъ дѣлителемъ только 2, мы заключаемъ, что изъ всѣхъ корней числа 576 только корень квадратный имѣетъ значеніе цѣлое.

8. **Теорема** *Если N разложеніемъ на простые множители приводится къ $\alpha^m\ \beta^n\ \gamma^p$ . . . . , то сумма различныхъ дѣлителей N есть*

$$\frac{\alpha^{m+1}-1}{\alpha-1}\cdot\frac{\beta^{n+1}-1}{\beta-1}\cdot\frac{\gamma^{p+1}-1}{\gamma-1}\cdot\ldots\ldots\ldots,$$

а число ихъ есть $(m+1)\ (n+1)\ (p+1)\ldots\ldots$

Доказательство. По 4-й теоремѣ, число N, какъ равное $\alpha^m\ \beta^n\ \gamma^p$ . . . . , можетъ дѣлиться только на числа равныя $\alpha^{m'}\beta^{n'}\gamma^{p'}\ldots\ldots\ldots$, гдѣ $m'<=m, n'<=n, p'<=p, \ldots$. Поэтому всѣ дѣлители числа N опредѣлятся значеніями произведенія $\alpha^{m'}\ \beta^{n'}\ \gamma^{n}\ldots\ldots\ldots$, соотвѣтствующими

$$\begin{aligned} m'&=0,\ 1,\ 2,\ldots\ldots m-1,\ m,\\ n'&=0,\ 1,\ 2,\ldots\ldots n-1,\ n,\\ p'&=0,\ 1,\ 2,\ldots\ldots p-1,\ p, \end{aligned}$$

и слѣд. найдутся въ ряду членовъ, получаемыхъ перемноженіемъ выраженій

$$\begin{aligned} &\alpha^0+\alpha+\alpha^2+\ldots\ldots+\alpha^{m-1}+\alpha^m,\\ &\beta^0+\beta+\beta^2+\ldots\ldots+\beta^{n-1}+\beta^n,\\ &\gamma^0+\gamma+\gamma^2+\ldots\ldots+\gamma^{p-1}+\gamma^p,\\ &\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\\ &\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \end{aligned}$$

А поэтому сумма дѣлителей числа N опредѣлится произведеніемъ

$$\begin{aligned} &(\alpha^0+\alpha+\alpha^2+\ldots+\alpha^{m-1}+\alpha^m)\ (\beta^0+\beta+\beta^2+\ldots+\beta^{n-1}+\beta^n)\\ &(\gamma^0+\gamma+\gamma^2+\ldots+\gamma^{p-1}+\gamma^p)\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots, \end{aligned}$$

которое равно

$$\frac{\alpha^{m+1}-1}{\alpha-1}\cdot\frac{\beta^{n+1}-1}{\beta-1}\cdot\frac{\gamma^{p+1}-1}{\gamma-1}\ldots\ldots;$$

www.rcin.org.pl

ибо

$$\alpha^0+\alpha+\alpha^2+\ldots\ldots+\alpha^{m-1}+\alpha^m=\frac{\alpha^{m+1}-1}{\alpha-1},$$

$$\beta^0+\beta+\beta^2+\ldots\ldots+\beta^{n-1}+\beta^n=\frac{\beta^{n+1}-1}{\beta-1},$$

$$\gamma^0+\gamma+\gamma^2+\ldots\ldots+\gamma^{p-1}+\gamma^p=\frac{\gamma^{p+1}-1}{\gamma-1},$$

. . . . . .

. . . . . .

Число же дѣлителей N опредѣлится числомъ членовъ произведенія

$$(\alpha^0+\alpha+\alpha^2+\ldots+\alpha^{m-1}+\alpha^m)\ (\beta^0+\beta+\beta^2+\ldots+\beta^{n-1}+\beta^n)$$
$$(\gamma^0+\gamma+\gamma^2+\ldots+\gamma^{p-1}+\gamma^p)\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots,$$

или, что одно и тоже, значеніемъ этого выраженія, при $\alpha=1$, $\beta=1$, $\gamma=1$, ... Слѣд. число дѣлителей N есть

$$(m+1)\ (n+1)\ (p+1)\ldots\ldots\ldots$$

Такъ для числа 72, равнаго $2^3\ .\ 3^2$, сумма дѣлителей опредѣлится выраженіемъ $\frac{2^4-1}{2-1}\cdot\frac{3^3-1}{3-1}$, что равняется 195, а число дѣлителей 72 будетъ $(3+1)\times(2+1)$, или 12. Въ справедливости этихъ заключеній мы убѣждаемся, замѣтивъ, что дѣлители 72 суть

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72,

которыхъ сумма равна 195, а число ихъ 12.

9. **Теорема**. *Если N разложеніемъ на простые множители приводится къ $\alpha^m\ \beta^n\ \gamma^p$ ....., гдѣ по крайней мѣрѣ одно изъ чиселъ m, n, p, ... есть нечетное; то для числа N возможно $\frac{1}{2}(m+1)(n+1)(p+1)\ldots$ различныхъ разложеній на два множителя.*

Если же всѣ показатели m, n, p, ... числа четныя, то для N возможно $\left\{\frac{1}{2}(m+1)(n+1)(p+1)\ldots.+\frac{1}{2}\right\}$ такихъ разложеній.

www.rcin.org.pl

Доказательство. Въ первомъ случаѣ, по 7-й теоремѣ, нѣтъ числа, котораго бы квадратъ равнялся N, а потому число N не можетъ разлагаться на произведеніе двухъ множителей равныхъ между собою, и слѣд. всякое разложеніе числа N на два множителя опредѣлитъ два дѣлителя его. Откуда ясно, что число разложеній N на два множителя равно половинѣ числа его дѣлителей и слѣд., по продыдущей теоремѣ, оно равно

$$\tfrac{1}{2}\,(m+1)\,(n+1)\,(p+1)\,\ldots\ldots$$

Во второмъ случаѣ, — въ случаѣ m, n, p, ... четныхъ, въ числѣ разложеній N на два множителя будетъ между прочимъ такое, въ которомъ оба множителя равны и которымъ слѣдовательно опредѣлится одинъ дѣлитель числа N; затѣмъ всѣ остал ныя разложенія, какъ и въ первомъ случаѣ, дадутъ по два дѣлителя. Итакъ, называя черезъ K искомое число разложеній N на два множителя, мы найдемъ $1+2\,(K-1)$ для числа дѣлителей N. Но, по предыдущей теоремѣ, число дѣлителей N есть $(m+1)\,(n+1)\,(p+1)\,\ldots$. Слѣдовательно,

$$1+2\,(K-1)=(m+1)\,(n+1)\,(p+1)\ldots;$$

откуда для величины K находимъ

$$K=\tfrac{1}{2}\,(m+1)\,(n+1)\,(p+1)\ldots+\tfrac{1}{2},$$

что и слѣдовало доказать.

Такъ, для числа 72, равнаго $2^3.\,3^2$, число разложеній на два множителя должно быть $\frac{1}{2}\,(3+1)\,(2+1)$, или 6. Дѣйствительно находимъ мы, что для 72 возможны только слѣдующія 6 разложеній на два множителя

1.72, 2.36, 3.24, 4.18, 6.12, 8.9.

Для числа же 36, равнаго $2^2.\,3^2$, число различныхъ разложеній на два множителя будетъ $\frac{1}{2}\,(2+1)\times(2+1)+\frac{1}{2}$, или 5. Дѣйствительно для 36 возможны только слѣдующія разложенія на два множителя:

1.36, 2.18, 3.12, 4.9, 6.6.

§ 7. Прежде чѣмъ пойдти далѣе, мы докажемъ относи-

www.rcin.org.pl

тельно дѣлимости чиселъ, составляющихъ ариѳметическую прогрессію, слѣдующую теорему, которая намъ будетъ нужна теперь и впослѣдствіи.

10. **Теорема.** *Если разность прогрессіи есть число простое съ p, а число членовъ равно mp, то въ такой прогрессіи число членовъ, дѣлящихся на p, есть m.*

Доказательство. Пусть будетъ разсматриваемая прогрессія

$$a,\ a+d,\ a+2d,\ldots\ldots a+(mp-2)\ d,\ a+(mp-1)\ d,$$

гдѣ d число простое съ p. Этотъ родъ членовъ разбивается на m слѣдующихъ:

$$\left.\begin{array}{l} a,\ a+d,a+2d,\ldots\ldots a+(p-1)d, \\ a+pd,a+pd+d,a+pd+2d,\ldots\ldots a+pd+(p-1)d, \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a+npd,a+npd+d,a+npd+2d,\ldots\ldots a+npd+(p-1)d, \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a+(m-1)pd,a+(m-1)pd+d,a+(m-1)pd+2\,l,\ldots\ldots a+(mp-1)d \end{array}\right\} (3)$$

и не трудно убѣдиться, что каждый изъ этихъ рядовъ заключаетъ одинъ членъ, дѣлящійся на p. Для обнаруженія этого разсмотримъ рядъ

$$a+npd,a+npd+d,a+npd+2d,\ldots\ldots a+npd+(p-1)d.$$

Въ немъ не можетъ быть двухъ членовъ, которые бы при дѣленіи на p дали остатки равные; ибо разность такихъ двухъ членовъ дѣлилась бы на p, а въ невозможности этого мы убѣждаемся, замѣтивъ, что разность какихъ-либо двухъ членовъ этого ряда приводится къ произведенію d, числа простаго съ p, на число $< p$, что̀, по 2-й теоремѣ, на p дѣлиться не можетъ. Но если остатки отъ дѣленія

$$a+npd,a+npd+d,a+npd+2d,\ldots\ldots a+npd+(p-1)d$$

на p всѣ различны между собою и слѣд. въ числѣ ихъ не можетъ быть болѣе одного равнаго нулю, то съ другой стороны одинъ изъ нихъ не обходимо будетъ нулемъ: ибо, предполагая

www.rcin.org.pl

противное и замѣчая, что, кромѣ нуля, относительно остатковъ отъ дѣленія чиселъ на p, можно сдѣлать только $p-1$ предположеній:

$$1, 2, 3, \ldots\ldots p-1,$$

мы должны бы были допустить, что въ числѣ p остатковъ отъ дѣленія:

$$a+npd, a+npd+d, a+npd+2d, \ldots\ldots a+np+(p-1)d,$$

есть два по крайней мѣрѣ равные, что, по доказанному нами, невозможно.

Убѣдясь такимъ образомъ, что въ ряду

$$a+npd, a+npd+d, a+npd+2d, \ldots\ldots a+npd+(p-1)d$$

и слѣд. въ каждомъ изъ (3) число членовъ дѣлящихся на p есть 1, мы заключаемъ, что во всѣхъ m рядахъ (3) число членовъ дѣлящихся на p есть m. Но совокупность всѣхъ этихъ рядовъ, какъ видѣли, составляетъ разсматриваемую нами прогрессію

$$a, a+d, a+2d, \ldots\ldots a+(mp-2)d, a+(mp-1)d;$$

откуда и слѣдуетъ предложенная нами теорема.

Изъ этой теоремы не трудно вывести слѣдующую:

11. Теорема. *Если a число простое само по себѣ и A простое съ a, то въ ряду* 1, 2, 3. . . . . , $aAN-1$, aAN *число членовъ простыхъ съ A къ числу членовъ простыхъ съ A и a относится какъ a къ $a-1$.*

Доказательство. Въ Ариѳметикѣ доказано, что общій наибольшій дѣлитель чиселъ X и A есть также общій наибольшій дѣлитель числа A и остатка отъ дѣленія X на A. Отсюда слѣдуетъ, что если X и A неимѣютъ общаго дѣлителя, то и остатокъ отъ дѣленія X на A будетъ число простое съ A, и, обратно, если остатокъ отъ дѣленія X на A есть число простое съ A, то X также число простое съ A. Но такъ какъ остатокъ отъ дѣленія на A будетъ всегда менѣе A, то, при X простомъ

www.rcin.org.pl

съ A, остатокъ отъ дѣленія X на A будетъ всегда одно изъ чиселъ мéньшихъ съ A и простыхъ съ A. Пусть же

$$\alpha', \alpha'', \alpha''', \ldots\ldots \alpha^{(n)}$$

будутъ числа простыя съ A и меньшія A; нетрудно опредѣлить видъ числа X, для котораго остатокъ отъ дѣленія на A былъ бы равенъ одному изъ чиселъ $\dot{\alpha}$, $\dot{\alpha}'$, $\dot{\alpha}''$ . . . . $\alpha^{(n)}$. Такъ, чтобы найти X, которое при дѣленіи на A даетъ остатокъ $\dot{\alpha}$, пусть будетъ m' частное отъ дѣленія X на A; приравнивая дѣлимое произведенію дѣлителя на частное, сложенному съ остаткомъ, мы находимъ для выраженія X слѣдующую формулу:

$$X = \alpha' + m' A.$$

Также, находимъ слѣдующія формулы для чиселъ, которыхъ остатки отъ дѣленія на A суть $\dot{\alpha}'$, $\dot{\alpha}''$, ... $\alpha^{(n)}$:

$$X = \alpha' + m' A;\ X = \alpha'' + m'' A, \ldots\ldots X = \alpha^{(n)} + m^{(n)} A.$$

Итакъ, всѣ числа, которыя при дѣленіи на A даютъ остатки равные $\dot{\alpha}$, $\dot{\alpha}'$, $\dot{\alpha}''$ . . . . $\alpha^{(n)}$ и слѣд., по замѣченному нами, суть числа простыя съ A, выразятся такимъ образомъ

$$X = \alpha' + m' A,\ X = \alpha'' + m'' A,\ X = \alpha''' + m''' A, \ldots\ldots X = \alpha^{(n)} + m^{(n)} A.$$

Такъ выражаются всѣ числа простыя съ A. На основаніи этихъ формулъ легко доказать предложенную нами теорему.

Съ этою цѣлію мы опредѣляемъ по этимъ формуламъ всѣ числа простыя съ A и мéньшія aAN, давая въ нихъ буквамъ m', m'', m''', ... $m^{(n)}$ значенія 0, 1, 2, 3, и т. д. до тѣхъ поръ, пока числа, опредѣляемыя этими формулами, не будутъ болѣе aAN.

Такъ находимъ, что всѣ числа простыя съ A и мѐньшія aAN суть

$$\begin{aligned}
&\alpha', \alpha' + A, \alpha' + 2A, \ldots\ldots\ldots\ldots \alpha' + (aN-1)A,\\
&\alpha'', \alpha'' + A, \alpha'' + 2A, \ldots\ldots\ldots\ldots \alpha'' + (aN-1)A,\\
&\alpha''', \alpha''' + A, \alpha''' + 3A, \ldots\ldots\ldots \alpha''' + (aN-1)A,\\
&\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\\
&\alpha^{(n)}, \alpha^{(n)} + A, \alpha^{(n)} + 2A, \ldots\ldots\ldots \alpha^{(n)} + (aN-1)A,
\end{aligned}$$

и всѣхъ ихъ, какъ не трудно замѣтить, счетомъ есть aNn.

www.rcin.org.pl

Теперь не трудно показать число простыхъ чиселъ съ A и a и въ тоже время мѣньшихъ aAN. Для этого стоитъ только въ найденныхъ нами числахъ, простыхъ съ A, выкинуть числа кратныя a; ибо a число само по себѣ простое, и слѣд., по § 3, всѣ числа, не дѣлящіяся на него, будутъ простыя съ нимъ. Но, по предъидущей теоремѣ, въ ряду

$$\alpha', \alpha'+A, \alpha'+2A, \alpha'+3A, \ldots\ldots \alpha'+(aN-1)A$$

число членовъ, дѣлящихся на a, есть N; слѣд. простыхъ съ a здѣсь a $N-N$, или $(a-1)$ N. Тоже замѣчаемъ о прочихъ рядахъ:

$$\alpha'', \alpha''+A, \alpha''+2A, \ldots\ldots\ldots\ldots \alpha''+(a\,N-1)A,$$
$$\alpha''', \alpha'''+A, \alpha'''+2A, \ldots\ldots\ldots\ldots \alpha'''+(aN-1)A,$$
$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$
$$\alpha^{(n)}, \alpha^{(n)}+A, \alpha^{(n)}+2A, \ldots\ldots\ldots \alpha^{n}+(aN-1)A$$

Откуда слѣдуетъ, что чиселъ, мѣньшихъ aAN и простыхъ съ A и a, будетъ $(a-1)$ Nn. Но это число къ числу всѣхъ чиселъ мѣньшихъ aAN и простыхъ съ aAN, которое, какъ видѣли, есть aNn, относится какъ $a-1$ къ a, что и слѣдовало доказать.

На основаніи теоремъ, изложенныхъ нами, не трудно будетъ доказать слѣдующую теорему:

12. Теорема. *Если N разложеніемъ на простые множители приводится къ $\alpha^m \beta^n \gamma^p \ldots \pi^r$, то число простыхъ чиселъ съ N и меньшихъ N есть*

$$\alpha^m\beta^n\gamma^p\ldots\pi^r \cdot \frac{\alpha-1}{\alpha} \cdot \frac{\beta-1}{\beta} \cdot \frac{\gamma-1}{\gamma} \cdot \ldots\ldots \frac{\pi-1}{\pi}.$$

Доказательство. На основаніи предыдущихъ теоремъ, не трудно показать, сколько чиселъ простыхъ съ α, β, γ, ... π въ ряду

$$1, 2, 3, \ldots\ldots, \alpha^m\beta^n\gamma^p \ldots\ldots \pi^r.$$

Для этого мы пишемъ этотъ рядъ въ видѣ ариѳметической прогрессіи, съ разностію равною 1, такимъ образомъ:

www.rcin.org.pl

$$1,1+1,1+2.\ 1,\ldots\ldots 1+(\alpha.\alpha^{m-1}\beta^{n}\gamma^{p}\ldots.\pi^{r}-1).$$

На основаніи 10-й теоремы, мы заключаемъ, что здѣсь членовъ, дѣлящихся на α, есть $\alpha^{m-1}\beta^{n}\gamma^{p}\ldots\ldots\ldots\pi^{r}$; затѣмъ остальные, числомъ $\alpha^{m}\beta^{n}\gamma^{p}\ldots.\pi^{r}-\alpha^{m-1}\beta^{n}\gamma^{p}\ldots.\pi^{r}$, или $\alpha^{m}\beta^{n}\gamma^{p}\ldots.\pi^{r}.\frac{\alpha-1}{\alpha}$ будутъ простыя съ α (см. § 3). Итакъ въ ряду

$$1,\ 2,\ 3,\ldots\ldots\ldots\alpha^{m}\beta^{n}\gamma^{p}\ldots\pi^{r}$$

число членовъ простыхъ съ α есть $\alpha^{m}\beta^{n}\gamma^{p}\ldots.\pi^{r}.\frac{\alpha-1}{\alpha}$. Отсюда, по 11-й теоремѣ, мы заключаемъ, что число членовъ простыхъ съ α и β, или, что одно и тоже, простыхъ съ произведеніемъ $\alpha\beta$, есть $\alpha^{m}\beta^{n}\gamma^{r}\ldots.\pi^{r}.\frac{\alpha-1}{\alpha}.\frac{\beta-1}{\beta}$; далѣе, по той же теоремѣ, зная, что число членовъ въ ряду

$$1,\ 2,\ 3,\ldots\ldots\ldots\alpha^{m}\beta^{n}\gamma^{p}\ldots.\pi^{r}$$

простыхъ съ $\alpha\beta$ есть $\alpha^{m}\beta^{n}\gamma^{p}\ldots\pi^{r}.\frac{\alpha-1}{\alpha}.\frac{\beta-1}{\beta}$, мы находимъ, что здѣсь число членовъ, простыхъ съ $\alpha\beta\gamma$, есть

$$\alpha^{m}\beta^{n}\gamma^{p}\ldots.\pi^{r}\frac{\alpha-1}{\alpha}.\frac{\beta-1}{\beta}.\frac{\gamma-1}{\gamma},\ \text{и т. д.}$$

Наконецъ найдемъ такимъ образомъ, что число членовъ, простыхъ съ $\alpha\beta\gamma\ldots.\pi$, есть

$$\alpha^{m}\beta^{n}\gamma^{p}\ldots.\pi^{r}\frac{\alpha-1}{\alpha}.\frac{\beta-1}{\beta}.\frac{\gamma-1}{\gamma}\ldots\ldots.\frac{\pi-1}{\pi}.$$

Такъ опредѣляется число простыхъ чиселъ съ $\alpha\beta\gamma\ldots.\pi$ и меньшихъ $\alpha^{m}\beta^{n}\gamma^{p}\ldots.\pi^{r}$. Но это все равно, какъ бы мы разсматривали числа простыя съ N, или $\alpha^{m}\beta^{n}\gamma^{p}\ldots.\pi^{r}$; ибо всѣ простыя числа относительно $\alpha^{m}\beta^{n}\gamma^{p}\ldots.\pi^{r}$ суть простыя относительно $\alpha\beta\gamma\ldots.$ и обратно. Въ этомъ мы убѣждаемся тѣмъ, что относительно $\alpha^{m}\beta^{n}\gamma^{p}\ldots.\pi^{r}$, также какъ относительно $\alpha\beta\gamma\ldots.\pi$, всякое число будетъ простое, если въ составѣ его нѣтъ $\alpha,\ \beta,\ \gamma,\ldots.\pi$; въ противномъ же случаѣ оно не будетъ простымъ ни относительно $\alpha^{m}\beta^{n}\gamma^{p}\ldots.\pi^{r}$, ни относительно $\alpha\beta\gamma\ldots.\pi$.

www.rcin.org.pl

Итакъ $\alpha^m\beta^n\gamma^p\ldots\pi^r.\frac{\alpha-1}{\alpha}\cdot\frac{\beta-1}{\beta}\cdot\frac{\gamma-1}{\gamma}\ldots\ldots\frac{\pi-1}{\pi}$ есть число членовъ въ ряду

$$1, 2, 3, \ldots\ldots, \alpha^m\beta^n\gamma^p\ldots\ldots\pi^r$$

простыхъ съ $\alpha^m\beta^n\gamma^p\ldots\ldots\pi^r$, что и слѣдовало доказать.

Такъ, для опредѣленія, сколько чиселъ простыхъ съ 36 и меньшихъ 36, мы разлагаемъ 36 на простые множители. Находя, что 36 равно $2^2 . 3^2$, мы, по доказанной нами теоремѣ, заключаемъ, что всѣхъ чиселъ простыхъ съ 36 и меньшихъ 36 есть $2^2 . 3^2\frac{2-1}{2}\cdot\frac{3-1}{3}$, или 12. Дѣйствительно, между всѣми числами отъ 1 до 36 мы находимъ 12 чиселъ:

$$1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35,$$

простыхъ съ 36; всѣ же прочія:

$$2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18,$$
$$20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34,$$

суть составныя.

Этимъ мы оканчиваемъ изложеніе свойствъ чиселъ, необходимыхъ намъ впослѣдствіи, и переходимъ къ изслѣдованію сравненій.

ГЛАВА I.

О сравненіяхъ вообще.

§ 8. Теорія сравненій имѣетъ предметомъ изслѣдованіе неопредѣленныхъ уравненій, въ которыя одна изъ неизвѣстныхъ входитъ первой степени. Общій видъ этихъ уравненій есть

$$F(x, y, z, \ldots\ldots) = Au + B,$$

гдѣ F—данная функція, A и B—извѣстныя числа. Такъ какъ эти уравненія употребляются очень часто, то для нихъ введено особенное знакоположеніе. Не трудно замѣтить, что, при неопредѣленномъ значеніи числа u, уравненіе

www.rcin.org.pl

$$F(x, y, z, \ldots) = Au + B,$$

приводясь къ равенству

$$\frac{F(x, y, z, \ldots) - B}{A} = u,$$

есть ни что иное, какъ выраженіе дѣлимости разности $F(x, y, z...) - B$ на A. А потому мы можемъ представить это уравненіе такъ:

$$F(x, y, z, \ldots) \equiv B \ (\textit{мод. } A),$$

означая вообще знакомъ $\equiv$, поставленнымъ между двумя числами, дѣлимость разности ихъ на третье число, которое съ словами *мод.* поставляемъ въ скобкахъ.

Такъ, для означенія, что разность 17—5 дѣлится на 3, будемъ писать

$$17 \equiv 5 \ (\textit{мод. } 3).$$

Выраженія вида

$$M \equiv N \ (\textit{мод. } A)$$

извѣстны подъ названіемъ сравненій, числа M и N называются сравнимыми по модулю A, число A — модулемъ сравненія. Сравниваемыя числа M, N могутъ имѣть значенія и положительныя и отрицательныя; во всякомъ случаѣ выраженіе

$$M \equiv N \ (\textit{мод. } A)$$

будетъ означать дѣлимость алгебраической разности $M - N$ на A. Число же A, модуль сравненія, мы будемъ всегда предполагать числомъ положительнымъ.

Замѣтимъ, что, по сказанному нами знакоположенію, будетъ всегда

$$M \equiv N \ (\textit{мод. } A),$$

если r есть остатокъ отъ дѣленія M на A: ибо, называя черезъ q частное при дѣленіи M на A и приравнивая дѣлимое произведенію дѣлителя на частное, сложенному съ остаткомъ, найдемъ:

$$M = Aq + r,$$

откуда ясно, что разность M и r дѣлится на A.

Не трудно также убѣдиться въ обратномъ, что, если, при M

www.rcin.org.pl

и r положительныхъ, число r меньше A и сравнимо съ M по модулю A, то r есть остатокъ отъ дѣленія M на A: ибо изъ сравненія $M \equiv r$ (*мод.* A) выходитъ $\frac{M-r}{A} = q$, откуда $M = Aq + r$; а это уравненіе, при $r < A$ и $r = > 0$, обнаруживаетъ въ r остатокъ отъ дѣленія M на A.

Изъ того, что дѣлимое сравнимо съ остаткомъ, если дѣлитель принятъ за модуль, какъ частный случай, мы выводимъ что, если M дѣлится на A безъ остатка, то

$$M \equiv 0 \text{ (мод. } A).$$

На основаніи этого мы будемъ говорить часто, что число сравнимо съ 0 по модулю A, вмѣсто того, чтобы говорить, что оно дѣлится на N.

§ 9. Изъ понятія, составленнаго нами о сравненіяхъ, не трудно обнаружить въ нихъ слѣдующія свойства:

1) *Два числа, сравнимыя съ однимъ и тѣмъ же числомъ по какому либо модулю, сравнимы и между собою потому же модулю.* Въ самомъ дѣлѣ, если $M \equiv N$ (*мод.* A), $M' \equiv N$ (*мод.* A), то и $M \equiv M'$ (*мод.* A): ибо сравненія $M \equiv N$ (*мод.* A) предполагаютъ, что A дѣлитъ разности $M - N$, $M' - N$ и слѣд. дѣлитъ разность этихъ разностей. Но эта послѣдняя разность есть $M - M'$ и дѣлимость ея на A выражается сравненіемъ $M \equiv M'$ (*мод.* A).

2) *Въ сравненіяхъ, подобно уравненіямъ, члены, могутъ быть переносимы изъ одной части въ другую.* Такъ, если $M + M' \equiv N$ (*мод.* A), то $M \equiv N - M'$ (*мод.* A). Въ самомъ дѣлѣ, сравненіе $M + M' \equiv N$ (*мод.* A) выражаетъ дѣлимость $M + M' - N$ на A; но $M + M' - N$ равно $M - (N - M')$; дѣлимость же этого на A выражается сравненіемъ $M \equiv N - M'$ (*мод.* A).

3) *Два или нѣсколькихъ сравненій съ однимъ и тѣмъ же модулемъ могутъ быть почленно складываемы и вычитаемы.* Такъ, если $M \equiv N$ (*мод.* A) и $M' \equiv N'$ (*мод.* A), то $M \pm M' \equiv N \pm N'$ (*мод.* A). Въ этомъ не трудно убѣдиться, замѣтивъ, что сравненія $M \equiv N$ (*мод.* A), $M' \equiv N'$ (*мод.* A) предполагаютъ

*

www.rcin.org.pl

дѣлимость разностей $M-N$, $M'-N'$ на A. Откуда слѣдуетъ дѣлимость на A числа равнаго $M-N\pm(M'-N')$, или $M\pm M'-(N\pm N')$; а это выражается сравненіемъ $M\pm M'\equiv(N\pm N')$. (*мод.* A), что и слѣдовало доказать. Отъ соединенія двухъ сравненій не трудно перейти къ соединенію трехъ, четырехъ и т. д.

4) *Члены сравненія могутъ быть умножены на одно число.* Такъ, если $M\equiv N$ (*мод.* A), то $kM\equiv kN$ (*мод.* A). Въ самомъ дѣлѣ, по предыдущему свойству, сложивши почленно k одинаковыхъ сравненій $M\equiv N$ (*мод.* A), найдемъ $kM\equiv kN$ (*мод.* A) Такъ докажется возможность умножать члены сравненія на всякое цѣлое, положительное число. Чтоже касается до умноженія на число отрицательное, то мы замѣчаемъ, что, если $kM\equiv kN$ (*мод.* A), то также $-kM\equiv -kN$ (*мод.* A): ибо первое сравненіе предполагаетъ дѣлимость числа $kM-kN$ на A а это число съ знакомъ(—)будетъ$-kM+kN$ и дѣлимость его на A выражается сравненіемъ— $kM\equiv -kN$ (*мод.* A).

5) *Два или нѣсколько сравненій съ однимъ и тѣмъ же модулемъ могутъ быть почленно перемножены.*

Не трудно убѣдиться, что если $M\equiv N$ (*мод.* A) и $M'\equiv N'$ (*мод.* A); то $MM'\equiv NN'$ (*мод.* A). Въ самомъ дѣлѣ, сравненія $M\equiv N$, $M'\equiv N'$ (*мод.* A) выражаютъ дѣлимость чиселъ $M-N$, $M'-N'$ на A. Называя же черезъ q, q' частныя, получаемыя при этихъ дѣленіяхъ, находимъ

$$\frac{M-N}{A}=q,\ \frac{M'-N'}{A}=q',$$

откуда выходитъ

$$M=Aq+N,\ M'=Aq'+N'.$$

Эти уравненія, по перемноженіи, даютъ

$$MM'=A^2qq'+A(qN'+q'N)+NN',$$

что обнаруживаетъ дѣлимость $MM'-NN'$ на A, и слѣд. сравненіе $MM'\equiv NN'$ (*мод.* A).

Если мы перемножимъ такимъ образомъ сравненія $M\equiv N$, $M'\equiv N'$ (*мод.* A) между собою, произведеніе ихъ перемножимъ съ $M''\equiv N''$ (*мод.* A) и т. д.; то мы дойдемъ до срав-

www.rcin.org.pl

ненія $MM'M''\ldots \equiv NN'N''\ldots$ (*мод. A*). Предполагая же здѣсь $M = M' = M'' = \ldots$, $N = N' = N'' \ldots$ и называя черезъ k число равныхъ чиселъ M, M', M'', ... и N, N', N''...., найдемъ $M^k \equiv N^k$ (*мод. A*). На основаніи этого легко доказать слѣдующее предложеніе:

6) *Значенія цѣлой функціи съ цѣлыми коэффиціентами отъ двухъ чиселъ, сравнимыхъ по какому нибудь модулю, сравнимы по тому же модулю.*

Такъ, если $M \equiv N$ (*мод. A*), $fx = ax^m + bx^{m-1} + cx^{m-2} + \ldots$, гдѣ a, b, c, ... числа цѣлыя; то $f(M) \equiv f(N)$ (*мод. A*). Въ самомъ дѣлѣ, изъ сравненія $M \equiv N$ (*мод. A*), по доказанному намп сейчасъ, выходитъ

$$M^m \equiv N^m,\ M^{m-1} \equiv N^{m-1},\ M^{m-2} \equiv N^{m-2}, \ldots . \text{(мод. } A);$$

умножая эти сравненія на a, b, c, ..., выводимъ

$$aM^m \equiv aN^m,\ bM^{m-1} \equiv bN^{m-1},\ cM^{m-2} \equiv cN^{m-2} \ldots . \text{(мод. } A).$$

Эти же сравненія, будучи сложены почленно, даютъ

$aM^m + bM^{m-1} + cM^{m-2} + \ldots \equiv aN^m + bN^{m-1} + aN^{m-2} + \ldots$ (*мод. A*), гдѣ, занѣняя $aM^m + bM^{m-1} + cM^{m-2} + \ldots$, $aN^m + bN^{m-1} + cN^{m-2} + \ldots$ черезъ $f(M)$, $f(N)$, имѣемъ $f(M) \equiv f(N)$ (*мод. A*), что и слѣдовало доказать.

7) *Члены сравненія могутъ быть сокращены на ихъ общаго множителя, если этотъ множитель число простое съ модулемъ.*

Такъ, если $kM \equiv kN$ (*мод. A*), гдѣ k число простое съ A; то $M \equiv N$ (*мод. A*). Въ самомъ дѣлѣ, сравненіе $kM \equiv kN$ (*мод. A*) предполагаетъ дѣлимость $kM - kN$, или $k(M - N)$ на A. Но, при k простомъ съ A, по 2-й теоремѣ, это предполагаетъ дѣлимость $M - N$ на A, а это выражается сравненіемъ $M \equiv N$ (*мод. A*).

8) *Если одна часть сравненія и модуль дѣлятся на какое нибудь число, то на тоже число должна дѣлиться и другая часть сравненія; иначе сравненіе—невозможно.*

Такъ, если $M \equiv kN$ (*мод. kA*), то M дѣлится на k. Въ са-

www.rcin.org.pl

момъ дѣлѣ, это сравненіе предполагаетъ, что разность $M-kN$ дѣлится на kA. Называя же черезъ q частное отъ этого дѣленія, имѣемъ $\frac{M-kN}{kA} = q$. Откуда выходитъ $M = k\,(N+Aq)$, что обнаруживаетъ дѣлимость M на k.

9) *Общій множитель членовъ сравненія и модуля можетъ быть сокращенъ.* Такъ если $kM \equiv kN$ (*мод.* kA); то $M \equiv N$ (*мод.* A). Въ самомъ дѣлѣ, сравненіе $kM \equiv kN$ (*мод.* kA) предполагаетъ дѣлимость $kM-kN$ на kA; но $\frac{kM-kN}{kA}$ приводится къ $\frac{M-N}{A}$; дѣлимость же $M-N$ на A выражается сравненіемъ $M \equiv N$ (*мод.* A).

10) *Для числа, сравнимыя по двумъ или нѣсколькимъ модулямъ простымъ между собою, сравнимы и по произведенію ихъ.* Такъ, если $M \equiv N$ (*мод.* A), $M \equiv N$ (*мод.* A'), гдѣ A, A' числа простыя между собою, то $M \equiv N$ (*мод.* AA'). Въ самомъ дѣлѣ, сравненія $M \equiv N$ (*мод.* A), $M \equiv N$ (*мод.* A) предполагаютъ дѣлимость $M-N$ на A и A'. Но, при A и A' простыхъ между собою, эта дѣлимость (теор. 3) предполагаетъ дѣлимость $M-N$ на произведеніе AA', что выражается сравненіемъ $M \equiv N$ (*мод.* AA'). На основаніи этого, имѣя нѣсколько сравненій $M \equiv N$ (*мод.* A), $M \equiv N$ (*мод.* A'), $M \equiv N$ (*мод.* A''),...., гдѣ всѣ числа A, A', A'',... суть простыя относительно другъ друга, мы, изъ соединенія двухъ первыхъ, находимъ $M \equiv N$ (*мод.* AA'); соединяя же это сравненіе съ $M \equiv N$ (*мод.* A''), получаемъ $M \equiv N$ (*мод.* $AA'A''$) и такъ далѣе, въ чемъ и заключается предложенная нами теорема.

11) *Не нарушая сравненія, модуль можетъ быть замѣненъ числомъ, на которое онъ дѣлится.* Такъ, если $M \equiv N$ (*мод.* AA'), то $M \equiv N$ (*мод.* A). Въ самомъ дѣлѣ, умножая члены этого сравненія на A', найдемъ $A'M \equiv A'N$ (*мод.* AA'). Но, по замѣченному нами свойству сравненій (см. n^0 9), общій множитель членовъ сравненія и модуля можетъ быть сокращенъ. Сокращая же въ сравненіи $A'M \equiv A'N$ (*мод.* AA') множитель A', находимъ $M \equiv N$ (*мод.* A), что и слѣдовало доказать.

Вотъ главныя свойства сравненій двухъ чиселъ между со-

www.rcin.org.pl

бою. Эти свойства послужатъ намъ для рѣшенія сравненій, заключающихъ одно или нѣсколько неизвѣстныхъ. Къ этому мы теперь и приступимъ.

§ 10. Мы видѣли, что въ сравненіи члены могутъ быть переносимы изъ одной части въ другую. Предполагая же всѣ члены перенесенными въ одну часть сравненія, мы приведемъ его къ виду

$$f(x, y, z, \ldots) \equiv 0 \pmod{p},$$

гдѣ f—какая нибудь функція, p—данное число, принимаемое за модуль, $x, y, z, \ldots$—числа неизвѣстныя.

Изслѣдованія наши мы начнемъ съ простѣйшихъ сравненій, съ сравненій, заключающихъ одно неизвѣстное, и сначала разсмотримъ тотъ случай, когда функція, входящая въ сравненіе, есть цѣлая, съ цѣлыми коеффиціентами.

Ограничиваясь сравненіями этого вида, мы докажемъ для нихъ слѣдующую теорему:

13. **Теорема**. *Если сравненію* $fx \equiv 0 \pmod{p}$ *удовлетворяетъ* $x = a$, *то ему удовлетворяютъ и всѣ числа, сравнимыя съ* a *по модулю* p *).

Доказательство. Въ самомъ дѣлѣ по свойствамъ сравненій, замѣченнымъ нами въ предъидущемъ параграфѣ (см. тамъ $n^0 6$), изъ сравненія $X \equiv a \pmod{p}$ выходитъ $fX \equiv fa \pmod{p}$. Но a, по положенію, удовлетворяетъ сравненію $fx \equiv 0 \pmod{p}$, слѣд. $fa \equiv 0 \pmod{p}$, а въ этомъ случаѣ, по n^0 1 предъидущаго параграфа, изъ сравненія $fX \equiv fa \pmod{p}$ выходитъ $fX \equiv 0 \pmod{p}$, что и слѣдовало доказать.

§ 11. Мы видѣли, что если a есть число, удовлетворяющее сравненію $fx \equiv 0 \pmod{p}$, то ему удовлетворяютъ и всѣ числа, сравнимыя съ a по модулю p. Посмотримъ теперь, какія же числа будутъ сравнимы съ a по модулю p? Для этаго мы припомнимъ, что числа, сравнимыя между собою по модулю p,

*) Здѣсь и вездѣ въ послѣдствіи подъ знаками fx, Fx, φx, ... мы будемъ разумѣть цѣлыя функціи съ цѣлыми коеффиціентами.

www.rcin.org.pl

суть тѣ, которыхъ разность дѣлится на p безъ остатка; поэтому X будетъ числомъ сравнимымъ съ a по модулю p, если разность ихъ дѣлится на p. Называя же частное отъ дѣленія $a-X$ на p черезъ N, мы найдемъ $\frac{a-X}{p} = N$; откуда $X = a - pN$. Вотъ общая формула всѣхъ чиселъ, сравнимыхъ съ a по модулю p. Давая здѣсь числу N различныя величины какъ положительныя, такъ и отрицательныя, мы найдемъ безконечное множество чиселъ, сравнимыхъ съ a по модулю p. Но изъ всѣхъ чиселъ, сравнимыхъ съ a по модулю p, особеннаго вниманія заслуживаютъ два числа: 1) число положительное наименьшее изъ всѣхъ чиселъ, сравнимыхъ съ a по модулю p; оно извѣстно подъ названіемъ *наименьшаго положительнаго вычета числа a по модулю p*; 2) число отрицательное, котораго численная величина менѣе численной величины всѣхъ отрицательныхъ чиселъ, сравнимыхъ съ a по модулю p; такое число извѣстно подъ названіемъ *наименьшаго отрицательнаго вычета числа a по модулю p*. Кромѣ того, мы будемъ отличать особеннымъ именемъ—*обсолютно малаго вычета числа a по модулю p*, тотъ изъ наименьшихъ вычетовъ положительный или отрицательный, который имѣетъ наименьшую численную величину. Въ случаѣ равенства численныхъ величинъ наименьшаго положительнаго вычета числа a по модулю p и наименьшаго отрицательнаго вычета его, мы за обсолютно малый вычетъ числа a по модулю p можемъ безъ различія принимать тотъ или другой изъ наименьшихъ вычетовъ и будемъ говорить, что, въ этомъ случаѣ, абсолютно малый вычетъ числа a по модулю p имѣетъ двѣ величины.

По формулѣ $X = a - Np$, опредѣляющей всѣ числа, сравнимыя съ a по модулю p, не трудно найти и наименьшій положительный вычетъ a по модулю p и наименьшій отрицательный вычетъ его. Для этого мы уравненіе $X = a - Np$ пишемъ такъ $X = p\left(\frac{a}{p} - N\right)$; откуда видно, что наименьшая численная величина X соотвѣтствуетъ значеніямъ N, наиближе подходящимъ къ $\frac{a}{p}$; притомъ видно также, что X будетъ имѣть значеніе положительное или отрицательное, смотря потому, будетъ ли N менѣе или болѣе чѣмъ $\frac{a}{p}$.

www.rcin.org.pl

Итакъ, наименьшій положительный вычетъ числа a по модулю p опредѣлится по формулѣ $a—Np$, когда за N мы возмемъ число, наиближе падходящее къ $\frac{a}{p}$, но не превосходящее $\frac{a}{p}$; такое число, очевидно, при a положительномъ, мы найдемъ въ частномъ, дѣля a на p и пренебрегая остаткомъ. Откуда ясно, что наименьшій положительной вычетъ по модулю p числа положительнаго мы найдемъ въ остаткѣ, отъ дѣленія его на p. Такъ, для опредѣленія наименьшаго положительнаго вычета 23 по модулю 7, мы будемъ имѣть формулу $23—7N$, гдѣ за N должны будемъ взять цѣлое число, получаемое при дѣленія 23 на 7. Выполняя это дѣленіе находимъ, что здѣсь $N=3$. Дѣлая $N=3$ въ формулѣ $23—7N$, находимъ, что 2 есть наименьшій положительный вычетъ 23 по модулю 7.

Также для наименьшаго положительнаго вычета (—2) по модулю 5 находимъ формулу $—2—5N$, гдѣ за N должны взять число наиближе подходящее въ $\frac{-2}{5}$, но не превосходящее $\frac{-2}{5}$. Такое число есть (—1); слѣд., искомый вычетъ есть $—2+5=3$.

Не трудно убѣдиться, что всегда малый положительный вычетъ a по модулю p меньше p. Это слѣдуетъ изъ сказаннаго нами объ опредѣленіи его. Мы видѣли, что онъ опредѣляется формулою $a—Np$, гдѣ N есть цѣлое число, наиближе подходящее къ $\frac{a}{p}$; а потому $\frac{a}{p}—N<1$, слѣд.,

$$a-pN=p\left(\frac{a}{p}-N\right)<p.$$

Для опредѣленія наименьшаго отрицательнаго вычета числа a по модулю p, мы должны въ формулѣ $a—Np$, или $p\left(\frac{a}{p}—N\right)$ принять за N число, которое было бы больше $\frac{a}{p}$ и наиближе подходило къ $\frac{a}{p}$. Такое число, при a положительномъ, очевидно, мы получимъ, если, дѣля a на p, дробь частнаго замѣнимъ единицею. Такъ наименьшій отрицательный вычетъ числа 23 по модулю 7 опредѣлится формулою $23—7N$, гдѣ за N должны взять частное $\frac{23}{7}=3+\frac{2}{7}$. Замѣнивъ единицей дробь $\frac{2}{7}$, будемъ имѣть $N=4$ и, по формулѣ $23—7.N$, находимъ, что

www.rcin.org.pl

наименьшій отрицательный вычетъ числа 23 по модулю 7 есть 23—7.4, или (—5).

Опредѣливши наименьшій положительный вычетъ и наименьшій отрицательный, мы легко узнаемъ тотъ изъ нихъ, который долженъ быть принятъ за обсолютно малый вычетъ. Но его также можно опредѣлить непосредственно, на основаніи формулы $a - Np$, или $p\left(\frac{a}{p} - N\right)$. Для этого стоитъ только выбрать значеніе N такъ, чтобы $\frac{a}{p} - N$ имѣло наименьшую численную величину; такое значеніе N мы, очевидно, найдемъ, опредѣляя частное $\frac{a}{p}$ и откидывая въ немъ дробную часть, когда она меньше $\frac{1}{2}$ или замѣняя ее единицею, если она болѣе $\frac{1}{2}$. Если же дробная часть $\frac{a}{p}$ не больше $\frac{1}{2}$ и не меньше $-\frac{1}{2}$, то мы ее, по произволу, можемъ или откинуть или замѣнить единицею; въ томъ и другомъ случаѣ численная величина $\frac{a}{p} - N$ будетъ равна $\frac{1}{2}$. Такъ, для опредѣленія обсолютно малаго вычета 23 по модулю 7, мы должны въ формулѣ $23 - 7$. N принять за N частное $\frac{23}{7} = 3 + \frac{2}{7}$, откинувши дробь $\frac{2}{7}$. Это даетъ намъ $N = 3$, и, слѣдовательно, искомый обсолютно малый вычетъ будетъ $23 - 7.3 = 2$.

Напротивъ, при опредѣленіи обсолютно малаго вычета 25 по модулю 7, мы возьмемъ въ формулѣ $25 - 7$. N за N частное $\frac{25}{7} = 3 + \frac{4}{7}$, замѣнивъ единицею дробь $\frac{4}{7}$. Это дастъ намъ $N = 4$, и для величины искомаго вычета найдемъ $25 - 7.4 = -3$.

Изъ сказаннаго нами слѣдуетъ, что, при опредѣленіи обсолютно малаго вычета по формулѣ $a - Np$, мы за N принимаемъ число, котораго разность съ $\frac{a}{p}$ будетъ имѣть численную величину не болѣе $\frac{1}{2}$. А потому абсолютно малый вычетъ числа a по модулю p, опредѣляясь формулою $a - Np$, или $p.\left(\frac{a}{p} - N\right)$, будетъ имѣть численную величину, не превосходящую $\frac{a}{p}$.

§ 12. Разсмотрѣвши числа, сравнимая съ a по модулю p, обращаемся къ рѣшенію сравненія $fx \equiv 0$ (*мод.* p).

www.rcin.org.pl

Мы видѣли, что если этому сравненію удовлетворяетъ a, то ему удовлетворяетъ и всякое число X, для котораго имѣетъ мѣсто сравненіе $X \equiv a \pmod{p}$. Этихъ чиселъ безконечное множество: но всѣ они, сравнимыя съ однимъ и тѣмъ же числомъ a и, слѣдоват., между собою по модулю p, принимаются за одно рѣшеніе сравненія $fx \equiv 0 \pmod{p}$. По этому мы будемъ говорить, что сравненіе $fx \equiv 0 \pmod{p}$ имѣетъ одно только рѣшеніе, если ему удовлетворяютъ только числа, для которыхъ $x \equiv a \pmod{p}$; мы будемъ говорить, что сравненіе $fx \equiv 0 \pmod{p}$ имѣетъ два рѣшенія, если ему кромѣ чиселъ, опредѣляемыхъ сравненіемъ

$$x \equiv a \pmod{p},$$

удовлетворяютъ другія, получаемыя изъ сравненія

$$x \equiv a_1 \pmod{p},$$

гдѣ a не $\equiv a_1 \pmod{p}$. И вообще, мы будемъ говорить, что сравненіе $fx \equiv 0 \pmod{p}$ имѣетъ n рѣшеній, если ему удовлетворяютъ только числа, опредѣляемыя сравненіями

$$x \equiv a,\ x \equiv a_1,\ x \equiv a_2, \ldots,\ x \equiv a_{n-1} \pmod{p},$$

гдѣ $a,\ a_1,\ a_2, \ldots a_{n-1}$ суть числа, не сравнимыя между собою по модулю p. На основаніи этого мы докажемъ слѣдующую теорему:

14. **Теорема.** *Сравненіе* $fx \equiv 0 \pmod{p}$ *имѣетъ столько рѣшеній, сколько чиселъ въ ряду* $0, 1, 2, \ldots, p-1$ *ему удовлетворяетъ, и если эти числа суть* $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \ldots, \alpha_n$, *то* $x \equiv \alpha_1,\ x \equiv \alpha_2,\ x \equiv \alpha_3, \ldots, x \equiv \alpha_n \pmod{p}$ *суть рѣшенія сравненія* $fx \equiv 0 \pmod{p}$.

Доказательство. Въ § 10 видѣли, что, если $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \ldots, \alpha_n$ удовлетворяютъ сравненію $fx \equiv 0 \pmod{p}$, то ему удовлетворяютъ и всѣ числа, опредѣляемыя сравненіями:

$$x \equiv \alpha_1,\ x \equiv \alpha_2,\ x \equiv \alpha_3, \ldots\ x \equiv \alpha_n \pmod{p}.$$

Но не трудно доказать, съ одной стороны, что, кромѣ этихъ чиселъ, нѣтъ ни одного удовлетворяющаго сравненію $fx \equiv 0 \pmod{p}$, а съ другой, что числа $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \ldots, \alpha_n$ не сравнимы

www.rcin.org.pl

между собой по модулю p; откуда, по сказанному нами о числѣ рѣшеній сравненія $fx \equiv 0$ (*мод.* p), и будетъ слѣдовать предложенная теорема.

Для доказательства перваго, предположимъ, что какое либо число A удовлетворяетъ сравненію $fx \equiv 0$ (*мод.* p), не удовлетворяя ни одному изъ слѣдующихъ:

$$x \equiv \alpha_1,\ x \equiv \alpha_2,\ x \equiv \alpha_3, \ldots\ldots x \equiv \alpha_n \ (\text{мод. } p).$$

Если A удовлетворяетъ сравненію $fx \equiv 0$ (*мод.* p); то, по § 10, будетъ удовлетворять ему и всякое число, сравнимое съ нимъ по модулю p, а, слѣд., и наименьшій положительный вычетъ его. Называя этотъ вычетъ черезъ α, мы будемъ имѣть

$$A \equiv \alpha,\ f(\alpha) \equiv 0 \ (\text{мод. } p) \ldots\ldots\ldots (4)$$

и α, какъ наименьшій положительный вычетъ A по модулю p, будетъ заключаться въ ряду 0, 1, 2,....,$p-1$. Но если α заключается въ этомъ ряду и удовлетворяетъ сравненію $fx \equiv 0$ (*мод.* p), то α есть одно изъ чиселъ α_1, α_2, α_3,....,α_n: ибо, по положенію, α_1, α_2, α_3,....,α_n, суть единственныя числа ряда 0, 1, 2,....,$p-1$, удовлетворяющія сравненію $fx \equiv 0$ (*мод.* p). Но это невозможно: ибо, по (4), A удовлетворяетъ сравненію $x \equiv a$ (*мод.* p), между тѣмъ какъ, по положенію, оно не удовлетворяетъ ни одному изъ сравненій

$$x \equiv \alpha_1,\ x \equiv \alpha_2, \ldots, x \equiv \alpha_n \ (\text{мод. } p).$$

Переходимъ теперь къ доказательству, что числа $\alpha_1, \alpha_2, \ldots \alpha_n$ не сравнимы между собою по модулю p. Для этого допустимъ противное: пусть будетъ $\alpha_1 \equiv \alpha_2$ (*мод.* p). Изъ этого сравненія слѣдуетъ дѣлимость $\alpha_1 - \alpha_2$ на p, что не возможно; ибо α_1, α_2 числа положительныя и каждое изъ нихъ меньше p, вслѣдствіе чего разность ихъ будетъ имѣть численную величину меньше p и, слѣдовательно, не дѣлимую на p.

Такъ убѣждаемся мы въ справедливости теоремы, нами предложенной.

Чтобы показать приложеніе этой теоремы, возмемъ сравненіе $x^3 - x - 1 \equiv 0$ (*мод.* 5). Внося сюда вмѣсто x числа 0, 1, 2, 3, 4, мы убѣждаемся, что только 2 удовлетворяетъ раз-

www.rcin.org.pl

сматриваемому сравненію. Откуда заключается, что это сравненіе имѣетъ одно рѣшеніе $x \equiv 2$ (*мод.* 5).

Такимъ же образомъ для сравненія $x^2 - 3 \equiv 0$ (*мод.* 11) находимъ два рѣшенія $x \equiv 5$, $x \equiv 6$ (*мод.* 11); разсматривая же сравненіе $x^2 - 11 \equiv 0$ (*мод.* 3) убѣждаемся, что оно не имѣетъ ни одного рѣшенія.

ГЛАВА II.

О сравненіи первой степени.

§ 13. Общій видъ сравненій первой степени есть

$$ax - b \equiv 0 \ (\text{мод. } p),$$

гдѣ a, b какія нибудь числа положительныя, или отрицательныя, и p—число положительное. Сравненія этаго вида представляютъ два случая существенно отличныя одинъ отъ другаго; ихъ мы разсмотримъ отдѣльно. Первый случай, это—когда a и p числа относительно другъ друга простыя; второй,—когда они имѣютъ общаго множителя. Мы начнемъ съ перваго случая, при a и p простыхъ между собою, и докажемъ слѣдующую теорему:

15. **Теорема**. *Сравненіе* $ax - b \equiv 0$ (*мод.* p), *при* a *простомъ съ* p, *имѣетъ всегда одно рѣшеніе.*

Доказательство. Изъ доказаннаго нами въ параграфѣ 12 о числѣ рѣшеній сравненія $fx \equiv 0$ (*мод.* p) слѣдуетъ, что сравненіе $ax - b \equiv 0$ (*мод.* p) имѣетъ столько рѣшеній, сколько находится въ ряду 0, 1, 2, ... $p-1$ чиселъ, ему удовлетворяющихъ, или, что одно и тоже, сколько въ ряду $a.\ 0 - b$, $a.\ 1 - b$, $a.\ 2 - b$, ... , $a\ (p-1) - b$ чиселъ, дѣлящихся на p. Но какъ эти числа составляютъ ариѳметическую прогрессію, которой разность есть a, число простое съ p по положенію, число же членовъ равно p: то, по 10-й теоремѣ, здѣсь будетъ одинъ членъ, дѣлящійся на p. Слѣд., въ сдѣланномъ нами предположеніи срав-

www.rcin.org.pl

неніе $ax-b\equiv 0$ (*мод.* p) имѣетъ одно рѣшеніе, что и слѣдовало доказать.

Убѣдившись такимъ образомъ, что въ разсматриваемомъ нами случаѣ сравненіе $ax-b\equiv 0$ (*мод.* p) имѣетъ одно рѣшеніе, мы покажемъ теперь, какъ найдется оно. Въ настоящее время извѣстно нѣсколько способовъ рѣшать сравненіе $ax-b\equiv 0$ (*мод.* p). Замѣчательнѣйшіе изъ нихъ мы предложимъ въ послѣдствіи, говоря о свойствахъ чиселъ, на которыхъ они основываются. Здѣсь же замѣтимъ, что сравненіе $ax-b\equiv 0$ (*мод.* p) можетъ быть рѣшено по способу, предлагаемому въ Алгебрѣ для рѣшенія неопредѣленнаго уравненія $ax-pz=b$, отъ котораго сравненіе $ax-b\equiv 0$ (*мод.* p) отличается только знакоположеніемъ. Дѣйствительно, сравненіе $ax-b\equiv 0$ (*мод.* p) есть ничто иное, какъ выраженіе дѣлимости $ax-b$ на p, что можетъ быть представлено уравненіемъ $\frac{ax-b}{p}=z$, предполагая z произвольнымъ цѣлымъ числомъ. Откуда для опредѣленія x и z получаемъ уравненіе $ax-pz=b$.

Итакъ рѣшеніемъ уравненія $ax-pz=b$ опредѣлятся значенія x, удовлетворяющія сравненію $ax-b\equiv 0$ (*мод.* p). Эти значенія x, какъ извѣстно, выражаются такъ: $x=\alpha+np$, гдѣ α одна изъ величинъ x, способная удовлетворить уравненію $ax-pz=b$; n—число произвольное. По принятому нами знакоположенію, мы вмѣсто того, чтобы писать $x=\alpha+np$, предполагая n произвольнымъ числомъ, можемъ написать $x\equiv\alpha$ (*мод.* p) и въ этомъ видѣ мы будемъ всегда представлять рѣшеніе сравненія $ax-b\equiv 0$ (*мод.* p).

Напримѣръ, имѣя для рѣшенія сравненіе $7x-3\equiv 0$ (*мод.* 10), мы возмемъ уравненіе $7x-10z=3$. Рѣшая это уравненіе, мы найдемъ для значенія x и z такія выраженія: $x=9+10n$, $z=6+7n$; откуда для рѣшенія сравненія $7x-3\equiv 0$ (*мод.* 10) получаемъ

$$x\equiv 9 \text{ (мод. 10)}.$$

§ 14. На основаніи теоремъ, доказанныхъ нами относительно сравненій вообще и въ особенности относительно сравненій вида $ax-b\equiv 0$ (*мод.* p), могутъ быть доказаны двѣ любопыт-

www.rcin.org.pl

ныя теоремы относительно чиселъ, которыя послужатъ намъ также для рѣшенія сравненій первой степени. Этими-то свойствами чиселъ мы теперь и займемся.

16. **Теорема.** *Если p число простое и не дѣлитъ a, то* $a^{p-1} \equiv 1$ (*мод.* p).

Доказательство. Пусть будутъ $r_1, r_2, r_3, \ldots, r_{p-1}$ наименьшіе положительные вычеты чиселъ $1a, 2a, 3a, \ldots\ldots, (p-1)a$ по модулю p; они будутъ удовлетворять сравненіямъ

$$1a \equiv r_1,\ 2a \equiv r_2,\ 3a \equiv r_3, \ldots\ldots, (p-1)\ a \equiv r_{p-1} \ (\text{мод. } p) \ldots\ldots\ldots (5)$$

Перемножая эти сравненія между собою, мы найдемъ

$$1.\ 2.\ 3 \ldots\ldots (p-1)\ a^{p-1} \equiv r_1\ r_2\ r_3 \ldots\ldots r_{p-1} \ (\text{мод. } p) \ldots\ldots\ldots (6)$$

Но нетрудно убѣдиться, что произведенія

$$1.\ 2.\ 3 \ldots\ldots (p-1),\ r_1\ r_2\ r_3 \ldots\ldots r_{p-1}$$

равны между собою.

Для этого мы замѣчаемъ, что $r_1, r_2, r_3, \ldots\ldots, r_{p-1}$, какъ наименьшіе положительные вычеты чиселъ $1a$, $2a$, $3a, \ldots, (p-1)\ a$ по модулю p, могутъ имѣть только значенія

$$0,\ 1,\ 2, \ldots\ldots, p-1.$$

Притомъ ни одно изъ нихъ не можетъ быть нулемъ; ибо въ противномъ случаѣ сравненіе (6) предполагало бы дѣлимость

$$1.\ 2.\ 3 \ldots\ldots (p-1)\ a^{p-1},$$

на p, между тѣмъ какъ $1, 2, 3, \ldots\ldots p-1$ и a числа простыя съ p.

Итакъ, числа $r_1, r_2, r_3, \ldots\ldots, r_{p-1}$ могутъ имѣть только значенія

$$1,\ 2,\ 3, \ldots\ldots, p-1.$$

Но между числами $r_1, r_2, r_3, \ldots\ldots, r_{p-1}$ не можетъ быть двухъ, имѣющихъ одну и ту-же величину: ибо, предполагая $r_m \equiv r_\mu \equiv b$, мы, по (5), имѣли бы

www.rcin.org.pl

$$ma \equiv b,\ \mu a \equiv b \ (\textit{мод. } p),$$

гдѣ m и μ два числа изъ ряда 1, 2, 3,.....$p-1$, и слѣд. для сравненія $ax \equiv b$ (*мод.* p) нашли бы два рѣшенія

$$x \equiv m,\ x \equiv \mu \ (\textit{мод. } p),$$

что не возможно.

Отсюда слѣдуетъ, что въ составъ ряда

$$r_1,\ r_2,\ r_3,\ldots\ldots,r_{p-1}.$$

могутъ входить только числа

$$1,\ 2,\ 3,\ldots\ldots,p-1$$

и каждое только по одному разу.

Но такъ какъ въ рядахъ

$$r_1,\ r_2,\ r_3,\ldots\ldots,r_{p-1},$$
$$1,\ 2,\ 3,\ldots\ldots,p-1$$

одинаковое число членовъ, то въ первый должны входить всѣ вторые; слѣд. эти ряды составлены изъ однихъ и тѣхъ-же чиселъ и притомъ взятыхъ по одному разу; а потому произведеніе членовъ перваго ряда равно произведенію членовъ второго. Убѣдясь въ этомъ, мы можемъ въ (6) замѣнить произведеніе $r_1 r_2 r_3 \ldots\ldots r_{p-1}$ произведеніемъ $1 \cdot 2 \cdot 3 \ldots\ldots$ $(p-1)$.

Такимъ образомъ находимъ

$$1.2.3.....(p-1)\ a^{p-1} \equiv 1.2.3.....(p-1) \ (\textit{мод. } p).$$

Но члены этого сравненія могутъ быть сокращены на 2, 3, ... $p-1$; ибо всѣ эти числа, будучи меньше p, будутъ относительно его простыя. Выполнивъ же эти сокращенія, найдемъ

$$a^{p-1} \equiv 1 \ (\textit{мод. } p),$$

что и слѣдовало доказать.

Такъ, для $p=7$, $a=2$, будетъ $2^{7-1} \equiv 1$ (*мод.* 7), въ справедливости чего мы убѣждаемся, замѣтивъ, что 2^6 равно 64 и $64 \equiv 1$ (*мод.* 7).

Эта теорема есть одна изъ замѣчательнѣйшихъ въ Теоріи чиселъ и имѣетъ весьма важныя приложенія. Она открыта Фер-

www.rcin.org.pl

матомъ; но предложена имъ была безъ доказательства. Первый, успѣвшій ее доказать, былъ Эйлеръ; онъ же далъ слѣдующую теорему болѣе общую.

17. **Теорема**. *Если n означаетъ, сколько чиселъ простыхъ съ N и меньшихъ N, и a число простое съ N, то* $a^n \equiv 1$ (*мод. N*).

Доказательство. Называя черезъ $N_1, N_2, \ldots, N_n$ числа простыя съ N и меньшія N, чрезъ $r_1, r_2, \ldots\ldots, r_n$ наименьшіе положительные вычеты чиселъ $aN_1, aN_2, \ldots\ldots, aN_n$ по модулю N, имѣемъ

$$aN_1 \equiv r_1,\ aN_2 \equiv r_2, \ldots\ldots aN_n \equiv r_n \ (\text{мод. } N), \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (7)$$

что, по перемноженіи, даетъ

$$N_1 N_2 \ldots\ldots N_n a^n \equiv r_1 r_2 r_3 \ldots\ldots r_n \ (\text{мод. } N) \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (8)$$

Но не трудно убѣдиться, что произведенія $N_1 N_2 \ldots\ldots\ldots N_n$, $r_1 r_2 \ldots\ldots r_n$ равны.

Такъ какъ $r_1 . r_2 \ldots\ldots r_n$ суть наименьшіе положительные вычеты чиселъ $aN_1, aN_2, \ldots\ldots aN_n$ по модулю N, то они могутъ имѣть только значенія

$$0, 1, 2, \ldots\ldots\ldots\ldots, N-1$$

и изъ этихъ значеній для $r_1, r_2, r_3, \ldots\ldots, r_n$ возможны только тѣ, которыя не имѣютъ общаго множителя съ N; ибо сравненіе (8), котораго первая часть состоитъ изъ произведенія простыхъ чиселъ съ N, предполагаетъ, что N и $r_1, r_2, r_3, \ldots\ldots r_n$ не имѣютъ общаго дѣлителя.

Отсюда слѣдуетъ, что для $r_1, r_2, r_3, \ldots\ldots r_n$ возможны только значенія

$$N_1, N_2 \ldots\ldots\ldots N_n.$$

Притомъ между числами $r_1, r_2, r_3, \ldots\ldots r_n$ не можетъ быть двухъ равныхъ между собою; ибо, при равенствѣ $r_m = r_\mu = b$, мы, по (7), имѣли бы

$$a\mu \equiv b,\ am \equiv b \ (\text{мод } N),$$

www.rcin.org.pl

грѣ m, μ два какія нибудь числа изъ ряда 1, 2,....., p—1, и слѣд. для сравненія $ax \equiv b$ (*мод.* N) мы нашли бы два рѣшенія, что не возможно.

Отсюда слѣдуетъ, что въ составъ ряда

$$r_1,\ r_2,\ r_3,.....,r_n$$

входятъ одни лишь числа

$$N_1,\ N_2,.....,N_n$$

и каждое только по одному разу. Но какъ въ этихъ рядахъ одинаковое число членовъ, то въ первый должны взойти всѣ числа втораго и слѣд. эти ряды составлены изъ однихъ и тѣхъ же чиселъ, притомъ взятыхъ по одному разу, а потому произведеніе чиселъ перваго ряда равно произведенію чиселъ втораго.

Убѣдясь въ этомъ, мы можемъ въ (8) произведеніе $r_1\ r_2.....r_n$ замѣнить произведеніемъ $N_1N_2.....N_n$. Такимъ образомъ находимъ

$$N_1N_2.....N_n a^n \equiv N_1N_2.....N_n \ (\text{мод. } N).$$

Но здѣсь члены сравненія могутъ быть сокращены на общихъ множителей $N_1, N_2,....., N_n$, ибо числа эти суть простыя съ N. Выполнивъ же эти сокращенія, найдемъ

$$a^n \equiv 1 \ (\text{мод. } N),$$

что и слѣдовало доказать.

Такъ, если $N=20$, $a=3$, то, по 12-й теоремѣ, для величины n, означающаго сколько простыхъ чиселъ съ 20 и меньшихъ 20, находимъ 8 и, по доказанной нами теоремѣ, будетъ $3^8 \equiv 1$ (*мод.* 20). Въ справедливости этого сравненія мы убѣждаемся, находя, что $3^8 = 6561$ и $6561 \equiv 1$ (*мод.* 20).

§ 15. На основаніи этихъ теоремъ, не трудно найти рѣшеніе сравненія $ax - b \equiv 0$ (*мод.* p), гдѣ a по прежнему предполагаемъ простымъ съ p.

Начнемъ съ частнаго случая—p простаго. Такъ какъ a, по положенію, число простое съ p и p само по себѣ простое, то

www.rcin.org.pl

a не дѣлится на p (§ 3) и, по теоремѣ 16-й, которую вездѣ впослѣдствіи будемъ употреблять подъ именемъ теоремы Фермата, будетъ имѣть мѣсто сравненіе $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, что, по умноженіи на b, можетъ быть такъ представлено

$$a \cdot ba^{p-2} - b \equiv 0 \pmod{p}.$$

Сличая же это сравненіе съ даннымъ для рѣшенія $ax - b \equiv 0 \pmod{p}$, мы замѣчаемъ, что послѣднему удовлетворяетъ $x = ba^{p-2}$; а потому рѣшеніе его представится формулою

$$x \equiv ba^{p-2} \pmod{p}.$$

Такъ опредѣляются рѣшенія сравненія

$$xa - b \equiv 0 \pmod{p},$$

при p простомъ и недѣлящемъ a.

Напримѣръ, для рѣшенія сравненія $3x - 8 \equiv 0 \pmod{5}$ найдемъ

$$x \equiv 8 \cdot 3^{5-2} \pmod{5},$$

или

$$x \equiv 216 \pmod{5}.$$

Это рѣшеніе сравненія $3x - 8 \equiv 0 \pmod{5}$ мы можемъ представить проще, замѣняя 216 его наименьшимъ положительнымъ вычетомъ по модулю 5. Такъ находимъ

$$x \equiv 1 \pmod{5}$$

для рѣшенія сравненія $3x - 8 \equiv 0 \pmod{5}$.

Переходимъ теперь къ рѣшеніямъ сравненій, которыхъ модуль число составное. Пусть дано будетъ сравненіе $ax - b \equiv 0 \pmod{N}$, гдѣ N какое нибудь число, число же a, какъ предполагали, простое съ N. По теоремѣ Эйлера (теорема 17), мы будемъ имѣть

$$a^n \equiv 1 \pmod{N},$$

означая черезъ n, сколько чиселъ меньшихъ N и простыхъ съ N.

Это сравненіе, по умноженіи на b, можетъ быть такъ представлено

$$a \cdot b\, a^{n-1} b \equiv 0 \pmod{N}.$$

www.rcin.org.pl

Сличая это сравненіе съ даннымъ для рѣшенія $ax—b \equiv 0$ (*мод.* N), находимъ, что ему удовлетворяетъ

$$x \equiv ba^{n-1} \text{ (мод. } N).$$

Что касается до значенія n, опредѣляющаго сколько чиселъ простыхъ съ N и меньшихъ N, то, по 12-й теоремѣ, мы его легко найдемъ. На основаніи этой теоремы мы находимъ, что n равно

$$\alpha^m \beta^n \gamma^p \ldots \frac{\alpha-1}{\alpha} \cdot \frac{\beta-1}{\beta} \cdot \frac{\gamma-1}{\gamma} \ldots,$$

если N разложеніемъ на простые множители приводится къ $\alpha^m \beta^n \gamma^p \ldots$. Такимъ образомъ мы убѣждаемся, что вообще рѣшеніе сравненія

$$ax—b \equiv 0 \text{ (мод. } \alpha^m \beta^n \gamma^p \ldots),$$

гдѣ α, β, γ, ... различныя простыя числа, опредѣляется слѣдующею формулою

$$x \equiv ba^{\alpha^m \beta^n \gamma^p \ldots \frac{\alpha-1}{\alpha} \cdot \frac{\beta-1}{\beta} \cdot \frac{\gamma-1}{\gamma} \ldots -1} \text{ (мод. } \alpha^m \beta^n \gamma^p \ldots)$$

Такъ, для рѣшенія сравненія $2x—7 \equiv 0$ (*мод.* 15), гдѣ $15 = 3 \cdot 5$, находимъ

$$x \equiv 2.7^{3.5 \cdot \frac{3-1}{3} \cdot \frac{5-1}{5} - 1} \text{ (мод. 15)},$$

или

$$x \equiv 896 \text{ (мод. 15)}.$$

Замѣняя же здѣсь 896 его наименьшимъ положительнымъ вычетомъ по модулю 15, мы это сравненіе представимъ такъ

$$x \equiv 11 \text{ (мод. 15)}.$$

Этимъ мы оканчиваемъ изслѣдованія сравненій первой степени, въ которыхъ модуль и коэффиціентъ неизвѣстнаго суть числа относительно другъ друга простыя и переходимъ къ тому случаю, когда эти числа имѣютъ общаго множителя.

§ 16. По свойству сравненій, показанному нами въ § 10, сравненіе $ax \equiv b$ (*мод.* p) невозможно, если a и p имѣютъ об-

www.rcin.org.pl

щаго множителя, который не дѣлитъ b. Откуда слѣдуетъ такая теорема:

18. **Теорема**. *Сравненіе* $ax-b\equiv 0$ (*мод.* p) *не имѣетъ рѣшенія, если общій множитель* a *и* p *не дѣлитъ* b.

Такъ убѣждаемся, что сравненія $20x-7\equiv 0$ (*мод.* 15), $6x-5\equiv 0$ (*мод.* 9) не имѣютъ рѣшенія.

Обращаемся теперь къ сравненіямъ вида $ax-b\equiv 0$ (*мод.* p), когда общіе множители a и p дѣлятъ b Для этихъ сравненій докажется слѣдующая теорема:

19. **Теорема**. *Если* a *и* p *имѣютъ общимъ наибольшимъ дѣлителемъ* d *и* d *дѣлитъ* b, *то сравненіе* $ax-b\equiv 0$ (*мод.* p) *имѣетъ* d *рѣшеній, которыя могутъ быть такъ представлены:* $x\equiv\alpha$, $x\equiv\alpha+\frac{p}{d}$, $x\equiv\alpha+\frac{2p}{d}$, ... $x\equiv\alpha+\frac{(p-1)}{d}p$ (*мод.* p), *гдѣ* α *есть число* $<\frac{p}{d}$ *и не* <0, *удовлетворяющее сравненію* $\frac{a}{d}x-\frac{b}{d}\equiv 0$ $\left(\text{мод.}\frac{p}{d}\right)$

Доказательство. Если d есть общій наибольшій дѣлитель чиселъ a и p и на него дѣлится b, то сравненіе

$$ax-b\equiv 0 \text{ (мод. } p),$$

по сокращеніи его членовъ и модуля на d, будетъ

$$\frac{a}{d}x-\frac{b}{d}\equiv 0 \left(\text{мод.}\frac{p}{d}\right),$$

гдѣ $\frac{a}{d}$, $\frac{p}{d}$, $\frac{b}{d}$ числа цѣлыя; притомъ, какъ нетрудно убѣдиться, числа $\frac{a}{d}$, $\frac{p}{d}$ будутъ простыя относительно другъ друга: ибо въ противномъ случаѣ d не было бы общимъ наибольшимъ дѣлителемъ a и p. Но при $\frac{a}{d}$, $\frac{b}{d}$ простыхъ между собою, какъ видѣли, сравненіе

$$\frac{a}{d}x-\frac{b}{d}\equiv 0 \left(\text{мод.}\frac{p}{d}\right)$$

имѣетъ всегда рѣшеніе, которое по пріемамъ, показаннымъ нами, легко найдется. Пусть же будетъ α число, заключающееся

GABINET MATEMATYCZNY
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

www.rcin.org.pl

въ ряду 0, 1, 2, ... , $\frac{p}{d} - 1$ и удовлетворяющее сравненію

$$\frac{a}{d}x - \frac{b}{d} \equiv 0 \left(мод. \frac{p}{d}\right);$$

всѣ числа, удовлетворяющія этому сравненію, найдутся изъ слѣдующаго

$$x \equiv a \left(мод. \frac{p}{d}\right).$$

Эти же числа будутъ удовлетворять и сравненію

$$ax - b \equiv 0 \ (мод.\ p),$$

которое отъ

$$\frac{a}{d}x - \frac{b}{d} \equiv 0 \left(мод. \frac{p}{d}\right)$$

отличается только множителемъ d, общимъ модулю и членамъ сравненія.

Итакъ, всѣ числа, удовлетворяющія сравненію

$$ax - b \equiv 0 \ (мод.\ p),$$

опредѣляются такъ

$$x \equiv \alpha \left(мод. \frac{p}{d}\right).$$

На основаніи этого, не трудно показать, сколько въ ряду

$$0, 1, 2, \ldots\ldots\ldots p-1$$

чиселъ, удовлетворяющихъ сравненію $ax - b \equiv 0$ ($мод.\ p$), чѣмъ и опредѣлится число рѣшеній этого сравненія. Для этаго мы находимъ общую формулу чиселъ, удовлетворяющихъ сравненію

$$x \equiv \alpha \left(мод. \frac{p}{d}\right)$$

По сказанному нами въ § 11, находимъ, что формула, опредѣляющая эти числа, есть

$$x \equiv \alpha - N\frac{p}{d}.$$

Но эта формула, гдѣ, какъ видѣли, α не < 0 и $< \frac{p}{d}$ — даетъ

www.rcin.org.pl

для x значенія, не выходящія изъ предѣловъ 0 и $p-1$ только при $N=0, -1, -2, \ldots\ldots -(d-2), -(d-1)$, поэтому въ ряду 0, 1, 2,.....,$p-1$ числа, удовлетворяющія сравненію $x \equiv \alpha \left(\text{мод.} \frac{p}{d}\right)$ и слѣд. сравненію $ax-b \equiv$, (*мод.* p), суть

$$\alpha,\ \alpha+\frac{p}{d},\ \alpha+\frac{2p}{d},\ \alpha+\frac{3p}{d},\ \ldots\ldots,\alpha+\frac{(d-1)p}{d}.$$

А такъ какъ ихъ числомъ d, то, по 14-й теоремѣ, сравненіе $ax-b \equiv 0$ (*мод.* p) имѣетъ d рѣшеній, которыя суть:

$$x \equiv \alpha,\ x \equiv \alpha+\frac{p}{d}, x \equiv \alpha+\frac{2p}{d}, \ldots\ldots x \equiv \alpha+\frac{(d-1)p}{d} \ (\text{мод. } p),$$

откуда и слѣдуетъ предложенная теорема.

Такъ, сравненіе $15x-9 \equiv 0$ (*мод.* 12), въ которомъ коэффиціентъ x и модуль имѣютъ общимъ наибольшимъ дѣлителемъ 3 и членъ, не содержащій x, дѣлится на 3, имѣетъ три рѣшенія. Чтобы найти ихъ, мы сокращаемъ въ данномъ сравненіи члены и модуль на 3; такимъ образомъ получаемъ сравненіе

$$5x-3 \equiv 0 \ (\text{мод. } 4).$$

На основаніи сказаннаго нами въ предыщемъ параграфѣ, мы находимъ, что рѣшеніе его есть

$$x \equiv 3.5^{2^{\frac{2-1}{2}}-1} \ (\text{мод. } 4),$$

$$x \equiv 15 \ (\text{мод. } 4).$$

Замѣняя здѣсь 15 его наименьшимъ положительнымъ вычетомъ по модулю 4, находимъ

$$x \equiv 3 \ (\text{мод. } 4).$$

Отсюда для рѣшенія предложеннаго сравненія получаемъ

$$x \equiv 3,\ x \equiv 7,\ x \equiv 11 \ (\text{мод. } 12).$$

www.rcin.org.pl

ГЛАВА III.

О сравненіяхъ высшихъ степеней вообще.

§ 17. Въ этой статьѣ мы ограничимся разсмотрѣніемъ сравненій съ простыми модулями. Поэтому общій видъ сравненій, которыми будемъ заниматься, представится такъ

$$Ax^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \ldots + Hx + S \equiv 0 \pmod{p}.$$

гдѣ p простое число, A, B, C,.....H, S какія нибудь числа. Прежде чѣмъ приступимъ къ изслѣдованію ихъ рѣшеній, замѣтимъ, что въ нихъ коеффиціентъ высшей степени x можетъ быть сдѣланъ единицею. Въ самомъ дѣлѣ, въ сравненіи

$$Ax^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \ldots + Hx + S \equiv 0 \pmod{p}$$

можетъ быть откинутъ всякій членъ, котораго коеффиціентъ дѣлится на p. Такъ, если C дѣлится на p, то, по нашему знакоположенію, будетъ

$$C \equiv 0 \pmod{p},$$

что по умноженіи на x^{m-2} даетъ

$$Cx^{m-2} \equiv o \pmod{p}.$$

Вычитая же это сравненіе изъ

$$Ax^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \ldots + Hx + S \equiv 0 \pmod{p},$$

мы освободимъ послѣднее отъ члена Cx^{m-2}. Тоже можетъ быть сдѣлано со всякимъ другимъ членомъ, если коеффиціентъ его дѣлится на p. Предположимъ теперь, что сравненіе

$$Ax^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \ldots + Hx + S \equiv 0 \pmod{p}$$

освобождено отъ членовъ, которыхъ коеффиціенты дѣлятся на p, и Ax^m есть членъ съ высшею степенью x. Въ этомъ слу-

www.rcin.org.pl

чаѣ A, не будучи кратнымъ p, будетъ простое относительно его; а потому найдется число α, для котораго будетъ

$$A\alpha - 1 \equiv 0 \ (мод.\ p).$$

Умножая это сравненіе послѣдовательно на

$$Bx^{m-1},\ Cx^{m-2},\ldots,\ Hx,S,\ \text{найдемъ}$$
$$AB\alpha x^{m-1} - Bx^{m-1} \equiv 0 \ (мод.\ p).$$
$$AC\alpha x^{m-2} - Cx^{m-2} \equiv 0,$$
$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$
$$AH\alpha x - Hx \equiv 0,$$
$$AS\alpha - S \equiv 0.$$

Эти сравненія, по сложеніи съ разсматриваемымъ нами

$$Ax^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \ldots + Hx + S \equiv 0 \ (мод.\ p),$$

даютъ

$$Ax^m + AB\alpha x^{m-1} + AC\alpha x^{m-2} + \ldots + AH\alpha x + AS\alpha \equiv 0 \ (мод.\ p).$$

Но такъ какъ A число простое съ p, то это сравненіе можетъ быть сокращено на A; въ слѣдствіе чего оно приведется къ слѣдующему

$$x^m + B\alpha x^{m-1} + C\alpha x^{m-2} + \ldots + H\alpha x + S\alpha \equiv 0 \ (мод.\ p),$$

гдѣ коеффиціентъ высшей степени x есть 1, что и слѣдовало сдѣлать.

Такъ, для преобразованія сравненія $2x^3 + 3x + 7 \equiv 0$ (*мод.* 11) въ другое, въ которомъ бы коеффиціентъ высшей степени x былъ равенъ единицѣ, мы должны найти число α, для котораго $2\alpha - 1 \equiv 0$ (*мод.* 11). Такое число есть 6. Послѣ того мы къ данному сравненію должны приложить слѣдующія:

$$2.3.6x - 3x \equiv 0 \ (мод.\ 11),$$
$$2.7.6 - 7 \equiv 0.$$

Сложивши эти сравненія съ $2x^3 + 3x + 7 \equiv 0$ (*мод.* 11) и сдѣлавъ приведеніе, находимъ

$$2x^3 + 2.3.6x + 2.6.7 \equiv 0 \ (мод.\ 11);$$

откуда, по сокращеніи на 2, получаемъ сравненіе

$$x^3 + 18x + 42 \equiv 0 \ (мод.\ 11),$$

www.rcin.org.pl

гдѣ коэффиціентъ высшей степени x есть 1.

§ 18. Относительно сравненій высшихъ степеней докажется слѣдующая теорема:

20. **Теорема**. *При p простомъ, сравненіе*

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \ldots\ldots + Hx + S \equiv 0 \pmod{p}$$

не можетъ имѣть болѣе m рѣшеній.

Доказательство. Для доказательства этой теоремы мы замѣчаемъ, что, по § 13-му, она справедлива для $m=1$ т. е. для сравненій первой степени. Чтобы доказать справедливость ея для всякой другой степени, докажемъ, что она должна быть справедлива для сравненій степени m, если справедлива она для сравненій степени $m-1$.

Чтобы убѣдиться въ этомъ, мы допустимъ противное; допустимъ, что сравненіе

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \ldots\ldots + Hx + S \equiv 0 \pmod{p}$$

имѣетъ болѣе m рѣшеній, между тѣмъ какъ сравненіе такого же вида степени $m-2$ болѣе $m-1$ рѣшеній имѣть не можетъ, и докажемъ несообразность этого.

Мы видѣли, что число рѣшеній всякаго сравненія съ модулемъ p опредѣляется числомъ чиселъ въ ряду

$$0, 1, 2, \ldots, p-1,$$

удовлетворяющихъ сравненію. Поэтому сравненіе

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \ldots\ldots + Hx + S \equiv 0 \pmod{p}$$

можетъ имѣть болѣе m рѣшеній только въ томъ случаѣ, когда ему удовлетворяетъ $m+1$ чиселъ изъ ряда

$$0, 1, 2, \ldots\ldots p-1.$$

Пусть эти числа будутъ

$$a, a_1, a_2, \ldots\ldots, a_m.$$

Возмемъ одно изъ нихъ, напримѣръ a, и разностію $x - a$ будемъ дѣлить

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \ldots\ldots + Hx + S;$$

частное, очевидно, будетъ вида

www.rcin.org.pl

$$a^{m-1}+B_1x^{m-2}+C_1x^{m-3}+.....+H_1x+S_1;$$

въ остаткѣ будетъ нѣкоторое число R. Приравнивая дѣлимое произведенію дѣлителя на частное, сложенному съ остаткомъ, найдемъ

$$x^m+Bx^{m-1}+Cx^{m-2}+.....+Hx+S=$$
$$(x-a)\ (x^{m-1}+B_1x^{m-2}+C_1x^{m-3}+....,+H_1x+S_1)+R.$$

Въ слѣдствіе чего сравненіе

$$x^m+Bx^{m-1}+Cx^{m-2}+.....+Hx+S\equiv 0\ (\text{мод. } p)$$

представится такъ

$$(x-a)\ (x^{m-1}+B_1x^{m-2}+C_1x^{m-3}+.....+H_1x+S_1)+R\equiv 0\ (\text{мод. } p).$$

Дѣлая здѣсь $x=a$, гдѣ a, по положенію, есть одно изъ чиселъ, удовлетворяющихъ разсматриваемому нами сравненію, найдемъ

$$R\equiv 0\ (\text{мод. } p);$$

вычитая же это сравненіе изъ предыдущаго, получаемъ

$$(x-a)(x^{m-1}+B_1x^{m-2}+C_1x^{m-3}+.....H_1x+S_1)\equiv 0\ (\text{мод. } p).....(9)$$

Вотъ къ какому виду приводится разсматриваемое нами сравненіе.

Посмотримъ теперь, могутъ ли удовлетворить всѣ ему $m+1$ чиселъ

$$a, a_1, a_2, \ldots, a_m,$$

если сравненіе

$$x^{m-1}+B_1x^{m-2}+C_1x^{m-3}+.....+H_1x+S_1\equiv 0\ (\text{мод. } p),$$

степени $m-1$, не имѣетъ болѣе $m-1$ рѣшеній. Если это сравненіе не имѣетъ болѣе $m-1$ рѣшеній, то всѣ m чиселъ

$$a, a_1, \ldots, a_m,$$

взятыя нами изъ ряда 0, 1, 2, ..., $p-1$, не могутъ ему удовлетворять. Пусть будетъ a_1 то число, которое ему не удовлетворяетъ, въ этомъ случаѣ

$$a_1{}^{m-1}+B_1a_1{}^{m-2}+C_1a_1{}^{m-3}+.....+H_1a_1+S_1,$$

не будучи сравнимо съ нулемъ по модулю p, представитъ число, недѣлящееся на p, и слѣд. простое съ p; ибо p число само по себѣ простое. То-же имѣетъ мѣсто относительно разности a_1-a: ибо числа a_1 и a, будучи не болѣе $p-1$ и не менѣе 0,

www.rcin.org.pl

въ разности не могутъ дать число, дѣлящееся на p. Итакъ числа

$$a_1 - a,\ a_1^{m-1} + B_1 a_1^{m-2} + H_1 a_1^{m-3} + \ldots\ldots + S_1 a_1 + H_1$$

простыя относительно p; слѣд. простое число относительно p и произведеніе ихъ

$$(a_1 - a)(a_1^{m-1} + B a_1^{m-2} + H_1 a_1^{m-3} + \ldots\ldots + S_1 a_1 + H_1);$$

откуда, въ противность допущенному нами, слѣдуетъ, что $x = a_1$ не удовлетворяетъ сравненію (9). Слѣд. сдѣланное нами допущеніе невозможно, что и слѣдовало доказать.

На основаніи этой теоремы можно доказать слѣдующую болѣе общую:

21. **Теорема.** *Если въ сравненіи*

$$Ax^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \ldots\ldots + Hx + S \equiv 0 \pmod{p}$$

не всѣ коэффиціенты дѣлятся на p, то оно болѣе m рѣшеній имѣть не можетъ.

Доказательство. Мы видѣли въ § 17, что въ сравненіи

$$Ax^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \ldots\ldots + Hx + S \equiv 0 \pmod{p}$$

могутъ быть опущены всѣ члены, которыхъ коеффиціенты дѣлятся на p. Такимъ опущеніемъ членовъ сравненіе

$$Ax^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \ldots\ldots + Hx + S \equiv 0 \pmod{p}$$

приведется къ тождеству

$$0 \equiv 0 \pmod{p},$$

если всѣ коеффиціенты A, B, C, ... H, S суть кратные p. Въ противномъ случаѣ сравненіе

$$Ax^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \ldots\ldots + Hx \equiv 0 \pmod{p}$$

приведется къ другому, котораго коеффиціенты не будутъ дѣлиться на p. Дѣлая въ этомъ сравненіи, по 17, коеффиціентъ высшей степени равнымъ единицѣ, мы, по предыдущей теоремѣ, заключимъ, что оно не имѣетъ болѣе рѣшеній, чѣмъ находится единицъ въ показателѣ его степени; а слѣд. не имѣетъ болѣе m рѣшеній: ибо, очевидно, сравненіе, получаемое изъ

www.rcin.org.pl

$$Ax^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \ldots + Hx + S \equiv 0 \pmod{p}$$

опущеніемъ какихъ бы то нибыло членовъ, не можетъ быть степени болѣе m; откуда и слѣдуетъ предложенная намп теорема.

§ 19. На основаніи этой теоремы могутъ быть доказаны многія любопытныя свойства чиселъ.

Такъ можно доказать слѣдующую теорему:

22. **Теорема.** *Коэффиціенты всѣхъ степеней x въ разложеніи выраженія*

$$(x-1)(x-2)(x-3)\ldots(x-\overline{p-1})\ (-x^{p-1}+1)$$

дѣлятся на p, если p число простое.

Доказательство. Выраженіе

$$(x-1)(x-2)(x-3)\ldots(x-\overline{p-1})$$

обращается въ нуль, при $x = 1, 2, 3, \ldots, p-1$. Слѣд. всѣ эти величины x удовлетворяютъ сравненію

$$(x-1)(x-2)(x-3)\ldots(x-\overline{p-1}) \equiv 0 \pmod{p}.$$

По теоремѣ же Фермата эти числа удовлетворяютъ сравненію

$$x^{p-1} - 1 \equiv 0 \pmod{p}.$$

Вычитая это сравненіе изъ предыдущаго, мы находимъ такое сравненіе

$$(x-1)(x-2)(x-3)\ldots(x-\overline{p-1}) - x^{p-1} + 1 \equiv 0 \pmod{p},$$

которому также будутъ удовлетворять числа $1, 2, 3, \ldots, p-1$, ибо оно получено изъ сравненій, которымъ числа $1, 2, 9, \ldots, p-1$ удовлетворяютъ. Если же сравненію

$$(x-1)(x-2)(x-3)\ldots(x-\overline{p-1}) - x^{p-1} + 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

удовлетворяютъ числа $1, 2, 3, \ldots, p-1$, то оно имѣетъ $p-1$ рѣшеній

$$x \equiv 1,\ x \equiv 2,\ x \equiv 3, \ldots, x \equiv p-1 \pmod{p}.$$

А это, по предыдущей теоремѣ, не иначе можетъ имѣть мѣсто, какъ при дѣлимости на p всѣхъ коэффиціентовъ въ сравненіи

$$(x-1)(x-2)(x-3)\ldots(x-\overline{p-1}) - x^{p-1} + 1 \equiv 0 \pmod{p};$$

www.rcin.org.pl

ибо это сравненіе, какъ не трудно замѣтить, степени $p-2$; откуда и слѣдуетъ предложенная нами теорема.

Посмотримъ теперь, къ какимъ сравненіямъ приводитъ насъ эта теорема. Для этого мы замѣчаемъ, что выраженіе

$$(x-1)\,(x-2)\,(x-3)\ldots.(x-p-1)-x^{p-1}+1,$$

по выполненіи умноженій и приведеніи членовъ, будетъ

$$-(1+2+3+\ldots.+p-1)x^{p-2}+(1.2+1.3+2.3+\ldots.)x^{p-3}-$$
$$(1.2.3+2.3.4+\ldots.)\,x^{p-4}+\ldots.+(-1)^{p-1}1.2.3\ldots.(p-1)+1;$$

слѣдов., по доказанной нами теоремѣ, числа

$$1+2+\ldots.+p-1,$$
$$1.2+1.3+2.3+\ldots.,$$
$$1.2.3+2.3.4+\ldots.,$$
$$\ldots.$$
$$(-1)^{p-1}1.2.3\ldots.(p-1)+1$$

будутъ кратныя p, что, по нашему знакоположенію, представится такими сравненіями

$$1+2+3+\ldots.+p-1\equiv 0\ (\textit{мод. } p),$$
$$1.2+1.3+2.3+\ldots.\equiv 0,$$
$$1.2.3+2.3.4+\ldots.\equiv 0,$$
$$\ldots.$$
$$(-1)^{p-1}1.2.3\ldots.(p-1)+1\equiv 0.$$

Вотъ сравненія, которыя будутъ имѣть мѣсто для всякаго простого числа p. Такъ, для $p=5$ будетъ

$$1+2+3+4\equiv 0\ (\textit{мод. } 5),$$
$$1.2+1.3+1.4+2.3+2.4+3.4\equiv 0,$$
$$1.2.3+2.3.4+1.2.4+1.3.4\equiv 0,$$
$$1.2.3.4+1\equiv 0.$$

Особенно замѣчательно здѣсь сравненіе

$$(-1)^{p-1}1.2.3\ldots.(p-1)+1\equiv 0\ (\textit{мод. } p),$$

которое приводитъ насъ къ слѣдующей теоремѣ, извѣстной подъ названіемъ теоремы Вильсона.

23. **Теорема.** *Если p число простое, то* $1.2.3\ldots.(p-1)+1\equiv 0\ (\textit{мод. } p)$.

www.rcin.org.pl

Доказательство. Число p можетъ быть или 2 или болѣе 2; въ послѣднемъ случаѣ оно, какъ простое, будетъ всегда нечетное. Но сравненіе

$$(-1)^{p-1}1.2.3\ldots.(p-1)+1\equiv 0 \ (\textit{мод. } p),$$

справедливое для всякаго простаго числа p, при p нечетномъ, даетъ

$$1.2.3\ldots.(p-1)+1\equiv 0 \ (\textit{мод. } p).$$

Это же сравненіе имѣетъ мѣсто и при $p=2$; ибо для этой величины p оно приводится къ слѣдующему:

$$1+1\equiv 0 \ (\textit{мод. } 2),$$

что справедливо. Такъ убѣждаемся въ предложенной нами теоремѣ.

Не трудно доказать, что вообще если m чиселъ $a_1, a_2, a_3, \ldots. a_m$, которыя меньше p и не менѣе 0, удовлетворяютъ сравненію

$$Ax^m+Bx^{m-1}+Cx^{m-2}+\ldots.+Lx+M\equiv 0 \ (\textit{мод. } p);$$

$$\begin{gathered}
-A(a_1+a_2+a_3+\ldots.+a_m)\equiv B \ (\textit{мод. } p),\\
A(a_1a_2+a_1a_3+a_2a_3+\ldots)\equiv C,\\
\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\\
(-1)^{m-1}A(a_1a_2\ldots.a_{m-1}+a_2a_3\ldots.a_m+\ldots.)\equiv L,\\
(-1)^m Aa_1a_2a_3\ldots.a_m\equiv M.
\end{gathered}$$

Въ самомъ дѣлѣ, числа $a_1, a_2, a_3, \ldots a_m$ обращаютъ въ нуль выраженіе

$$A(x-a_1)\ (x-a_2)\ (x-a_3)\ldots.(x-a_m).$$

Слѣд. эти числа удовлетворяютъ сравненію

$$A(x-a_1)\ (x-a_2)\ldots.(x-a_m)\equiv 0 \ (\textit{мод. } p).$$

Но тѣ же числа, по положенію, удовлетворяютъ сравненію

$$Ax^m+Bx^{m-1}+Cx^{m-2}+\ldots.+Lx+M\equiv 0 \ (\textit{мод. } p),$$

а потому удовлетворяютъ они и сравненію

$$\begin{gathered}
A(x-a_1)\ (x-a_2)\ (x-a_3)\ldots.(x-a_m)\\
-Ax^m-Bx^{m-1}-Cx^{m-2}-\ldots.-Lx-M\equiv 0 \ (\textit{мод. } p),
\end{gathered}$$

получаемому въ разности предыдущихъ сравненій. Но если этому сравненію удовлетворяютъ m чиселъ $a_1, a_2, a_3, \ldots., a_m$, взя-

PAŃSTW. INSTYTUT MAT. BIBLIOTEKA

www.rcin.org.pl

тыхъ намъ изъ ряда 0, 1, 2, 3, ..., $p-1$, то оно имѣетъ m рѣшеній; степени же его меньше m; ибо въ выраженіи

$$A(x-a_1)(x-a_2)(x-a_3)\ldots(x-a_m)$$
$$-Ax^m-Bx^{m-1}-Cx^{m-2}-\ldots-Lx-M$$

членъ съ x^m сокращается. Вслѣдствіе этого, по 21-й теоремѣ, мы заключаемъ, что въ сравненіи

$$A(x-a_1)(x-a_2)(x-a_3)\ldots(x-a_m)$$
$$-Ax^m-Bx^{m-1}-Cx^{m-2}-\ldots-Lx-M\equiv 0 \pmod{p}$$

коэффиціенты всѣхъ степеней x дѣлятся на p. Но въ этомъ сравненіи коэффиціенты x^{m-1}, x^{m-2},...., x, x^0 суть

$$-A(a_1+a_2+a_3+\ldots\ldots a_m)-B,$$
$$A(a_1a_2+a_1a_3+a_2a_3+\ldots\ldots)-C.$$
$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$
$$(-1)^{m-1}A(a_1a_2\ldots a_{m-1}+a_2a_3\ldots a_m+\ldots.)-L,$$
$$(-1)^m Aa_1a_2a_3\ldots\ldots a_m-M.$$

Слѣд., по принятому нами знакоположенію, будетъ

$$-A(a_1+a_2+a_3+\ldots\ldots+a_m)-B\equiv 0 \pmod{p},$$
$$A(a_1a_2+a_1a_3+a_2a_3+\ldots\ldots)-C\equiv 0,$$
$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$
$$(-1)^{m-1}A(a_1a_2\ldots a_{m-1}+a_2a_3\ldots a_m+\ldots.)-L\equiv 0,$$
$$(-1)^m Aa_1a_2a_3\ldots\ldots a_m-M\equiv 0;$$

откуда и выходятъ сравненія

$$-A(a_1+a_2+a_3+\ldots+a_m)\equiv B \pmod{p},$$
$$A(a_1a_2+a_1a_3+a_2a_3+\ldots.)\equiv C,$$
$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$
$$(-1)^{m-1}A(a_1a_2\ldots a_{m-1}+a_2a_3\ldots a_m+\ldots.)\equiv L,$$
$$(-1)^m Aa_1a_2a_3\ldots\ldots a_m\equiv M,$$

которыя имѣли въ виду доказать.

Такъ, изъ сравненія

$$x^3+2x^2+x-4\equiv 0 \pmod{11},$$

которому удовлетворятъ числа 1, 3, 5, мы найдемъ

$$-(1+3+5)\equiv 2 \pmod{11},$$
$$1.3+1.5+3.5\equiv 1,$$
$$-1.3.5\equiv -4.$$

www.rcin.org.pl

§ 20. Мы доказали, что сравненіе

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \ldots + Hx + J \equiv 0 \pmod{p}$$

не можетъ имѣть болѣе m рѣшеній. Теперь посмотримъ, при какихъ условіяхъ это сравненіе имѣетъ не менѣе m рѣшеній. При этомъ мы будемъ всегда предполагать m не болѣе $p-1$. Покажемъ же предварительно, что сравненіе

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \ldots + Lx + M \equiv 0 \pmod{p}$$

можетъ быть всегда приведено къ этому виду.

20. **Теорема**. *Если p число простое, то сравненіе*

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \ldots + Lx + M \equiv 0 \pmod{p}$$

можетъ быть замѣнено сравненіемъ степени $p-1$

$$A_1x^{p-1} + B_1x^{p-2} + C_1x^{p-3} + \ldots + L_1x + M_1 \equiv 0 \pmod{p},$$

гдѣ полиномъ $A_1x^{p-1} + B_1x^{p-2} + C_1x^{p-3} + \ldots + L_1x + M_1$ есть остатокъ отъ дѣленія

$$x^m + B^{m-1} + C^{m-2} + \ldots + Lx + S$$

на $x^p - x$.

Доказательство. Дѣлимъ полиномъ

$$x^m + Bx^{m-1} + C^{m-2} + \ldots + Lx + S$$

на $x^p - x$; частное и остатокъ будутъ функціи цѣлыя съ цѣлыми коеффиціентами; притомъ, степень остатка будетъ меньше степени дѣлителя $x^p - x$; слѣд. не болѣе $p-1$. Пусть же частное этого дѣленія будетъ $Фx$ и

$$A_1x^{p-1} + B_1x^{p-2} + C_1x^{p-3} + \ldots + L_1x + S_1$$

остатокъ; приравнивая дѣлимое произведенію дѣлителя на частное, сложенному съ остаткомъ, найдемъ

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \ldots + Lx + M =$$
$$Фx(x^p - x) + A_1x^{p-1} + B_1x^{p-2} + C_1x^{p-3} + \ldots + L_1x + M_1 \ldots (10)$$

На основаніи этого уравненія не трудно убѣдиться, что сравненіе

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \ldots + Lx + M \equiv 0 \pmod{p}$$

тождественно сравненію

$$A_1x^{p-1} + B_1x^{p-2} + Cx_1^{p-3} + \ldots + L_1x + M_1 \equiv 0 \pmod{p}.$$

www.rcin.org.pl

Въ самомъ дѣлѣ, выраженіе $x^p - x$ при всѣхъ значеніяхъ x будетъ сравнимо съ 0 по модулю p; ибо оно, очевидно, дѣлится на p при x кратномъ p, а, при x недѣлящемся на p, будетъ $x^{p-1} - 1 \equiv 0$ (*мод.* p) по теоремѣ Фермата. Изъ этого видно, что, при всѣхъ значеніяхъ x, будетъ сравнимо съ нулемъ произведеніе $Фx$ $(x^p - x)$.

Поэтому, не измѣняя сравненія

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \ldots + Lx + M \equiv 0 (мод.\ p),$$

мы можемъ вычесть изъ первой части его $Фx$ $(x^p - x)$, вслѣдствіе чего оно представится такъ

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \ldots + Lx + M - Фx(x^p - x) \equiv 0 \ (мод.\ p),$$

а это, по (10), приводится къ слѣдующему

$$A_1 x^{p-1} + B_1 x^{p-2} + C_1 x^{p-3} + \ldots + L_1 x + M_1 \equiv 0 \ (мод.\ p),$$

что и требовалось доказать.

На этомъ основаніи мы заключаемъ, что степени сравненія съ модулемъ 2 можетъ быть понижена до 1, съ модулемъ 3 до 2, съ модулемъ 5 до 4, и т. д.

Такъ, имѣя сравненіе $x^5 + x^2 - 1 \equiv 0$ (*мод.* 3), мы степень его можемъ понизить до 2-хъ. Для этого ищемъ остатокъ отъ дѣленія $x^5 + x^2 - 1$ на $x^3 - x$. Такъ какъ этотъ остатокъ есть $x^2 + x - 1$, то разсматриваемое нами сравненіе замѣнится такимъ

$$x^2 + x - 1 \equiv 0 \ (мод.\ 3).$$

§ 2. Показавши, какимъ образомъ степень сравненія съ модулемъ p можетъ быть понижена до $p-1$, приступимъ теперь къ опредѣленію условій, при которыхъ сравненіе

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \ldots + Lx + M \equiv 0 \ (мод.\ p)$$

имѣетъ m рѣшеній, гдѣ m не болѣе $p-1$. Мы здѣсь предполагаемъ коэффиціентъ высшей степени x равнымъ единицѣ; ибо видѣли, что это можетъ быть сдѣлано во всякомъ сравненіи.

Вотъ теоремы, по которымъ мы всегда узнаемъ, имѣетъ ли данное сравненіе столько рѣшеній, сколько въ показателѣ его степени находится единицъ, или нѣтъ.

www.rcin.org.pl

25. **Теорема.** *Если сравненіе*

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \ldots + Lx + M \equiv 0 \pmod{p}$$

имѣетъ m рѣшеній, то въ остаткѣ отъ дѣленія $x^p - x$ на $x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \ldots + Lx + M$ всѣ коэффиціенты дѣлятся на p.

Доказательство. Пусть будетъ Fx частное отъ дѣленія

$$x^p - x \text{ на } x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \ldots + Lx + M, \text{ и } Fx$$

остатокъ отъ этого дѣленія. Приравнивая дѣлимое произведенію дѣлителя на частное, сложенному съ остаткомъ, найдемъ

$$x^p - x = Fx(x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \ldots + Lx + M) + Fx;$$

откуда выходитъ

$$x^p - x - Fx(x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \ldots + Lx + M) = Fx \ldots (11)$$

Возьмемъ теперь сравненіе

$$x^p - x - Fx(x^m + B^{m-1} + C^{m-2} + \ldots + Lx + M) \equiv 0 \pmod{p}$$

и докажемъ, что въ сдѣланныхъ нами предположеніяхъ это сравненіе имѣетъ не менѣе m рѣшеній. Это слѣдуетъ изъ того, что, при всѣхъ величинахъ x, выраженіе $x^p - x$, какъ видѣли въ § 20, сравнимо съ 0 по модулю p; выраженіе же

$$Fx(x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \ldots + Lx + M)$$

становится сравнимымъ съ 0 по модулю p при всѣхъ числахъ, удовлетворяющихъ сравненію

$$x^m + Bx^{m-1} + C x^{m-2} + \ldots + Lx + M \equiv 0 \pmod{p};$$

это же сравненіе имѣетъ m рѣшеній, по положенію.

Итакъ, сравненіе

$$x^p - x - Fx(x^m + Bx^{m-1} + C^{m-2} + \ldots + Lx + M) \equiv 0$$

имѣетъ по крайней мѣрѣ m рѣшеній. Но оно, по (11), приводится къ

$$Fx \equiv 0 \pmod{p},$$

котораго степень меньше m: ибо Fx означаетъ у насъ остатокъ отъ дѣленія $x^p - x$ на

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \ldots + Lx + M.$$

*

www.rcin.org.pl

Убѣдясь такимъ образомъ съ одной стороны, что сравненіе

$$Фx \equiv 0 \ (мод.\ p)$$

имѣетъ по крайней мѣрѣ m рѣшеній, а съ другой, что оно степени ниже m, мы, по теоремѣ 20-ой, заключаемъ, что въ $Фx$ всѣ коеффиціенты суть числа кратныя p, въ чемъ и заключается предложенная нами теорема.

Докажемъ теперь обратную этой теорему.

26. **Теорема.** *Если остатокъ отъ дѣленія* $x^p - x$ *на* $x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \ldots\ldots + Lx + M$ *имѣетъ всѣ коеффиціенты кратные* p, *то сравненіе*

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \ldots\ldots + Lx + M \equiv 0 \ (мод.\ p)$$

имѣетъ m *рѣшеній.*

Доказательство. Пусть будутъ Fx и $Фx$ частное и остатокъ отъ дѣленія $x^p - x$ на

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \ldots\ldots + Lx + M;$$

остатокъ $Фx$, по положенію, будетъ имѣть всѣ коеффиціенты кратные p; поэтому для всякой величины x будетъ

$$Фx \equiv 0 \ (мод.\ p); \ldots\ldots\ldots (12)$$

частное же Fx будетъ цѣлая функція такого вида:

$$x^{p-m} + B_1 x^{p-m-1} + \ldots\ldots$$

Приравнивая дѣлимое произведенію дѣлителя на частное, сложенному съ остаткомъ, найдемъ

$$x^p - x = Fx(x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \ldots\ldots + Lx + M) + Фx;$$

откуда

$$x^p - x - Фx = Fx(x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \ldots\ldots + Lx + M).$$

Но такъ какъ, по (12) и по сказанному нами выше относительно $x^p - x$, выраженіе $x^p - x - Фx$ сравнимо съ нулемъ по модулю p для всѣхъ чиселъ 0, 1, 2,....., $p-1$; то всѣ эти числа будутъ удовлетворять сравненію

$$Fx(x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \ldots\ldots + Lx + M) \equiv 0 \ (мод.\ p);$$

ибо первая часть его, по выведенному нами сейчасъ уравненію, тождественна разности $x^p - x - Фx$.

www.rcin.org.pl

Итакъ, всѣ числа 0, 1, 2,....., $p-1$ удовлетворяютъ сравненію

$$Fx(x^m+Bx^{m-1}+Cx^{m-2}+\ldots.+Lx+M)\equiv 0 \ (\textit{мод. } p).$$

Но этому сравненію никакое число не можетъ удовлетворять, не удовлетворяя ни одному изъ сравненій

$$Fx\equiv 0,\ x^m+Bx^{m-1}+Cx^{m-2}+\ldots.+Lx+M\equiv 0 \ (\textit{мод. } p).$$

Въ самомъ дѣлѣ, если эти сравненія не удовлетворяются при $x=\alpha$, то $F\alpha$ и $\alpha^m+B\alpha^{m-1}+C\alpha^{m-2}+\ldots.+L\alpha+M$ суть числа, не дѣлящіяся на p, а потому и простыя съ p, ибо p число само простое. Но если $F\alpha$ и

$$\alpha^m+B\alpha^{m-1}+C\alpha^{m-2}+\ldots.+L\alpha+M$$

суть числа простыя съ p, то и произведеніе ихъ

$$F\alpha(\alpha^m+B\alpha^{m-1}+C\alpha^{m-2}+\ldots.+L\alpha+M)$$

число простое съ p и слѣд. сравненіе

$$Fx(x^m+Bx^{m-1}+Cx^{m-2}+\ldots.Lx+M)\equiv 0 \ (\textit{мод. } p)$$

при $x=\alpha$ не удовлетворяется.

Итакъ, каждое изъ p чиселъ 0, 1, 2,....., $p-1$ будетъ удовлетворять по крайней мѣрѣ одному изъ сравненій

$$Fx\equiv 0,\ x^m+Bx^{m-1}+Cx^{m-2}+\ldots.+Lx+M\equiv 0 \ (\textit{мод. } p),$$

а потому, если назовемъ черезъ n и n', сколько чиселъ въ ряду 0, 1, 2,....., $p-1$ удовлетворяетъ сравненію $Fx\equiv 0$ (*мод. p*) и

$$x^m+Bx^{m-1}+Cx^{m-2}+\ldots+Lx+M\equiv 0 \ (\textit{мод. } p);$$

то сумма $n+n'$ будетъ не менѣе p. Притомъ, числа n, n', означая, сколько чиселъ въ ряду 0, 1, 2,....., $p-1$ удовлетворяютъ сравненіямъ

$$Fx\equiv 0,\ x^m+Bx^{m-1}+Cx^{m-2}+\ldots.+Lx+M\equiv 0 \ (\textit{мод. } p),$$

будутъ равны числу рѣшеній этихъ сравненій; слѣд., по теоремѣ 20-й, число n' не болѣе m, а n—не болѣе $p-m$; ибо видѣли, Fx есть функція такого вида $x^{p-m}+B_1x^{p-m-1}+\ldots..$ Итакъ, числа n, n', опредѣлющія число рѣшеній сравненій

$$Fx\equiv 0,\ x^m+Bx^{m-1}+Cx^{m-2}+\ldots.+Lx+M\equiv 0 \ (\textit{мод. } p),$$

будутъ удовлетворять условіямъ

$$n+n'\geq p,\ n\leq p-m,\ n'\leq m.$$

www.rcin.org.pl

Первыя два условія, по исключеніи n, даютъ $n' = > m$, а это, въ совокупности съ условіемъ $n' = < m$, обнаруживаютъ равенство $n' = m$. Откуда и слѣдуетъ предложенная теорема.

На основаніи послѣднихъ двухъ теоремъ мы узнаемъ всегда, имѣетъ ли данное сравненіе столько рѣшеній, сколько въ показателѣ его степени содержится единицъ. Для этого мы, сдѣлавъ предварительно коэффиціентъ высшей степени x въ данномъ сравненіи равнымъ единицѣ по способу, показанному въ § 17, и называя черезъ p модуль его, дѣлимъ $x^p - x$ на первую часть сравненія. Если остатокъ, получаемый при этомъ дѣленіи, имѣетъ всѣ коэффиціенты кратные p, то, по послѣдней теоремѣ, мы заключимъ, что данное сравненіе имѣетъ столько рѣшеній, сколько въ показателѣ его степени содержится единицъ. Въ противномъ же случаѣ, по теоремѣ предпослѣдней, мы заключимъ, что сравненіе не имѣетъ столько рѣшеній.

Напр. чтобы узнать, имѣетъ ли сравненіе

$$x^3 - x^2 - 2x \equiv 0 \ (\text{мод. } 5)$$

три рѣшенія, или нѣтъ, мы дѣлимъ $x^5 - x$ на $x^3 - x^2 - 2x$. Такъ какъ остатокъ этого дѣленія есть $5x^2 - 5x$, гдѣ оба коэффиціента дѣлятся на 5, то мы заключаемъ, что разсматриваемое нами сравненіе имѣетъ три рѣшенія.

Напротивъ, дѣля $x^5 - x$ на $x^3 + x^2 - 2$ и находя въ остаткѣ $x^2 - 3x + 2$, гдѣ коэффиціенты не дѣлятся на 5, заключаемъ, что сравненіе

$$x^3 + x^2 - 2 \equiv 0 \ (\text{мод. } 5)$$

имѣетъ менѣе трехъ рѣшеній.

ГЛАВА IV.

О сравненіяхъ второй степени.

§ 22. Общій видъ сравненій второй степени есть

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \ (\text{мод. } p).$$

Это сравненіе приводится къ сравненіямъ первой степени въ

www.rcin.org.pl

двухъ случаяхъ. Во первыхъ, когда $p=2$. Въ этомъ случаѣ, по 20-й теоремѣ, степень сравненія

$$ax^2+bx+c \equiv 0 \ (мод.\ p)$$

можетъ быть понижена до 1. Во вторыхъ, сравненіе

$$ax^2+bx+c \equiv 0 \ (мод.\ p)$$

приводится къ первой степени, когда a дѣлится на p; ибо въ этомъ случаѣ будемъ имѣть

$$a \equiv 0 \ (мод.\ p),$$

что, по умноженіи на x^2, даетъ

$$ax^2 \equiv 0 \ (мод.\ p);$$

вычитая же это сравненіе изъ $ax^2+bx+c \equiv 0$ (*мод. p*), найдемъ $bx+c \equiv 0$ (*мод. p*).

Итакъ, въ случаѣ $p=2$ или a кратнаго p, сравненіе $ax^2+bx+c \equiv 0$ (*мод. p*) приводится къ сравненію первой степени, которое рѣшить мы умѣемъ. Обращаемся теперь къ случаю p не $= 2$ и a, не дѣлящагося на p, и, для упрощенія нашихъ изысканій, ограничимся сначала случаемъ p простаго. Мы теперь покажемъ, къ чему приводится въ этомъ случаѣ рѣшеніе сравненія

$$ax^2+bx+c \equiv 0 \ (мод.\ p).$$

Такъ какъ p предполагаемъ числомъ простымъ, отличнымъ отъ 2, и a не дѣлящимся на p, то $4a$ будетъ число простое съ p; а потому, какъ не трудно убѣдиться, сравненіе $ax^2+bx+c \equiv 0$ (*мод. p*) будетъ тождественно такому $4a\,(ax^2+bx+c) \equiv 0$ (*мод. p*). Въ самомъ дѣлѣ, первое сравненіе предполагаетъ второе: ибо, не нарушая сравненія, мы можемъ члены его умножить на всякое число; обратно, второе предполагаетъ первое: ибо оно получается изъ втораго сокращеніемъ общаго множителя $4a$,—сокращеніемъ позволительнымъ, потому что $4a$ число простое съ p. Но сравненіе $4a(ax^2+bx+c) \equiv 0$ (*мод. p*) можетъ быть написано такъ

$$(2ax+b)^2-b^2+4ac \equiv 0 \ (мод.\ p).$$

Откуда выводимъ

www.rcin.org.pl

$$z^2 \equiv b^2 - 4ac \pmod{p},$$

предполагая

$$z \equiv 2ax + b.$$

Изъ этого мы видимъ, что рѣшеніе сравненія

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p}$$

приводится къ рѣшенію сравненія

$$z^2 \equiv b^2 - 4ac \pmod{p}$$

и опредѣленію x по уравненію

$$2ax + b = z.$$

Но что касается до опредѣленія x по уравненію $2ax + b = z$, когда рѣшеніемъ сравненія $z^2 \equiv b^2 - 4ac \pmod{p}$ найдено z, то оно сводится на рѣшеніе сравненія первой степени. Въ самомъ дѣлѣ, рѣшеніе сравненія $z^2 \equiv b^2 - 4ac \pmod{p}$, по замѣченному нами вообще о рѣшеніи сравненій $fx \equiv 0 \pmod{p}$, гдѣ fx цѣлая функція x съ цѣлыми коеффиціентами, представится однимъ или нѣсколькими сравненіями вида

$$z \equiv \alpha \pmod{p}.$$

Вслѣдствіе чего, для опредѣленія неизвѣстнаго x, связаннаго съ z уравненіемъ $2ax + b = z$, будемъ имѣть

$$2ax + b \equiv \alpha \pmod{p}.$$

Это сравненіе, какъ первой степени, мы рѣшать умѣемъ; замѣтимъ также, что оно, въ сдѣланныхъ нами предположеніяхъ, будетъ всегда имѣть одно рѣшеніе: ибо здѣсь $2a$ и p будутъ числа относительно другъ друга простыя.

Итакъ, вся трудность рѣшенія сравненія

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p}$$

заключается въ рѣшеніи сравненія

$$z^2 \equiv b^2 - 4ac \pmod{p};$$

этимъ сравненіемъ мы теперь и займемся. Мы его будетъ писать такъ

$$z^2 \equiv q \pmod{p},$$

полагая, для сокращенія, $b^2 - 4ac = q$.

www.rcin.org.pl

Разсматривая сравненіе

$$z^2 \equiv q \ (мод.\ p),$$

мы замѣчаемъ, что оно, при $q \equiv 0$ (*мод.* p), будетъ удовлетворяться предположеніемъ $z \equiv 0$ (*мод.* p). Не трудно также убѣдиться, что въ этомъ случаѣ $z \equiv 0$ (*мод.* p) есть единственное рѣшеніе сравненія $z^2 \equiv q$ (*мод.* p). Въ самомъ дѣлѣ, если q сравнимо съ нулемъ по модулю p, то сравненіе $z^2 \equiv q$ (*мод.* p) выражаетъ дѣлимость z^2 на p. Но p, будучи числомъ простымъ, не можетъ дѣлиться на квадратъ какого либо числа; слѣд., по 6-ой теоремѣ, дѣлимость z^2 на p предполагаетъ дѣлимость z на p, а это выражается сравненіемъ

$$z \equiv 0 \ (мод.\ p).$$

Итакъ, если q сравнимо съ нулемъ по модулю p, то сравненіе $z^2 \equiv q$ (*мод.* p) имѣетъ одно только рѣшеніе $z \equiv 0$ (*мод.* p).

Переходимъ теперь къ случаю q несравнимаго съ нулемъ по модулю p; въ этомъ случаѣ, относительно рѣшеній сравненія $z^2 \equiv q$ (*мод.* p), будетъ имѣть мѣсто слѣдующая теорема:

27. **Теорема.** *Если q не сравнимо съ нулемъ по модулю p, то сравненіе $z^2 \equiv q$ (мод. p) или вовсе не имѣетъ рѣшенія, или имѣетъ ихъ два.*

Доказательство. Мы видѣли, что вообще сравненіе $fx \equiv 0$ (*мод.* p) имѣетъ столько рѣшеній, сколько чиселъ въ ряду $0, 1, 2, \ldots, p-1$ ему удовлетворяетъ. На основаніи этого, не трудно доказать, что сравненіе $z^2 \equiv q$ (*мод.* p), при q не $\equiv 0$ (*мод.* p), не можетъ имѣть одно только рѣшеніе. Въ самомъ дѣлѣ, пусть будетъ a то число, которое въ ряду $0, 1, 2, \ldots, p-1$ удовлетворяетъ сравненію $z^2 \equiv q$ (*мод.* p). Число a не можетъ быть нулемъ: ибо, дѣлая въ сравненіи $z^2 \equiv q$ (*мод.* p) число z равнымъ нулю, находимъ $0 \equiv q$ (*мод.* p), что противно положенію. Итакъ a будетъ однимъ изъ чиселъ $1, 2, \ldots, p-1$.

Но не трудно убѣдиться, что если a удовлетворяетъ сравненію $z^2 \equiv q$ (*мод.* p), то $p - a$ будетъ также удовлетворять ему: ибо $(p-a)^2$, какъ равное $p^2 - 2ap + a^2$, сравнимо съ a^2 по модулю p. Слѣдовательно, $p - a$ будетъ опредѣлять второе

www.rcin.org.pl

рѣшеніе сравненія $z^2 \equiv q$ (*мод.* p), если число p — a заключается въ ряду

$$0, 1, 2, \ldots\ldots, p-1$$

и отлично отъ a. Но первое слѣдуетъ изъ того, что a не болѣе p и не менѣе 1; второе же небходимо должно имѣть мѣсто, потому что, въ противномъ случаѣ, было бы $p-a=a$, и слѣд. $2a=p$, что невозможно, ибо p число простое отличное отъ 2, а потому четнымъ быть не можетъ.

Итакъ, если въ ряду найдется одно число, удовлетворяющее сравненію $z^2 \equiv q$ (*мод.* p), то найдется и другое, ему удовлетворяющее. Слѣд. это сравненіе не можетъ имѣть одно только рѣшеніе. Но это сравненіе, будучи второй степени, не можетъ имѣть также болѣе двухъ рѣшеній; слѣдовательно, оно должно имѣть или два рѣшенія, или не одного, что и слѣдовало доказать.

§ 23. Мы займемся теперь изслѣдованіемъ признаковъ, по которымъ можно узнать, имѣетъ ли сравненіе $z^2 \equiv q$ (*мод.* p), гдѣ предполагаемъ q не $\equiv 0$ (*мод.* p), два рѣшенія, или ни одного.

На основаніи теоремъ, доказанныхъ нами въ § 21, не трудно узнать, имѣетъ ли данное сравненіе $z^2 \equiv q$ (*мод.* p) два рѣшенія, или нѣтъ. Для этого, мы должны найти остатокъ, получаемый при дѣленіи $z^p - z$ на $z^2 - q$. Чтобы найти этотъ остатокъ, мы дѣлимое $z^p - z$ представляемъ такъ

$$z\left[(z)^{\frac{p-1}{2}} - q^{\frac{p-1}{2}}\right] + z\left[q^{\frac{p-1}{2}} - 1\right]$$

и замѣчаемъ, что $(z^2)^{\frac{p-1}{2}} - q^{\frac{p-1}{2}}$ дѣлится на $z^2 - q$. Слѣд. при дѣленіи этого выраженія на $z^2 - q$, остатокъ будетъ

$$z\left[q^{\frac{p-1}{2}} - 1\right].$$

Отсюда, по теоремѣ 26-й, мы заключаемъ, что сравненіе $z^2 \equiv q$ (*мод.* p) имѣетъ два рѣшенія, если $q^{\frac{p-1}{2}} - 1$ дѣлится на p, или, что одно и тоже, по нашему знакоположенію, если имѣетъ мѣсто сравненіе

www.rcin.org.pl

$$q^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \ (\textit{мод. } p),$$

Если же это сравненіе не удовлетворяется и слѣд. $q^{\frac{p-1}{2}} - 1$ не дѣлятся на p, то, по теоремѣ 25-й, заключимъ, что сравненіе $z^2 \equiv q$ (*мод.* p) не имѣетъ двухъ рѣшеній, а потому оно не можетъ имѣть и одного рѣшенія; ибо, по теоремѣ 27-й, это сравненіе или имѣетъ два рѣшенія, или не имѣетъ ни одного.

Итакъ, сравненіе $z^2 \equiv q$ (*мод.* p) имѣетъ два рѣшенія, или не имѣетъ ни одного, смотря по тому, будетъ ли сравненіе,

$$q^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \ (\textit{мод. } p),$$

имѣть мѣсто, или не будетъ. Въ первомъ случаѣ, мы будемъ говорить, что сравненіе $z^2 \equiv q$ (*мод.* p) возможно; во второмъ, —что оно невозможно.

Припомнимъ здѣсь, что все это выведено нами въ предположеніи, что p число простое, отличное отъ 2, а q какое нибудь число положительное, или отрицательное, не дѣлящееся на p.

Такъ, чтобы узнать, имѣетъ ли сравненіе $z^2 \equiv 3$ (*мод.* 5) рѣшенія или нѣтъ, мы возводимъ 3 въ степень $\frac{5-1}{2}$, или 2. Находя, что 3^2 не сравнимо съ 1 по модулю 5, мы заключаемъ, что сравненіе $z^2 \equiv 3$ (*мод.* 5) не имѣетъ рѣшенія, другими словами, это сравненіе невозможно.

Напротивъ, мы убѣждаемся, что сравненіе $z^2 \equiv 2$ (*мод.* 7) имѣетъ рѣшенія, находя что $2^{\frac{7-1}{2}} = 8$ и 8 сравнимо съ 1 по модулю 7.

§ 24. Если p и q не велики, то не трудно узнать, удовлетворяется ли сравненіе $q^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1$ (*мод.* p), или нѣтъ. Но это становится весьма труднымъ, когда p и q большія числа. Мы покажемъ теперь, какимъ образомъ, не вычисляя значенія $q^{\frac{p-1}{2}}$, можно рѣшить, удовлетворяется ли сравненіе $q^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1$ (*мод.* p)

www.rcin.org.pl

или нѣтъ и чрезъ то узнать, имѣетъ ли рѣшенія сравненіе $z^2 \equiv q \pmod{p}$, или нѣтъ. Съ этою цѣлію мы докажемъ теперь, что, если q не дѣлится на p и p число простое, отличное отъ 2, какъ мы и предполагали, то число $q^{\frac{p-1}{2}}$ удовлетворяетъ всегда одному изъ двухъ сравненій

$$q^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1, \quad q^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}.$$

Въ самомъ дѣлѣ, если ни одно этихъ сравненій не удовлетворяется, то ни число $q^{\frac{p-1}{2}} - 1$, ни число $q^{\frac{p-1}{2}} + 1$ не дѣлится на p, и слѣд. оба они простыя съ p, ибо p само по себѣ простое число. Но, если оба числа $q^{\frac{p-1}{2}} - 1$, $q^{\frac{p-1}{2}} + 1$ суть простыя съ p, то и произведеніе изъ $(q^{\frac{p-1}{2}} - 1)(q^{\frac{p-1}{2}} + 1)$, или $q^{p-1} - 1$ число простое съ p; а это несправедливо: ибо, по теоремѣ Фермата, разность $q^{p-1} - 1$ дѣлится на p. Итакъ, одно изъ двухъ сравненій

$$q^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1, \quad q^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$$

необходимо должно удовлетвориться. Съ другой стороны, не трудно убѣдиться, что оба эти сравненія въ одно время не могутъ имѣть мѣста; ибо, допустивши ихъ, мы находимъ $1 \equiv -1 \pmod{p}$, откуда $2 \equiv 0 \pmod{p}$, что не возможно; ибо p, предполагаемое отличнымъ отъ 2, дѣлить 2 не можетъ.

Изъ сказаннаго нами слѣдуетъ, что возможность удовлетворить сравненію $z^2 \equiv q \pmod{p}$ опредѣляется знакомъ, съ которымъ сравненіе

$$q^{\frac{p-1}{2}} \equiv \pm 1 \pmod{p}$$

удовлетворяется. Если оно удовлетворяется съ +, то сравненіе $z^2 \equiv q \pmod{p}$ имѣетъ рѣшенія, и въ этомъ случаѣ число q называютъ *квадратичнымъ вычетомъ* числа p: въ противномъ случаѣ, если сравненіе $q^{\frac{p-1}{2}} \equiv \pm 1 \pmod{p}$ удовлетворяется съ знакомъ —, сравненіе $z^2 \equiv q \pmod{p}$ не имѣетъ рѣшенія, и число q называютъ *неквадратичнымъ вычетомъ* числа p. Кромѣ того для

www.rcin.org.pl

сокращенія письма, вмѣсто того, чтобы писать p и q удовлетворяютъ сравненію $q^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1$ (*мод.* p), [что, какъ видѣли, есть признакъ возможности сравненія $z^2 \equiv q$ (*мод.* p)] согласились писать

$$\left(\frac{q}{p}\right) = 1;$$

въ противномъ же случаѣ, если $q^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1$ (*мод.* p), пишутъ

$$\left(\frac{q}{p}\right) = -1.$$

По этому знакоположенію, $\left(\frac{q}{p}\right)$ будетъ означать 1 съ тѣмъ изъ двухъ знаковъ $\pm$, съ которымъ она удовлетворяетъ сравненію $q^{\frac{p-1}{2}} \equiv \pm 1$ (*мод.* p), и, слѣд., значеніе этого символа вполнѣ будетъ опредѣлено сравненіемъ $q^{\frac{p-1}{2}} = \left(\frac{q}{p}\right)$ (*мод.* p) и условіемъ, что численная величина $\left(\frac{q}{p}\right)$ есть 1.

Такъ, мы нашли, что сравненіе $q^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1$ (*мод.* p) удовлетворяется при $q = 2, p = 7$. Слѣд., по нашему знакоположенію, будетъ

$$\left(\frac{2}{7}\right) = 1.$$

Напротивъ, мы видѣли, что $3^{\frac{5-1}{2}}$ по модулю 5 сравнимо съ -1; слѣд.

$$\left(\frac{3}{5}\right) = -1.$$

Такимъ образомъ, изъ $\left(\frac{2}{7}\right) = 1$ мы заключаемъ объ возможности рѣшить сравненіе $z^2 \equiv 2$ (*мод.* 7), и число 2 называемъ квадратичнымъ вычетомъ 7. Напротивъ, изъ равенства $\left(\frac{3}{5}\right) = -1$ заключимъ, что сравненіе $x^2 \equiv 3$ (*мод.* 5) не имѣетъ рѣшенія, и, слѣдовательно, 3 будетъ неквадратичный вычетъ 5.

§ 25. Показавши значеніе символа $\left(\frac{q}{p}\right)$, мы приступимъ теперь къ раскрытію его свойствъ. Для этого мы докажемъ слѣдующія теоремы:

28. **Теорема**. *Величина символа* $\left(\frac{1}{p}\right)$ *есть* 1, *а символа*

www.rcin.org.pl

$\left(\frac{-1}{p}\right)$ *есть* $(-1)^{\frac{p-1}{2}}$.

Доказательство. Мы видѣли, что символъ $\left(\frac{q}{p}\right)$ удовлетворяетъ сравненію $q^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{q}{p}\right)$ (*мод.* p).

Дѣлая здѣсь послѣдовательно $q = 1$ и $q = -1$, находимъ

$$1 \equiv \left(\frac{1}{p}\right),\ (-1)^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{-1}{p}\right) (\text{мод. } p),$$

или $$1 - \left(\frac{1}{p}\right) \equiv 0,\ (-1)^{\frac{p-1}{2}} - \left(\frac{-1}{p}\right) \equiv 0 \ (\text{мод. } p).$$

Такъ какъ численная величина значеній символовъ $\left(\frac{1}{p}\right), \left(\frac{-1}{p}\right)$ есть 1, то разности $1 - \left(\frac{1}{p}\right), (-1)^{\frac{p-1}{2}} - \left(\frac{-1}{p}\right)$, при неравенствѣ $\left(\frac{1}{p}\right)$ съ 1, $\left(\frac{-1}{p}\right)$ съ $(-1)^{\frac{p-1}{2}}$, приведутся или къ 2, или къ -2; но ни 2, ни -2 несравнимо съ 0 по модулю p: ибо p отлично отъ двухъ. Слѣд., нельзя допустить неравенства $\left(\frac{1}{p}\right)$ съ 1, $\left(\frac{-1}{p}\right)$ съ $(-1)^{\frac{p-1}{2}}$; откуда и слѣдуетъ предложенная нами теорема.

На основаніи этой теоремы, мы заключаемъ, что $\left(\frac{1}{5}\right) = 1$, $\left(\frac{-1}{5}\right) = 1, \left(\frac{-1}{11}\right) = -1$.

29. **Теорема.** *Если* Q *есть произведеніе чиселъ* $q_1, q_2, \ldots q_n$, *то*

$$\left(\frac{Q}{p}\right) = \left(\frac{q_1}{p}\right)\left(\frac{q_2}{p}\right)\ldots\left(\frac{q_n}{p}\right).$$

Доказательство. Символы $\left(\frac{Q}{p}\right), \left(\frac{q_1}{p}\right), \left(\frac{q_2}{p}\right)\ldots\left(\frac{q_n}{p}\right)$, какъ видѣли, удовлетворяютъ сравненіямъ

$$Q^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{Q}{p}\right),\ q_1^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{q_1}{p}\right),\ q_2^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{q_2}{p}\right), \ldots, q_n^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{q_n}{p}\right) (\text{мод. } p)$$

www.rcin.org.pl

Перемножая всѣ эти сравненія, кромѣ перваго, между собою, находимъ

$$q_1^{\frac{p-1}{2}} q_2^{\frac{p-1}{2}} \ldots\ldots q_n^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{q_1}{p}\right)\left(\frac{q_2}{p}\right)\ldots\left(\frac{q_n}{p}\right) \text{ (мод. } p),$$

или что одно и тоже,

$$[q_1 q_2 \ldots q_n]^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{q_1}{p}\right)\left(\frac{q_2}{p}\right)\ldots\left(\frac{q_n}{p}\right) \text{ (мод. } p),$$

Но, по положенію, произведеніе $q_1 q_2 \ldots q_n$ равно Q; вслѣдствіе чего предыдущее сравненіе представится такъ

$$Q^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{q_1}{p}\right)\left(\frac{q_2}{p}\right)\ldots\left(\frac{q_n}{p}\right) \text{ (мод. } p).$$

Но мы видѣли, что $Q^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{Q}{p}\right)$ (мод. p).

Это сравненіе, вмѣстѣ съ предыдущимъ, даетъ

$$\left(\frac{Q}{p}\right) \equiv \left(\frac{q_1}{p}\right)\left(\frac{q_2}{p}\right)\ldots\left(\frac{q_n}{p}\right) \text{ (мод. } p),$$

или $$\left(\frac{Q}{p}\right) - \left(\frac{q_1}{p}\right)\left(\frac{q_2}{p}\right)\ldots\left(\frac{q_n}{p}\right) \equiv 0 \text{ (мод. } p).$$

Но такъ какъ численная величина символовъ

$$\left(\frac{Q}{p}\right), \left(\frac{q_1}{p}\right), \left(\frac{q_2}{p}\right), \ldots\ldots \left(\frac{q_n}{p}\right)$$

есть 1, то разность выраженій $\left(\frac{Q}{p}\right)$ и $\left(\frac{q_1}{p}\right)\left(\frac{q_2}{p}\right)\ldots\ldots\ldots\left(\frac{q_n}{p}\right)$, въ случаѣ неравенства ихъ, приведется или $+2$, или -2. Но ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ предыдущее сравненіе не можетъ имѣть мѣста: ибо p число отличное отъ 2. Итакъ, нельзя допустить неравенства величинъ $\left(\frac{Q}{p}\right)$, $\left(\frac{q_1}{p}\right)\left(\frac{q_2}{p}\right)\ldots\ldots\ldots\left(\frac{q_n}{p}\right)$; откуда и слѣдуетъ предложенная нами теорема.

На основаніи этой теоремы, опредѣленіе символа $\left(\frac{Q}{p}\right)$, при Q составномъ, сводится на опредѣленіе символовъ

$$\left(\frac{q_1}{p}\right), \left(\frac{q_2}{p}\right)\ldots\ldots\ldots\left(\frac{q_n}{p}\right),$$

гдѣ $q_1, q_2, \ldots\ldots q_n$ простыя числа, составляющія Q. Такъ, желая опредѣлить $\left(\frac{15}{7}\right)$, $\left(\frac{30}{101}\right)$, найдемъ что

www.rcin.org.pl

$$\left(\frac{15}{7}\right)=\left(\frac{3}{7}\right)\left(\frac{5}{7}\right),\ \left(\frac{30}{101}\right)=\left(\frac{2}{101}\right)\left(\frac{3}{101}\right)\left(\frac{5}{101}\right).$$

На основаніи этой же теоремы, мы заключаемъ о такомъ равенствѣ

$$\left(\frac{q^n}{p}\right)=\left(\frac{q}{p}\right)^n.$$

Чтобы вывести это изъ доказанной нами теоремы, стоитъ принять числа $q_1, q_2, \ldots\ldots, q_n$ за равныя q. Въ этомъ случаѣ уравненіе

$$\left(\frac{Q}{p}\right)=\left(\frac{q_1}{p}\right)\left(\frac{q_2}{p}\right)\ldots\ldots\left(\frac{q_n}{p}\right)$$

намъ дастъ

$$\left(\frac{Q}{p}\right)=\left(\frac{q}{p}\right)^n;$$

число же Q, равное произведенію $q_1\ q_2 \ldots q_n$, приведется къ q^n.

Такъ найдемъ, что

$$\left(\frac{27}{5}\right)=\left(\frac{3^3}{5}\right)=\left(\frac{3}{5}\right)^3,\left(\frac{32}{7}\right)=\left(\frac{2^5}{7}\right)=\left(\frac{2}{7}\right)^5.$$

Въ частномъ случаѣ, при $n = 2$, изъ уравненія

$$\left(\frac{q^n}{p}\right)=\left(\frac{q}{p}\right)^n$$

выводимъ

$$\left(\frac{q^2}{p}\right)=\left(\frac{q}{p}\right)^2.$$

Но будетъ ли $\left(\frac{q}{p}\right)$ равно $+1$, или -1, всегда квадратъ его будетъ 1; слѣд.

$$\left(\frac{q^2}{p}\right)=1.$$

Это свойство символа $\left(\frac{Q}{p}\right)$ можетъ служить къ значительнымъ упрощеніямъ при опредѣленіи ихъ величинъ. По доказанной нами теоремѣ, мы имѣемъ

$$\left(\frac{Nq^2}{p}\right)=\left(\frac{N}{p}\right)\left(\frac{q^2}{p}\right);$$

внеся же сюда значеніе $\left(\frac{q^2}{p}\right)$ изъ предыдущаго уравненія, находимъ

$$\left(\frac{Nq^2}{p}\right)=\left(\frac{N}{p}\right).$$

На основаніи этого равенства, мы заключаемъ, что, при опре-

www.rcin.org.pl

дѣленіи величины символа $\left(\frac{Q}{p}\right)$ мы можемъ исключать изъ Q всякій множитель, составляющій точный квадратъ.

Такъ опредѣленіе $\left(\frac{45}{7}\right)$ сводится на опредѣленіе $\left(\frac{5}{7}\right)$, опредѣленіе $\left(\frac{8}{5}\right)$ — на опредѣленіе $\left(\frac{2}{5}\right)$.

Прежде чѣмъ пойдти далѣе, замѣтимъ, что, на основаніи доказанныхъ нами теоремъ относительно символа $\left(\frac{q}{p}\right)$, значеніе $\left(\frac{-q}{p}\right)$ по $\left(\frac{q}{p}\right)$ опредѣляется уравненіемъ

$$\left(\frac{-q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}\left(\frac{q}{p}\right).$$

Въ самомъ дѣлѣ, на основаніи послѣдней теоремы, разсматривая $(-q)$, какъ произведеніе (-1) и q, находимъ

$$\left(\frac{-q}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right)\left(\frac{q}{p}\right);$$

куда, внеся значеніе $\left(\frac{-1}{p}\right)$, по 28-й теоремѣ, имѣемъ

$$\left(\frac{-q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}\left(\frac{q}{p}\right),$$

что и слѣдовало доказать. Такъ, находимъ

$$\left(\frac{-3}{5}\right) = (-1)^{\frac{5-1}{2}}\left(\frac{3}{5}\right) = \left(\frac{3}{5}\right); \quad \left(\frac{-2}{7}\right) = (-1)^{\frac{7-1}{2}}\left(\frac{2}{7}\right) = -\left(\frac{2}{7}\right).$$

30. **Теорема.** *Если q и q_1 сравнимы по модулю p, то* $\left(\frac{q}{p}\right) = \left(\frac{q_1}{p}\right)$.

Доказательство. По положенію, числа q и q_1 сравнимы по модулю p. Но изъ сравненія $q \equiv q_1 \pmod{p}$,
по возведеніи обѣихъ частей его въ степень $\frac{p-1}{2}$, имѣемъ

www.rcin.org.pl

$$q^{\frac{p-1}{2}} \equiv q_1^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}.$$

Символы же $\left(\frac{q}{p}\right)$, $\left(\frac{q_1}{p}\right)$ удовлетворяютъ сравненіямъ

$$q^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{q}{p}\right), q_1^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{q_1}{p}\right) \pmod{p}.$$

Вслѣдствіе чего предыдущее сравненіе даетъ

$$\left(\frac{q}{p}\right) \equiv \left(\frac{q_1}{p}\right) \pmod{p},$$

или

$$\left(\frac{q}{p}\right) - \left(\frac{q_1}{p}\right) \equiv 0 \pmod{p}.$$

Но такъ какъ численная величина $\left(\frac{q}{p}\right)$ и $\left(\frac{q_1}{p}\right)$ есть 1, то первая часть этого сравненія, въ случаѣ неравенства значеній $\left(\frac{q}{p}\right)$ и $\left(\frac{q_1}{p}\right)$, будетъ $+2$, или -2, что невозможно: ибо p отлично отъ 2. Слѣд., оба эти символа должны имѣть одну величину, что и слѣдовало доказать.

Такъ находимъ, что $\left(\frac{23}{7}\right) = \left(\frac{23-7}{\quad}\right) = \left(\frac{23-2.7}{7}\right)$.

На основаніи этой теоремы мы заключаемъ, что символъ $\left(\frac{q}{p}\right)$ равенъ $\left(\frac{r}{p}\right)$, если r есть остатокъ отъ дѣленія q на p: ибо, какъ замѣтили въ § 8, остатокъ сравнимъ съ дѣлимымъ, когда за модуль принятъ дѣлитель. Такимъ образомъ, замѣняя въ символѣ $\left(\frac{q}{p}\right)$ число q остаткомъ отъ дѣленія q на p, мы вмѣсто $\left(\frac{q}{p}\right)$ будемъ имѣть $\left(\frac{r}{p}\right)$, гдѣ $r < p$.

§ 26. Вотъ теоремы, которыя послужатъ намъ для того, чтобы опредѣленіе какого либо символа $\left(\frac{Q}{p}\right)$ привести къ опредѣленію символовъ вида $\left(\frac{q}{p}\right)$, гдѣ q число положительное, простое и меньше p. Что же касается до опредѣленія символа $\left(\frac{-}{p}\right)$, когда q число положительное, простое и меньше p, то оно будетъ основываться на слѣдующихъ теоремахъ:

www.rcin.org.pl

31. **Теорема.** *Если мы согласимся изображать наибольшее цѣлое число, заключающееся въ данномъ количествѣ, знакомъ E (entier), поставленнымъ передъ нимъ, то значеніе* $\left(\frac{q}{p}\right)$ *опредѣлится уравненіемъ*

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{E\frac{2q}{p} + E\frac{4q}{p} + \ldots\ldots + E\frac{(p-1)q}{p}}.$$

Доказательство. Нетрудно убѣдиться, что, при p нечетномъ и a положительномъ, можно найти положительное число z, которое, будучи меньше $\frac{p}{2}$, удовлетворитъ условію

$$z \equiv (-1)^{E\frac{2a}{p}} a \ (\textit{мод. } p) \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (13).$$

Въ самомъ дѣлѣ, если $E\frac{2a}{p}$ число четное, то это сравненіе принимаетъ такой видъ

$$z \equiv a \ (\textit{мод. } p).$$

Но въ этомъ случаѣ $\frac{1}{2}E\frac{2a}{p}$ будетъ число цѣлое; а потому $a - \frac{1}{2}pE\frac{2a}{p}$ будетъ число цѣлое, удовлетворяющее сравненію

$$z \equiv a \ (\textit{мод. } p).$$

Это же число, которое можетъ быть представлено такъ

$$\frac{p}{2}\left(\frac{2a}{p} - E\frac{2a}{p}\right),$$

будетъ количествомъ положительнымъ и меньшимъ $\frac{p}{2}$: ибо, по значенію $E\frac{2a}{p}$, разность $\frac{2a}{p} - E\frac{2a}{p}$ должна быть не менѣе 0 и меньше 1.

Обращаемся теперь къ тому случаю, когда $E\frac{2a}{p}$ число не четное. Если $E\frac{2a}{p}$ число нечетное, то сравненіе (13) принимаетъ такой видъ $z \equiv -$ (*мод. p*).

Но въ этомъ случаѣ $\frac{1 + E\frac{2a}{p}}{2}$ есть число цѣлое; а потому предыдущему сравненію удовлетворимъ, полагая

*

www.rcin.org.pl

$$z = {}^{1}p\left(1 + E\frac{2a}{p}\right) - a,$$

а это число, которое иначе представится такъ

$$\frac{p}{2}\left[1 - \left(\frac{2a}{p} - E\frac{2a}{p}\right)\right],$$

очевидно, положительное и небольше $\frac{p}{2}$: ибо, какъ замѣчено выше, разность $\frac{2a}{p} - E\frac{2a}{p}$ не выходитъ изъ предѣловъ 0 и 1.

Убѣдившись такимъ образомъ въ возможности всегда удовлетворить условіямъ

$$z \equiv (-1)^{E\frac{2a}{p}} a \,(мод.\ p),\ z \text{ не } < 0 \text{ и } < \frac{p}{2},$$

назовемъ черезъ $z_1, z_2, \ldots . z_{\frac{p-1}{2}}$ числа, удовлетворяющія имъ въ предположеніяхъ $a = q$, $a = 2q, \ldots, a = \frac{p-1}{2}q$. Эти числа будутъ удовлетворять сравненіямъ

$$z_1 \equiv (-1)^{E\frac{2q}{p}} q, z_2 \equiv (-1)^{E\frac{4q}{p}} 2q, \ldots z_{\frac{p-1}{2}} \equiv (-1)^{E\frac{(p-1)q}{p}} \frac{p-1}{2}q \,(мод.\ p), \ldots (14)$$

которыя, по перемноженіи, даютъ

$$z_1 z_2 \ldots\ldots z_{\frac{p-1}{2}} \equiv$$

$$(-1)^{E\frac{2q}{p} + E\frac{4q}{p} + \ldots + E\frac{(p-1)q}{p}} 1.2\ldots\ldots\frac{p-1}{2}\, q^{\frac{p-1}{2}} \,(мод.\ p) \ldots\ldots (15).$$

Но не трудно убѣдиться, что произведеніе $z_1 z_1 \ldots . z_{\frac{p-1}{2}}$ равно произведенію $1 . 2 \ldots\ldots \frac{p-1}{2}$. Для этого мы замѣчаемъ, что числа $z_1, z_2, \ldots\ldots, z_{\frac{p-1}{2}}$ будучи меньше $\frac{p}{2}$ и не меньше 0, могутъ имѣть только значенія $0, 1, 2, \ldots\ldots \frac{p-1}{2}$.

Потомъ мы замѣчаемъ, что ни одно изъ нихъ не можетъ быть нулемъ: ибо въ противномъ случаѣ предыдущее сравненіе

www.rcin.org.pl

предполагало бы дѣлимость $1 . 2 ..... \frac{p-1}{2}$ на p; между тѣмъ какъ $1, 2, ... \frac{p-1}{2}$—числа простыя съ p. Итакъ, числа $z_1, z_2, ..., z_{\frac{p-1}{2}}$ могутъ равняться только числамъ

$$1, 2, ..., \frac{p-1}{2}.$$

Также не трудно показать, что въ ряду $z_1, z_2, ..., z_{\frac{p-1}{2}}$ нѣтъ двухъ чиселъ равныхъ. Въ самомъ дѣлѣ, если мы допустимъ, что здѣсь z_m и z_μ равны, гдѣ m и μ какія нибудь два числа, содержащіяся въ ряду $1, 2, ..., \frac{p-1}{2}$; то имѣя, по (14),

$$z^m \equiv (-1)^{E\frac{2qm}{p}} mq, \; z_\mu \equiv (-1)^{E\frac{2q\mu}{p}} \mu q \; (мод. \; p),$$

мы бы нашли

$$(-1)^{E\frac{2qm}{p}} mq \equiv (-1)^{E\frac{2q\mu}{p}} \mu q \; (мод. \; p).$$

Но это сравненіе, по сокращеніи на q, число простое съ p, даетъ

$$(-1)^{E\frac{2qm}{p}} m \equiv (-1)^{E\frac{2q\mu}{q}} \mu \; (мод. \; p),$$

что, очевидно, невозможно: ибо оно предполагаетъ дѣлимость разности

$$(-1)^{E\frac{2qm}{p}} m - (-1)^{E\frac{2q\mu}{q}} \mu$$

на p; а эта разность приводится къ одному изъ четырехъ:

$$m + \mu, \; -(m + \mu), \; m - \mu, \; -(m - \mu),$$

и такъ какъ числа m, μ взяты нами изъ ряда $1, 2, ..., \frac{p-1}{2}$ и не равны между собою, то сумма ихъ меньше p, а разность не равна нулю; слѣд. ни то, ни другое не дѣлится на p.

Такъ убѣждаемся мы, что въ составъ ряда $z_1, z_3, ... z_{\frac{p-1}{2}}$ могутъ входить только числа

www.rcin.org.pl

$$1, 2, \ldots\ldots, \frac{p-1}{2}$$

и каждое только по одному разу. Но такъ какъ эти ряды заключаютъ одинаковое число членовъ, то въ составъ перваго взойдутъ всѣ числа втораго. Слѣдов., ряды

$$z_1, z_2, \ldots\ldots\ldots z_{\frac{p-1}{2}},$$

$$1, 2, \ldots\ldots\ldots\ldots \frac{p-1}{3}$$

составлены изъ однихъ и тѣхъ же чиселъ и притомъ взятыхъ по одному разу; а потому произведеніе членовъ перваго ряда равно произведенію членовъ втораго.

Убѣдясь въ этомъ, мы можемъ замѣнить въ (15) $z_1 z_2 \ldots\ldots z_{\frac{p-1}{2}}$ числомъ $1 . 2 \ldots\ldots \frac{p-1}{2}$, послѣ чего (15), будучи сокращено на $1, 2, \ldots, \frac{p-1}{2}$, числа простыя съ p, даетъ

$$1 \equiv q^{\frac{p-1}{2}} (-1)^{E\frac{2q}{p} + E\frac{4q}{p} + \cdots + E\frac{(p-1)q}{p}} \quad (\text{мод. } p).$$

Умножая же обѣ части этого сравненія на

$$(-1)^{E\frac{2q}{p} + E\frac{4q}{p} + \cdots\cdots + E\frac{(p-1)q}{p}}$$

и замѣчая, что -1, будучи возведена въ степень

$$2\left[E\frac{2q}{p} + E\frac{4q}{p} + \cdots\cdots + E\frac{(p-1)q}{p}\right],$$

даетъ 1, находимъ

$$(-1)^{E\frac{2q}{p} + E\frac{4q}{p} \cdots\cdots + E\frac{(p-1)q}{p}} \equiv q^{\frac{p-1}{2}} \quad (\text{мод. } p).$$

Но, по свойству символа $\left(\frac{q}{p}\right)$, мы имѣемъ

$$q^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{q}{p}\right) \quad (\text{мод. } p).$$

Это же сравненіе вмѣстѣ съ предыдущемъ даетъ

$$\left(\frac{q}{p}\right) - (-1)^{E\frac{2q}{p} + E\frac{4q}{p} + \cdots\cdots + E\frac{(p-1)q}{p}} \equiv 0 \quad (\text{мод. } p);$$

www.rcin.org.pl

откуда мы заключаемъ о равенствѣ

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{E\frac{2q}{p} + E\frac{4q}{p} + \ldots + E\frac{(p-1)}{p}q};$$

ибо, въ противномъ случаѣ, первая часть этого сравненія привелась бы къ 2, или — 2, что съ нулемъ не сравнимо по модулю p, отличному отъ 2. Такъ убѣждаемся мы въ справедливости предложенной нами теоремы.

На основаніи этой теоремы, мы можемъ опредѣлить значеніе $\left(\frac{q}{p}\right)$, не возводя q въ степень $\frac{p-1}{2}$. Такъ, для опредѣленія величины $\left(\frac{5}{11}\right)$, находимъ

$$\left(\frac{5}{11}\right) = (-1)^{E\frac{2.5}{11} + E\frac{4.5}{11} + E\frac{6.5}{11} + E\frac{8.5}{11} + E\frac{10.5}{11}}.$$

Замѣчая, что

$$E\frac{2.5}{11} = E\frac{10}{11} = 0, E\frac{8.5}{11} = E\frac{40}{11} = 3,$$
$$E\frac{4.5}{11} = E\frac{20}{11} = 1, E\frac{10.5}{11} = E\frac{50}{11} = 4,$$
$$E\frac{6.5}{11} = E\frac{30}{11} = 2, \quad 0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 10,$$

мы изъ предыдущаго уравненія выводимъ

$$\left(\frac{5}{11}\right) = (-1)^{10} = 1.$$

Выведенное нами уравненіе для опредѣленія $\left(\frac{q}{p}\right)$ справедливо при всякомъ числѣ q. Но не трудно вывести изъ него уравненіе болѣе простое, которое будетъ служить для опредѣленія $\left(\frac{a}{p}\right)$, при a нечетномъ. Для этого, въ уравненіи

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{E\frac{2q}{p} + E\frac{4q}{p} + \ldots + E\frac{(p-1)q}{p}}$$

полагаемъ $q = \frac{1}{2}(a+p)$, гдѣ a, подобно p, число нечетное; это даетъ намъ

$$\left(\frac{\frac{1}{2}(a+p)}{p}\right) = (-1)^{E\frac{a+p}{p} + E\frac{2a+2p}{p} + \ldots + E\frac{\frac{p-1}{2}a + \frac{p-1}{2}p}{p}}.$$

www.rcin.org.pl

Умноживъ обѣ части этого уравненія на $\left(\frac{2}{p}\right)$, находимъ

$$\left(\frac{2}{p}\right)\left(\frac{\frac{1}{2}(a+p)}{p}\right)=\left(\frac{2}{p}\right)(-1)^{E\frac{a+p}{p}+E\frac{2a+2p}{p}+\ldots+E\frac{\frac{p-1}{2}a+\frac{p-1}{2}p}{p}}.$$

Но, по теоремѣ 29-й, произведеніе $\left(\frac{2}{p}\right)\left(\frac{\frac{1}{2}(a+p)}{p}\right)$ равно $\left(\frac{\frac{1}{2}2.(a+p)}{p}\right)$, или $\left(\frac{a+p}{p}\right)$, а это, по теоремѣ 30, равно $\left(\frac{a}{p}\right)$. Вслѣдствіе чего, изъ предыдущаго уравненія выводимъ

$$\left(\frac{a}{p}\right)=\left(\frac{2}{p}\right)(-1)^{E\frac{a+p}{p}+E\frac{2a+2p}{p}+\ldots\ldots+\frac{E\frac{p-1}{2}a+\frac{p-1}{2}p}{p}}.$$

Но

$$E\frac{a+p}{p}=E\left(\frac{a}{p}+1\right)=1+E\frac{a}{p},$$

$$E\frac{2a+2p}{p}=E\left(\frac{2a}{p}+2\right)=2+E\frac{2a}{p},$$

$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

$$E\frac{\frac{p-1}{2}a+\frac{p-1}{2}p}{p}=E\left(\frac{\frac{p-1}{2}a}{p}+\frac{p-1}{2}\right)=\frac{p-1}{2}+E\frac{\frac{p-1}{2}a}{p}.$$

Слѣдовательно,

$$\left(\frac{a}{p}\right)=\left(\frac{2}{p}\right)(-1)^{1+2+\ldots+\frac{p-1}{2}+E\frac{a}{p}+E\frac{2a}{p}+\ldots\ldots+E\frac{\frac{p-1}{2}a}{p}}.$$

А такъ какъ сумма прогрессіи $1+2+\ldots\ldots+\frac{p+1}{2}$ равна $\frac{p^2-1}{8}$, то изъ этого уравненія выходитъ

$$\left(\frac{a}{p}\right)=\left(\frac{2}{p}\right)(-1)^{\frac{p^2-1}{8}+E\frac{a}{p}+E\frac{2a}{p}+\ldots\ldots+E\frac{\frac{p-1}{2}a}{p}} \quad \ldots\ldots\ldots(16)$$

Дѣлая въ этомъ уравненіи $a=1$, и замѣчая, что

$$\left(\frac{1}{p}\right)=1, E\frac{1}{p}=0, E\frac{2}{p}=0,\ldots\ldots, E\frac{\frac{p-1}{2}}{p}=0,$$

находимъ

www.rcin.org.pl

$$1 = \left(\frac{2}{p}\right)(-1)^{\frac{p^2-1}{8}},$$

что, для опредѣленія величины $\left(\frac{2}{p}\right)$, даетъ

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{-\frac{p^2-1}{8}}.$$

Внеся отсюда величину $\left(\frac{2}{p}\right)$ въ (16), находимъ

$$E\frac{a}{p} + E\frac{2a}{p} + \ldots\ldots + E\frac{\frac{1}{2}(p-1)a}{p}$$

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (17)$$

Вотъ уравненіе, которое можетъ служить для опредѣленія $\left(\frac{a}{p}\right)$, при a нечетномъ. Оно подобно тому, которое доказали въ предыдущей теоремѣ, съ тою только разницею, что здѣсь подъ знакомъ E находятся количества вдвое меньшія.

Мы нашли также уравненіе

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{-\frac{p^2-1}{8}}.$$

Это уравненіе будетъ служить намъ при опредѣленіи $\left(\frac{q}{p}\right)$, когда q равно 2, или кратное 2. На основаніи этого уравненія, не трудно показать, что $\left(\frac{2}{p}\right)$ есть 1, если $p = 8n \pm 1$, и -1, если $p = 8n \pm 3$. Въ самомъ дѣлѣ, внося въ него $8n \pm 1$ и $8n \pm 3$ на мѣсто p, находимъ

$$\left(\frac{2}{8n\pm1}\right) = (-1)^{-\frac{(8n\pm1)^2-1}{8}} = (-1)^{-8n^2\pm2n} = 1,$$

$$\left(\frac{2}{8n\pm3}\right) = (-1)^{-\frac{(8n\pm3)^2-1}{8}} = (-1)^{-8n^2\pm6n-1} = -1;$$

отсюда слѣдуетъ теорема:

32. **Теорема.** *Если p равно $8n \pm 1$, то $\left(\frac{2}{p}\right) = 1$; если же $p = 8n \pm 3$, то $\left(\frac{2}{p}\right) = -1$.*

www.rcin.org.pl

Такъ, находимъ, что $\left(\frac{2}{17}\right) = 1$, $\left(\frac{2}{13}\right) = -1$.

На основаніи уравненія (17), мы можемъ доказать еще теорему, относящуюся до опредѣленія величины $\left(\frac{q}{p}\right)$. Она заключается въ слѣдующемъ:

33. **Теорема.** *Если a число нечетное и меньше p, то $\left(\frac{a}{p}\right)$ равно* $(-1)^{\frac{a-1}{2}\frac{p-1}{2}-E\frac{p}{a}-E\frac{2p}{a}-\ldots-E\frac{\frac{1}{2}(a-1)p}{a}}$.

Доказательство. Мы нашли (17) для опредѣленія $\left(\frac{a}{p}\right)$, когда q нечетное, такое уравненіе

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{E\frac{a}{p}+E\frac{2a}{p}+\ldots\ldots+E\frac{\frac{1}{2}(p-1)a}{p}}.$$

Посмотримъ теперь, какія значенія имѣютъ $E\frac{a}{p}$, $E\ldots\ldots\ldots E\frac{\frac{1}{2}(p-1)a}{p}$, гдѣ предполагаемъ a меньше p.

Дробь $\frac{a}{p}$ будетъ меньше 1; слѣд. $E\frac{a}{p} = 0$. Это наименьшій изъ членовъ $E\frac{a}{p}$, $E\frac{2a}{p}, \ldots\ldots\ldots, E\frac{\frac{1}{2}(p-1)a}{p}$. Наибольшій же $E\frac{\frac{1}{2}(p-1)a}{p}$ представится такъ: $E\left(\frac{a}{2}-\frac{a}{2p}\right)$, или $E\left(\frac{a-1}{2}+\frac{p-a}{2p}\right)$, а это, очевидно, равно $\frac{a-1}{2}$; ибо это есть цѣлое число, а $\frac{p-a}{2p}$ дробь меньше единицы и положительная, потому что $a < p$.

И такъ, въ ряду

$$E\frac{a}{p}, E\frac{2a}{p}, \ldots\ldots\ldots, E\frac{\frac{1}{2}(p-1)a}{p}$$

члены идутъ, возрастая отъ 0 до $\frac{p-1}{2}$. Чтобы опредѣлить сумму ихъ, мы найдемъ, сколько здѣсь членовъ равныхъ $0,1,2,\ldots\ldots\ldots, \frac{p-1}{2}$. Для этого, мы опредѣлимъ сначала, сколько здѣсь членовъ, не превосходящихъ k, гдѣ k есть одно изъ чиселъ $0,1,2,\ldots\ldots\ldots, \frac{p-1}{2}$. Съ этою цѣлію положимъ, что въ ряду

www.rcin.org.pl

$$E\frac{a}{p},\ E\frac{2a}{p},\ldots,E\frac{la}{p},\ E\frac{(l+1)a}{p},\ldots,\ E\frac{\frac{1}{2}(p-1)a}{p}\quad\ldots\ldots\ldots\ldots(18)$$

послѣдній членъ, не превосходящій k, есть $E\frac{la}{p}$: это, очевидно, будетъ имѣть мѣсто въ томъ случаѣ, когда $\frac{la}{p} < k+1$, а $\frac{(l+1)a}{p} > k+1$ (*). Но изъ этихъ неравенствъ выходитъ

$$\frac{p(k+1)}{a}-l>0,\ \frac{p(k+1)}{a}-l<1,$$

а это показываетъ, что $\frac{p(k+1)}{a}$ съ цѣлымъ числомъ l разнится количествомъ положительнымъ, но меньшимъ 1. Слѣд. l есть наибольшее цѣлое число, заключающееся въ количествѣ $\frac{p(k+1)}{a}$; а это, по нашему законоположенію, представится такъ: $E\frac{p(k+1)}{a}$. Итакъ, число членовъ въ ряду (18), не превосходящихъ k, равно $E\frac{p(k+1)}{a}$. Такимъ же образомъ находимъ, что здѣсь число членовъ, не превосходящихъ $k-1$, есть $E\frac{pk}{a}$; а отсюда заключаемъ, что число членовъ равныхъ k есть $E\frac{p(k+1)}{a}-E\frac{pk}{a}$. На основаніи этаго мы заключаемъ, что въ ряду (18) число членовъ

равныхъ 0 есть ..... $E\frac{p}{a}-E\frac{0.p}{a}$,

равныхъ 1 ..... $E\frac{2p}{a}-E\frac{p}{a}$,

равныхъ 2 ..... $E\frac{3p}{a}-E\frac{2p}{a}$,

.....

(*) Равенство здѣсь не можетъ имѣть мѣста, потому что дроби $\frac{a}{p},\ \frac{2a}{p},\ldots\ldots,\ \frac{\frac{1}{2}(p-1)a}{p}$, гдѣ p простое само по себѣ и не дѣлитъ a, не могутъ равняться цѣлому числу; дроби же $\frac{la}{p},\ \frac{(l+1)a}{p}$ взяты изъ этого ряда.

www.rcin.org.pl

равныхъ $\frac{a-1}{2}$ —1 есть.... $E\frac{\frac{1}{2}(a-1)p}{a} - E\frac{\frac{1}{2}(a-3)p}{a}$.

Что же касается до числа членовъ остальныхъ въ ряду (18), равныхъ $\frac{a-1}{2}$; то мы найдемъ, сложивъ предыдущія числа и вычтя ихъ сумму изъ $\frac{1}{2}$ (p—1), числа всѣхъ членовъ ряда (18). Такимъ образомъ находимъ, что здѣсь членовъ равныхъ $\frac{a-1}{2}$ содержится $\frac{p-1}{2} - E\frac{\frac{1}{2}(a-1)p}{a}$.

На основаніи этихъ данныхъ находимъ, что сумма всѣхъ членовъ ряда (18) составляетъ

$$0.\left(E\frac{p}{a} - E\frac{0.p}{a}\right) + 1.\left(E\frac{2p}{a} - E\frac{p}{a}\right) + 2.\left(E\frac{3p}{a} - E\frac{2p}{a}\right) +$$

.....

$$\left(\frac{a-1}{2} - 1\right)\left(E\frac{\frac{1}{2}(a-1)p}{a} - E\frac{\frac{1}{2}(a-3)p}{a}\right) +$$

$$\frac{a-1}{2}\left(\frac{p-1}{2} - E\frac{\frac{1}{2}(a-1)p}{a}\right);$$

а это приводится къ слѣдующему:

$$\frac{a-1}{2}\cdot\frac{p-1}{2} - E\frac{p}{a} - E\frac{2p}{a} - \ldots\ldots - E\frac{\frac{1}{2}(a-1)p}{a}.$$

Итакъ, сумма

$$E\frac{a}{p} + E\frac{2a}{p} + \ldots\ldots + E\frac{\frac{1}{2}(p-1)a}{p}$$

равна

$$\frac{a-1}{2}\cdot\frac{p-1}{2} - E\frac{p}{a} - E\frac{2p}{a} - \ldots\ldots - E\frac{\frac{1}{2}(a-1)p}{a}.$$

Вслѣдствіе этого, уравненіе

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{E\frac{a}{p} + E\frac{2a}{p} + \ldots\ldots + E\frac{\frac{1}{2}(p-1)a}{p}}$$

даетъ $\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{\frac{a-p}{2}\cdot\frac{p-1}{2} - E\frac{p}{a} - E\frac{2p}{a} - \ldots\ldots - E\frac{\frac{1}{2}(a-1)p}{a}}$,

что и слѣдовало доказать.

www.rcin.org.pl

Эта теорема также можетъ быть употреблена для опредѣленія значенія $\left(\frac{a}{p}\right)$, если a число нечетное и меньше p. Она весьма удобна въ приложеніи, если a число небольшое. Такъ, для величины $\left(\frac{7}{101}\right)$ она даетъ

$$\left(\frac{7}{101}\right)=(-1)^{\frac{7-1}{2}\cdot\frac{101-1}{2}-E\frac{101}{7}-E\frac{2.101}{7}-E\frac{3.101}{7}};$$

откуда выходитъ $\left(\frac{7}{101}\right)=(-1)^{3.50-14-28-43}=-1$. Но эта теорема особенно замѣчательна тѣмъ, что изъ нея очень просто выводится теорема, извѣстная подъ названіемъ *закона взаимности двухъ простыхъ чиселъ.*

34. **Теорема.** *Если* ν *и* s *суть числа простыя нечетныя и неравныя между собою, то* $\left(\frac{\nu}{s}\right)=\left(\frac{s}{\nu}\right)(-1)^{\frac{\nu-1}{2}\cdot\frac{s-1}{2}}$.

Доказательство. Пусть будетъ ν наименьшее изъ двухъ чиселъ ν, s; по данной нами теоремѣ, при $\nu<s$, значеніе $\left(\frac{\nu}{s}\right)$ опредѣлится уравненіемъ

$$\left(\frac{\nu}{s}\right)=(-1)^{\frac{\nu-1}{2}\cdot\frac{s-1}{2}-E\frac{s}{\nu}-E\frac{2s}{\nu}-\ldots\ldots-E\frac{\frac{1}{2}(\nu-1)s}{\nu}}.$$

Дѣлая же въ уравненіи (17) $a=s$, $p=\nu$, найдемъ

$$\left(\frac{s}{\nu}\right)=(-1)^{E\frac{s}{\nu}+E\frac{2s}{\nu}+\ldots\ldots+E\frac{\frac{1}{2}(\nu-1)s}{\nu}}.$$

Эти два уравненія, по перемноженіи ихъ членовъ, даютъ

$$\left(\frac{\nu}{s}\right)\left(\frac{s}{\nu}\right)=(-1)^{\frac{\nu-1}{2}\cdot\frac{s-1}{2}}.$$

Умножая же обѣ части этого уравненія на $\left(\frac{s}{\nu}\right)$, и замѣчая, что $\left(\frac{s}{\nu}\right)^2$ есть 1, находимъ

www.rcin.org.pl

$$\left(\frac{\nu}{s}\right)=\left(\frac{s}{\nu}\right)(-1)^{\frac{\nu-1}{2}\cdot\frac{s-1}{2}},$$

что и слѣдовало доказать.

Такъ, мы будемъ имѣть

$$\left(\frac{5}{7}\right)=\left(\frac{7}{5}\right)(-1)^{\frac{7-1}{2}\cdot\frac{5-1}{2}}=\left(\frac{7}{5}\right)(-1)^{3.2}=\left(\frac{7}{5}\right),$$

$$\left(\frac{11}{19}\right)=\left(\frac{19}{11}\right)(-1)^{\frac{11-1}{2}\cdot\frac{19-1}{2}}=\left(\frac{19}{11}\right)(-1)^{5.9}=-\left(\frac{19}{11}\right).$$

§ 27. На основаніи доказанныхъ нами теоремъ относительно символа $\left(\frac{q}{p}\right)$, легко найти его величину, какъ бы q и p ни были велики. Вотъ какъ слѣдуетъ поступать при опредѣленіи $\left(\frac{q}{p}\right)$.—Если q больше p, мы, по теоремѣ (30), замѣняемъ въ $\left(\frac{q}{p}\right)$ число q остаткомъ отъ дѣленія q на p, или наименьшимъ отрицательнымъ вычетомъ q, по модулю p, если онъ гораздо меньше этого остатка

Такимъ образомъ, опредѣленіе $\left(\frac{q}{p}\right)$ сведется на опредѣленіе $\left(\frac{\pm R}{p}\right)$, гдѣ R будетъ меньше p. Что касается до знака (—) при R, то, по теоремѣ 29, мы $\left(\frac{-R}{p}\right)$ можемъ выразить черезъ $\left(\frac{R}{p}\right)$ Потомъ для опредѣленія $\left(\frac{R}{p}\right)$, разлагаемъ R на произведеніе простыхъ чиселъ, исключая при этомъ множителей, составляющихъ точные квадраты. Разложивши R на произведеніе простыхъ чиселъ, мы, по теоремѣ 29, разлагаемъ $\left(\frac{R}{p}\right)$ на произведеніе нѣсколькихъ множителей вида $\left(\frac{r}{p}\right)$, гдѣ r число простое. Послѣ того ищемъ значеніе каждаго изъ этихъ символовъ, поступая такимъ образомъ: если $r=2$, то $\left(\frac{r}{p}\right)$ опредѣляемъ по теоремѣ 32; если же r нечетное, то, по закону взаимности чиселъ, выражаемъ $\left(\frac{r}{p}\right)$ черезъ $\left(\frac{p}{r}\right)$, и съ этимъ символомъ посту-

www.rcin.org.pl

паемъ также, какъ съ $\left(\frac{q}{p}\right)$, сводя опредѣленіе его на символы вида $\left(\frac{r'}{r}\right)$, гдѣ $r' < r$.

Продолжая эти дѣйствія, мы будемъ получать символы все съ меньшими и меньшими числами; поэтому, необходимо дойдемъ окончательно или до $\left(\frac{1}{r_n}\right)$, или до $\left(\frac{2}{r_n}\right)$ которыхъ величину легко найдемъ, а чрезъ нихъ опредѣлимъ и искомый $\left(\frac{q}{p}\right)$.

Объяснимъ это примѣрами. Пусть будетъ дано найти значеніе $\left(\frac{1013}{601}\right)$.

Дѣля 1013 на 601, находимъ въ остаткѣ 412; откуда слѣдуетъ, что $\left(\frac{1013}{601}\right) = \left(\frac{412}{601}\right)$.

По исключеніи изъ 412 квадрата 2, мы находимъ число простое 103, и $\left(\frac{412}{601}\right)$ приведемъ къ $\left(\frac{103}{604}\right)$; по закону же взаимности чиселъ, выводимъ

$$\left(\frac{103}{601}\right) = \left(\frac{601}{103}\right)(-1)^{\frac{601-1}{2}\cdot\frac{103-1}{2}} = \left(\frac{601}{103}\right).$$

Потомъ дѣлимъ 601 на 103 и, замѣчая, что остатокъ будетъ 86, между тѣмъ какъ наименьшій отрицательный вычетъ 601 по модулю 103 есть — 17, находимъ выгоднѣе его ввести. Это дастъ намъ

$$\left(\frac{601}{103}\right) = \left(\frac{-17}{103}\right).$$

Но $\left(\frac{-17}{103}\right) = \left(\frac{-1}{103}\right)\left(\frac{17}{103}\right)$, гдѣ $\left(\frac{-1}{103}\right) = (-1)^{\frac{103-1}{2}} = -1$.

Слѣд.,

$$\left(\frac{-17}{103}\right) = -\left(\frac{17}{103}\right).$$

Такъ какъ 17 число простое, то выводимъ

$$\left(\frac{17}{103}\right) = \left(\frac{103}{17}\right)(-1)^{\frac{17-1}{2}\cdot\frac{103-1}{2}} = \left(\frac{103}{17}\right).$$

www.rcin.org.pl

Замѣняя въ $\left(\frac{103}{17}\right)$ число 103 остаткомъ отъ дѣленія 103 на 17, имѣемъ

$$\left(\frac{103}{16}\right)=\left(\frac{1}{17}\right)=1.$$

Соединяя всѣ эти уравненія, находимъ

$$\left(\frac{1013}{601}\right)=\left(\frac{412}{601}\right)=\left(\frac{601}{103}\right)=\left(\frac{-17}{103}\right)=-\left(\frac{17}{103}\right)=-\left(\frac{103}{17}\right)=-\left(\frac{1}{17}\right)=-1.$$

Итакъ, искомая величина $\left(\frac{1013}{601}\right)$ есть — 1.

Для другаго примѣра беремъ $\left(\frac{20470}{1847}\right)$.

Повторяя надъ символомъ $\left(\frac{20470}{1847}\right)$ тѣ же дѣйствія, находимъ

$$\left(\frac{20470}{1847}\right)=\left(\frac{153}{1847}\right)=\left(\frac{3^2.17}{1847}\right)=\left(\frac{17}{1847}\right);$$

$$\left(\frac{17}{1847}\right)=\left(\frac{1847}{17}\right)(-1)^{\frac{17-1}{2}\cdot\frac{1847-1}{2}}=\left(\frac{1847}{17}\right)=\left(\frac{11}{17}\right),$$

$$\left(\frac{11}{17}\right)=\left(\frac{17}{11}\right)(-1)^{\frac{17-1}{2}\cdot\frac{11-1}{2}}=\left(\frac{17}{11}\right)=\left(\frac{6}{11}\right);$$

$$\left(\frac{6}{11}\right)=\left(\frac{2}{11}\right)\left(\frac{3}{11}\right);\ \left(\frac{2}{11}\right)=-1;$$

$$\left(\frac{3}{11}\right)=\left(\frac{11}{3}\right)(-1)^{\frac{3-1}{2}\cdot\frac{11-1}{2}}=-\left(\frac{11}{3}\right)=-\left(\frac{-1}{3}\right)=1.$$

Изъ соединенія этихъ уравненій получаемъ

$$\left(\frac{20470}{1847}\right)=-1.$$

Также, опредѣляя величину символа $\left(\frac{2108}{2003}\right)$, находимъ

$$\left(\frac{2108}{2003}\right)=\left(\frac{105}{2003}\right)=\left(\frac{3}{2003}\right)\left(\frac{5}{2003}\right)\left(\frac{7}{2003}\right);$$

$$\left(\frac{3}{2003}\right)=\left(\frac{2003}{3}\right)(-1)^{\frac{3-1}{2}\cdot\frac{2003-1}{2}}=-\left(\frac{2003}{3}\right)=-\left(\frac{2}{3}\right)=1,$$

www.rcin.org.pl

$$\left(\frac{5}{2003}\right)=\left(\frac{2003}{5}\right)(-1)^{\frac{5-1}{2}\cdot\frac{2003-1}{2}}=\left(\frac{2003}{5}\right)=\left(\frac{3}{5}\right);$$

$$\left(\frac{3}{5}\right)=\left(\frac{5}{3}\right)(-1)^{\frac{5-1}{2}\cdot\frac{3-1}{2}}=\left(\frac{5}{3}\right)=\left(\frac{2}{3}\right)=-1,$$

$$\left(\frac{7}{2003}\right)=\left(\frac{2003}{7}\right)(-1)^{\frac{7-1}{2}\cdot\frac{2003-1}{2}}=-\left(\frac{2003}{7}\right)=-\left(\frac{1}{7}\right)=-1;$$

откуда выходитъ

$$\left(\frac{2108}{2003}\right)=1.$$

§ 28. Мы показали, какъ, по даннымъ числамъ p и q, найти величину символа $\left(\frac{q}{p}\right)$, чѣмъ опредѣляется, имѣетъ ли сравненіе $z^3\equiv q\ (мод.\ p)$ рѣшенія, или нѣтъ. Теперь переходимъ къ рѣшенію обратнаго вопроса: по данной величинѣ $\left(\frac{x}{p}\right)$, найти значенія x, иначе, рѣшить уравненія $\left(\frac{x}{p}\right)=1, \left(\frac{x}{p}\right)=-1$.

Начнемъ съ перваго $\left(\frac{x}{p}\right)=1$. Мы видѣли, что уравненіе $\left(\frac{x}{p}\right)=1$ символически выражаетъ, что сравненіе $x^{\frac{p-1}{2}}\equiv 1$ $(мод.\ p)$ удовлетворяется. Не трудно узнать, что это сравненіе имѣетъ $x^{\frac{p-1}{2}}-1$ и замѣчая, что x^p-x, какъ равное $(x^{\frac{p-1}{2}}+1)(x^{\frac{p-1}{2}}-1)$, дѣлится на $x^{\frac{p-1}{2}}-1$ безъ остатка, по теоремѣ 26-ой, заключаемъ, что сравненіе $x^{\frac{p-1}{2}}\equiv 1\ (мод.\ p)$ имѣетъ $\frac{p-1}{2}$ рѣшеній. Но эти рѣшенія (§ 12) должны представиться такъ

$$x\equiv a_1,\ x\equiv a_2,\ \ldots\ldots,\ x\equiv a_{\frac{p-1}{2}}\ (мод.\ p),$$

гдѣ $a_1, a_2, \ldots, a_{\frac{p-1}{2}}$ суть числа въ ряду $0, 1, 2, \ldots p-1$, удовлетворяющія сравненію $x^{\frac{p-1}{2}}\equiv 1\ (мод.\ p)$. Притомъ ясно, что ни одно

www.rcin.org.pl

изъ этихъ чиселъ не будетъ равно нулю, ибо нуль не удовлетворяетъ сравненію $x^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$. Итакъ, въ ряду $1, 2, \ldots, p-1$ находится $\frac{p-1}{2}$ чиселъ, удовлетворяющихъ сравненію $x^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$, или уравненію $\left(\frac{x}{p}\right) = 1$, другими словами, въ ряду $1, 2, \ldots, p-1$ находится $\frac{p-1}{2}$ квадратичныхъ вычетовъ по модулю p. За тѣмъ, всѣ остальныя въ ряду $1, 2, \ldots, p-1$, ихъ будетъ также $\frac{p-1}{2}$, удовлетворятъ уравненію $\left(\frac{x}{p}\right) = -1$: это будутъ неквадратичные вычеты по модулю p.

Изъ сказаннаго нами слѣдуетъ, что всѣ числа, удовлетворяющія сравненію $x^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$, или, что одно и тоже, уравненію $\left(\frac{x}{p}\right) = 1$, опредѣляются сравненіями

$$x \equiv a_1,\ x \equiv a_2, \ldots, x \equiv a_{\frac{p-1}{2}} \pmod{p},$$

гдѣ $a_1, a_2, \ldots, a_{\frac{p-1}{2}}$ числа положительныя, меньшія p и удовлетворяющія сравненію $x^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$. Эти числа мы могли бы найти, рѣшая сравненіе $x^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$. Но это чрезвычайно затруднительно, если число p велико; потому мы предложимъ способъ находить ихъ независимо отъ рѣшенія сравненія $x^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$. Для этого, мы замѣчаемъ, что сравненіе $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ есть условіе возможности удовлетворить сравненію $z^2 \equiv a \pmod{p}$. Притомъ мы видѣли, что это сравненіе, въ случаѣ возможности, удовлетворяется двумя числами (§ 22), заключающимися въ ряду $1, 2, \ldots, p-1$; такъ что, если одно изъ этихъ чиселъ есть α, то другое $p-\alpha$. Но одно изъ

www.rcin.org.pl

этихъ чиселъ необходимо меньше $\frac{p}{2}$ и слѣд. не болѣе $\frac{p-1}{2}$: ибо сумма ихъ есть p, а они неравны между собою. Поэтому для числа a, при которомъ сравненіе $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1$ (*мод.* p) удовлетворяется, всегда найдется въ ряду $1, 2, \ldots, \frac{p-1}{2}$ число z, удовлетворяющее сравненію $z^2 \equiv a$ (*мод.* p), другими словами, для такого числа a будетъ имѣть мѣсто одно изъ сравненій

$$1^2 \equiv a,\ 2^2 \equiv a, \ldots\ldots, \left(\frac{p-1}{2}\right)^2 \equiv a \ (\textit{мод.}\ p),$$

Слѣд., число a по модулю p будетъ сравнимо съ однимъ изъ

$$1^2,\ 2^2, \ldots\ldots \left(\frac{p-1}{2}\right)^2,$$

и такъ какъ оно меньше p, то оно найдется между остатками отъ дѣленія этихъ чиселъ на p.

Итакъ, каждое изъ чиселъ $a_1, a_2, \ldots\ldots, a_{\frac{p-1}{2}}$ меньшихъ p и удовлетворяющихъ сравненію $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1$ (*мод.* p) мы найдемъ въ ряду остатковъ, получаемыхъ при дѣленіи $1^2, 2^2, \ldots, \left(\frac{p-1}{2}\right)^2$ на p. Послѣ сего, значенія x, удовлетворяющія уравненію $\left(\frac{x}{p}\right) = 1$, мы опредѣлимъ сравненіями

$$x \equiv a_1,\ x \equiv a_2, \ldots\ldots,\ x \equiv a_{\frac{p-1}{2}} \ (\textit{мод.}\ p);$$

откуда для выраженія x, удовлетворяющаго уравненію $\left(\frac{x}{p}\right) = 1$ по § 11, найдемъ (*)

$$x = np + a_1,\ x = np + a_2, \ldots\ldots,\ x = np + a_{\frac{p-1}{2}}.$$

Для примѣра, рѣшимъ уравненіе $\left(\frac{x}{11}\right) = 1$. По сказанному нами, это уравненіе будетъ имѣть $\frac{11-1}{2} = 5$ рѣшеній, которыя опредѣлятся сравненіями

$$x \equiv a_1,\ x \equiv a_2,\ x \equiv a_3,\ x \equiv a_4,\ x \equiv a_5 \ (\textit{мод.}\ 11),$$

(*) Это получаемъ мы, замѣняя въ формулахъ § 21 число N числомъ—n.

www.rcin.org.pl

гдѣ a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 суть остатки отъ дѣленія 1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2 на 11. Но такъ какъ эти остатки суть 1, 4, 9, 5, 3, то уравненію

$$\left(\frac{x}{11}\right) = 1$$

будутъ удовлетворять числа, опредѣляемыя сравненіями

$$x \equiv 1,\ x \equiv 3,\ x \equiv 4,\ x \equiv 5,\ x \equiv 9 \ (\textit{мод. } 11).$$

или, что одно и тоже, уравненіями

$$x = 11n+1,\ x = 11n+3,\ x = 11n+4,\ x = 11n+5,\ x = 11n+9.$$

Зная рѣшенія уравненія $\left(\frac{x}{p}\right) = 1$, нетрудно найти рѣшенія уравненія $\left(\frac{x}{p}\right) = -1$. Для этого мы замѣчаемъ, во первыхъ что, по значенію символа $\left(\frac{x}{p}\right)$, число x предполагается недѣлящимся на p и, во вторыхъ, что числа, неудовлетворяющія уравненію $\left(\frac{x}{p}\right) = 1$, удовлетворяютъ уравненію $\left(\frac{x}{p}\right) = -1$. Отсюда слѣдуетъ, что мы найдемъ всѣ числа, для которыхъ $\left(\frac{x}{p}\right) = -1$, если выкинемъ изъ чиселъ, недѣлящихся на p, числа, удовлетворяющія уравненію $\left(\frac{x}{p}\right) = 1$. Но всѣ числа могутъ быть представлены формулами

$$np,\ np+1,\ np+2, \ldots\ldots, np+p-1.$$

Откинувъ здѣсь первую формулу, которая даетъ числа кратныя p, мы находимъ, для рѣшенія уравненій $\left(\frac{x}{p}\right) = 1$ и $\left(\frac{x}{p}\right) = -1$,

$$np+1,\ np+2, \ldots\ldots, np+p-1.$$

Отбросивъ же здѣсь числа, удовлетворяющія уравненію $\left(\frac{x}{p}\right) = 1$, которыя опредѣляются формулами

$$np+a_1,\ np+a_2, \ldots\ldots np+a_{\frac{p-1}{2}},$$

мы найдемъ всѣ числа, удовлетворяющія уравненію $\left(\frac{x}{p}\right) = -1$.

www.rcin.org.pl

Изъ этого слѣдуетъ, что числа, удовлетворяющія уравненію $\left(\frac{x}{p}\right) = -1$, представятся формулами

$$np+b_1,\ np+b_2,\ \ldots,\ np+b_{\frac{p-1}{2}},$$

гдѣ $b_1, b_2, \ldots b_{\frac{p-1}{2}}$ суть числа ряда 1, 2,...., $p-1$, отличныя отъ $a_1, a_2, a_{\frac{p-1}{2}}$, остатковъ, получаемыхъ при дѣленіи $1^1, 2^2, \ldots, \left(\frac{p-1}{2}\right)^2$ на p.

Для примѣра, найдемъ рѣшенія уравненія $\left(\frac{x}{11}\right) = -1$. По сказанному нами, числа, удовлетворяющія этому уравненію, представятся формулами

$$11n+b_1,\ 11n+b_2,\ 11n+b_3,\ 11n+b_4,\ 11n+b_5,$$

гдѣ b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 найдемъ, выкинувъ изъ ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 числа равныя остаткамъ, получаемымъ при дѣленіи 1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2 на 11. Но эти остатки суть 1, 4, 9, 5, 3. Выкинувъ ихъ изъ ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, находимъ 2, 6, 7, 8, 10 для величинъ b_1, b_2, b_3, b_4, b_5. Откуда заключаемъ, что числа, удовлетворяющія уравненія $\left(\frac{x}{11}\right) = -1$, опредѣляются формулами.

$$11n+2,\ 11n+6,\ 11n+7,\ 11n+8,\ 11n+10.$$

Такъ рѣшается вопросъ объ опредѣленіи значеній x, по данной величинѣ $\left(\frac{x}{p}\right)$, или, что одно и тоже, объ опредѣленіи квадратичныхъ и неквадратичныхъ вычетовъ даннаго числа.

§ 29. Въ предыдущихъ параграфахъ мы занимались изслѣдованіемъ, когда сравненіе $z^2 \equiv q \pmod{p}$ имѣетъ рѣшенія и когда нѣтъ. Теперь остается показать, какъ найдутся рѣшенія сравненія $z^2 \equiv q \pmod{p}$, когда оно возможно. Говоря о сравненіяхъ вида $a^x \equiv A \pmod{p}$, мы покажемъ общій и весьма простой способъ рѣшать сравненіе $z^2 \equiv q \pmod{p}$. Здѣсь же ограничимся однимъ частнымъ случаемъ, въ которомъ это рѣше-

www.rcin.org.pl

ніе можно легко найти. Случай, которымъ мы теперь ограничимся, есть тотъ, когда p вида $4n+3$.

Возможность рѣшенія сравненія $z^2 \equiv q$ (*мод.* p), какъ видѣли, предполагаетъ, что $q^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1$ (*мод.* p). Дѣлая здѣсь $p = 4n+3$, находимъ $q^{\frac{4n+3-1}{2}} \equiv 1$ (*мод.* p), или $q^{2n+1} \equiv 1$ (*мод.* p), что, по умноженіи на q, будетъ $q^{2n+2} \equiv q$ (*мод.* p). Сличая это сравненіе съ $z^2 \equiv q$ (*мод.* p), замѣчаемъ, что послѣднему удовлетворяетъ $z = q^{n+1}$. Зная одно число, удовлетворяющее сравненію $z^2 \equiv q$ (*мод.* p), мы найдемъ подобныхъ чиселъ безконечное множество изъ сравненія $z^2 \equiv q^{n+1}$ (*мод.* p). Но мы видѣли, что одно изъ этихъ чиселъ будетъ положительное и меньше p; это остатокъ отъ дѣленія q^{n+1} на p. Называя его черезъ α, мы одно изъ рѣшеній сравненія $z^2 \equiv q$ (*мод.* p). представимъ такъ: $z \equiv \alpha$ (*мод.* p). Что касается до другаго рѣшенія этого сравненія, то по сказанному въ § 22, оно будетъ $z \equiv p - \alpha$ (*мод.* p). Такъ найдутся оба рѣшенія сравненія $z^2 \equiv q$ (*мод.* p), при $p = 4n+3$.

Для примѣра, найдемъ рѣшенія сравненія $z^2 \equiv 3$ (*мод.* 11). Оно имѣетъ рѣшенія, ибо

$$\left(\frac{3}{11}\right) = \left(\frac{11}{3}\right)(-1)^{\frac{11-1}{2}\cdot\frac{3-1}{2}} = -\left(\frac{11}{3}\right) = -\left(\frac{2}{3}\right) = 1;$$

а такъ какъ $11 = 4.2+3$, то рѣшенія его суть $z \equiv \alpha$, $z \equiv 11 - \alpha$ (*мод.* 11), гдѣ α есть остатокъ отъ дѣленія 3^{2+1} на 11. Но этотъ остатокъ есть 5; слѣд, $\alpha = 5$ и рѣшенія сравненія $z^2 \equiv 3$ (*мод.* 11) суть $z \equiv 5$, $z \equiv 6$ (*мод.* 11).

§ 30. До сихъ поръ мы занимались сравненіями второй степени, предполагая модуль ихъ числомъ простымъ. Что же касается до сравненій съ модулемъ составнымъ, то мы ограничимся только доказательствомъ, что сравненіе $z^2 \equiv q$ (*мод.* p) имѣетъ рѣшеніе, если p число нечетное, простое съ q, и въ составъ его входятъ простыя числа $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$, для которыхъ

$$\left(\frac{q}{\alpha}\right) = 1, \left(\frac{q}{\beta}\right) = 1, \left(\frac{q}{\gamma}\right) = 1, \ldots\ldots$$

www.rcin.org.pl

Начнемъ съ частнаго случая $p=\alpha^m$ и покажемъ, какъ найдутся рѣшенія сравненія $z^2\equiv q$ (*мод.* α^m), когда знаемъ рѣшенія сравненія $z^2\equiv q$ (*мод.* α), котораго возможность, какъ видѣли, условливается равенствомъ $\left(\frac{q}{\alpha}\right)=1$.

Предположимъ, что α есть число, удовлетворяющее сравненію $z^2\equiv q$ (*мод.* α), и P, Q суть числа, опредѣляемыя уравненіями

$$P=\frac{(a+\sqrt{q})^m+(a-\sqrt{q})^m}{2}.$$

$$Q=\frac{(a+\sqrt{q})^m-(a-\sqrt{q})^m}{2\sqrt{q}};$$

числа P, Q будутъ цѣлыя: въ этомъ легко убѣдиться разложеніемъ $(a+\sqrt{q})^m$, $(a-\sqrt{q})^m$ по биному Ньютона. Докажемъ теперь, во 1), что P и Q удовлетворяютъ сравненію $P^2-Q^2q\equiv 0$ (*мод.* α^m) и, во 2), что Q число простое съ α.

Въ первомъ, мы легко убѣждаемся, замѣтивъ изъ предыдущихъ уравненій, что

$$P+Q\sqrt{q}=(a+\sqrt{q})^m,\ P-Q\sqrt{q}=(a-\sqrt{q})^m.$$

Перемножая же эти уравненія между собою, находимъ

$$P^2-Q^2q=(a^2-q)^m.$$

Но, по положенію, a удовлетворяетъ сравненію $z^2\equiv q$ (*мод.* α), слѣдов. $a^2\equiv q$ (*мод.* α), что предполагаетъ дѣлимость α^2-q на α. Если же a^2-q имѣетъ дѣлителемъ α, то P^2-Q^2q, равное $(a^2-q)^m$, должно дѣлиться на α^m, а потому

$$P^2-Q^2q\equiv 0\ (\text{мод. } \alpha^m).$$

Доказавши первое, переходимъ ко второму, къ доказательству, что Q число простое съ α. Для этого, мы замѣчаемъ, что, по уравненію

$$Q=\frac{(a+\sqrt{q})^m-(a-\sqrt{q})^m}{2\sqrt{q}},$$

дѣлимость Q на α предполагаетъ сравненіе

www.rcin.org.pl

$$\frac{(a+\sqrt{q})^m-(a-\sqrt{q})^m}{2\sqrt{q}} \equiv 0 \ (\textit{мод. } \alpha).$$

Но это сравненіе, какъ не трудно убѣдиться разложеніемъ степеней $(a+\sqrt{q})^m$, $(a-\sqrt{q})^m$, содержитъ q въ цѣлыхъ степеняхъ и съ цѣлыми коэффиціентами; поэтому оно останется справедливымъ (§ 10), если въ немъ q замѣнимъ числомъ a^2, сравнимымъ съ q по модулю α. Слѣд., предыдущее сравненіе предполагаетъ

$$\frac{(a+\sqrt{a^2})^m-(a-\sqrt{a^2})^m}{2\sqrt{a^2}} \equiv 0 \ (\textit{мод. } \alpha),$$

а это приводится къ

$$2^{m-1} a^{m-1} \equiv 0 \ (\textit{мод. } \alpha),$$

сравненію невозможному: ибо α число простое, нечетное, и a простое съ α.

Убѣдясь такимъ образомъ, что P и Q удовлетворяютъ сравненію

$$P^2-Q^2q \equiv 0 \ (\textit{мод. } \alpha^m)$$

и Q число простое съ α, нетрудно доказать, что сравненіе $Qx \equiv P$ $(\textit{мод. } \alpha^m)$ имѣетъ рѣшеніе и это рѣшеніе удовлетворяетъ сравненію $x^2 \equiv q$ $(\textit{мод. } \alpha^m)$. Первое слѣдуетъ изъ того, что Q, будучи числомъ простымъ съ α, будетъ простымъ также съ α^m; въ этомъ же случаѣ сравненіе $Qx \equiv P$ $(\textit{мод. } \alpha^m)$ имѣетъ всегда одно рѣшеніе. Намъ остается теперь показать, что числа x, опредѣляемыя сравненіемъ $Qx \equiv P$ $(\textit{мод. } \alpha^m)$, удовлетворяютъ сравненію $z^2 \equiv q$ $(\textit{мод. } \alpha^m)$. Для этого мы, возведя обѣ части сравненія $Qx \equiv P$ $(\textit{мод. } \alpha^m)$ въ квадратъ, выводимъ

$$Q^2x^2 \equiv P^2 \ (\textit{мод. } \alpha^m).$$

Но, по доказанному нами, относительно чиселъ P и Q

$$P^2-Q^2q \equiv 0 \ (\textit{мод. } \alpha^m).$$

Это же сравненіе, вмѣстѣ съ предыдущимъ, даетъ

$$Q^2x^2 \equiv Q^2q \ (\textit{мод. } \alpha^m),$$

а такъ какъ Q число простое съ α и слѣд. съ α^m, то въ этомъ

www.rcin.org.pl

сравненіи обѣ части могутъ быть сокращены на Q^2, вслѣдствіе чего оно приводится къ

$$x^2 \equiv q \ (\textit{мод. } \alpha),$$

что и слѣдовало доказать.

Итакъ, мы получимъ рѣшеніе сравненія $z^2 \equiv q \ (\textit{мод. } \alpha^m)$ изъ сравненія

$$Qz \equiv P \ (\textit{мод. } \alpha^m),$$

гдѣ P и Q найдутся изъ уравненій

$$P = \frac{(a+\sqrt{q})^m + (a-\sqrt{q})^m}{2}, \quad Q = \frac{(a+\sqrt{q})^m - (a-\sqrt{q})^m}{2\sqrt{q}}$$

по a—числу, удовлетворяющему сравненію

$$a^2 \equiv q \ (\textit{мод. } \alpha).$$

Для примѣра, возьмемъ сравненіе $z^2 \equiv -2 \ (\textit{мод. } 3^3)$. По сказанному нами, число, удовлетворяющее ему, найдется изъ сравненія

$$Qz \equiv P \ (\textit{мод. } 3^3),$$

гдѣ

$$P = \frac{(a+\sqrt{-2})^3 + (a-\sqrt{-2})^3}{2}, \quad Q = \frac{(a+\sqrt{-2})^3 - (a-\sqrt{-2})^3}{2\sqrt{-2}}$$

и a есть число, удовлетворяющее сравненію $a^2 \equiv -2 \ (\textit{мод. } 3)$.

Послѣднее сравненіе относится къ числу тѣхъ, которыя рѣшаются по способу показанному въ § 29; рѣшая его по этому способу, мы находимъ, что ему удовлетворяетъ 1. Дѣлая $a=1$ въ уравненіяхъ, опредѣляющихъ P и Q, имѣемъ

$$P = \frac{(1+\sqrt{-2})^3 + (1-\sqrt{-2})^3}{2} = -5,$$

$$Q = \frac{(1+\sqrt{-2})^3 - (1-\sqrt{-2})^3}{2\sqrt{-2}} = 1.$$

Отсюда, для опредѣленія z—числа, удовлетворяющаго сравненію $z^2 \equiv -2 \ (\textit{мод. } 3^3)$, выходитъ

$$z \equiv -5 \ (\textit{мод. } 3^3).$$

Показавши, какимъ образомъ рѣшается сравненіе $z^2 \equiv q \ (\textit{мод.}$

www.rcin.org.pl

α^m), гдѣ α какое нибудь простое нечетное число, переходимъ къ рѣшенію сравненія $z^2 \equiv q$ (*мод.* $\alpha^m\beta^n\gamma^r$.....).

Если $\left(\frac{q}{\alpha}\right)=1, \left(\frac{q}{\beta}\right)=1, \left(\frac{q}{\gamma}\right)=1$,....., то, по сказанному нами, найдутся числа u, v, w,...., удовлетворяющія сравненіямъ

$$u^2 \equiv q \ (\text{мод. } \alpha^m),\ v^2 \equiv q \ (\text{мод. } \beta^n),\ w^2 \equiv q \ (\text{мод. } \gamma^r) \ldots .$$

Эти числа опредѣлятся такими сравненіями

$$u \equiv A \ (\text{мод. } \alpha^m),\ v \equiv B \ (\text{мод. } \beta^n),\ w \equiv C \ (\text{мод. } \gamma^r), \ldots ,$$

Но нетрудно убѣдиться, что между числами, опредѣляемыми каждымъ изъ этихъ сравненій, найдется число

$$A(\beta^n\gamma^r \ldots)^{\alpha^{m-1}(\alpha-1)} + B(\alpha^m\gamma^r \ldots)^{\beta^{n-1}(\beta-1)} + C(\alpha^m\beta^n \ldots)^{\gamma^{r-1}(\gamma-1)} + \ldots$$

Въ самомъ дѣлѣ, это число по модулю α^m сравнимо съ $A\,(\beta^n\gamma^r.....)^{\alpha^{m-1}(\alpha-1)}$, гдѣ $(\beta^n\gamma^r.....)^{\alpha^{m-1}(\alpha-1)}$, по теоремѣ 17, сравнимо съ 1 по тому же модулю α^m, и, слѣд., $A\,(\beta^n\gamma^r.....)^{\alpha^{m-1}(\alpha-1)}$ сравнимо съ A. Также докажется, что это число сравнимо съ B по модулю β^n, съ C по модулю γ^r, и т. д.... А потому, это число будетъ удовлетворять каждому изъ сравненій

$$u^2 \equiv q \ (\text{мод. } \alpha^m),\ v^2 \equiv q \ (\text{мод. } \beta^n),\ w^2 \equiv q \ (\text{мод. } \gamma^r), \ldots ,$$

и слѣд., называя его черезъ x, будемъ имѣть

$$x^2 \equiv q \ (\text{мод. } \alpha^m),\ x^2 \equiv q \ (\text{мод. } \beta^n),\ x^2 \equiv q \ (\text{мод. } \gamma^r), \ldots .$$

Но такъ какъ въ этихъ сравненіяхъ модули α^m, γ^n γ^r,...., числа относительно другъ друга простыя: ибо α, β, γ,.,. суть различныя простыя числа; то, по § 9, эти сравненія предполагаютъ

$$x^2 \equiv q \ (\text{мод, } \alpha^m\ \beta^n\ \gamma^r \ldots .).$$

Такъ опредѣлится x, удовлетворяющій сравненію

$$x^2 \equiv q \ (\text{мод. } p),$$

гдѣ q число простое съ p, а p число нечетное, состоящее изъ произведенія простыхъ чиселъ α, β, γ,....., для которыхъ

www.rcin.org.pl

$$\left(\frac{q}{\alpha}\right)=1, \left(\frac{q}{\beta}\right)=1, \left(\frac{q}{\gamma}\right)=1, \ldots\ldots$$

Этимъ мы оканчиваемъ теорію сравненій второй степени.

ГЛАВА V.

О сравненіяхъ двучленныхъ.

§ 31. Подъ именемъ сравненій двучленныхъ разумѣютъ сравненія такого вида

$$x^n - A \equiv 0 \ (\textit{мод. } p),$$

гдѣ n, A, p какія нибудь числа. Мы начнемъ съ простѣйшаго случая: $A=1$, p—число простое. Мы будемъ предполагать p отличнымъ отъ 2; ибо, по § 20, при $p=2$ сравненіе $x^n - A \equiv 0$ (*мод. p*,) приводится къ 1-й степени.

Относительно сравненій вида $x^n - 1 \equiv 0$ (*мод. p.*), мы докажемъ слѣдующую теорему:

34. **Теорема.** *Если одно и тоже число удовлетворяетъ сравненіямъ* $x^m - 1 \equiv 0$, $x^n - 1 \equiv 0$ (*мод. p*), *то оно удовлетворяетъ также сравненію* $x^\omega - 1 \equiv$ (*мод. p*), *гдѣ* ω *общій наибольшій дѣлитель чиселъ* m *и* n.

Доказательство. Пусть будетъ a то число, которое удовлетворяетъ и сравненію $x^m - 1 \equiv 0$ (*мод. p*) и сравненію $x^n - 1 \equiv 0$ (*мод. p*); мы будемъ имѣть

$$a^m \equiv 1, \ a^n \equiv 1 \ (\textit{мод. } p),$$

и a будетъ число простое съ p, ибо иначе было бы $x^m \equiv 0$ (*мод. p*).

По положенію, ω будучи общимъ наибольшимъ дѣлителемъ чиселъ m и n, въ частныхъ $\frac{m}{\omega}$, $\frac{n}{\omega}$, дастъ числа простыя между собою. Но при $\frac{m}{\omega}$, $\frac{n}{\omega}$ простыхъ между собою найдется z, удовлетворяющее сравненію $\frac{m}{\omega} z - 1 \equiv 0 \left(\textit{мод. } \frac{n}{\omega}\right)$, что пред-

www.rcin.org.pl

полагаетъ дѣлимость $\frac{m}{\omega}z-1$ на $\frac{n}{\omega}$. Означая частное отъ этого дѣленія чрезъ y, найдемъ

$$\frac{m}{\omega}z-1=\frac{n}{\omega}y;$$

откуда выходитъ

$$mz-ny=\omega \ldots\ldots\ldots (19).$$

Но изъ сравненій

$$a^m \equiv 1,\ a^n \equiv 1 \ (\textit{мод. } p),$$

возводя первое въ степень z, второе въ степень y, выводимъ

$$a^{mz} \equiv a^{ny} \ (\textit{мод. } p),$$

что, по сокращеніи на a^{ny} (число простое съ p, ибо, видѣли, a простое съ p), даетъ

$$a^{mz-ny} \equiv 1 \ (\textit{мод. } p),$$

гдѣ, замѣняя $mz-ny$ черезъ ω по (19), имѣемъ

$$a^{\omega} \equiv 1 \ (\textit{мод. } p),$$

что и слѣдовало доказать.

На основаніи этой теоремы, не трудно доказать слѣдующую:

35. **Теорема.** *Сравненіе* $x^m-1\equiv 0$ (*мод.* p) *имѣетъ* ω *рѣшеній, если* ω *есть общій наибольшій дѣлитель чиселъ* m *и* $p-1$, *и эти рѣшенія найдутся изъ сравненія* $x^{\omega}-1\equiv 0$ (*мод.* p).

Доказательство. Сравненію $x^m-1\equiv 0$ (*мод.* p). могутъ удовлетворять только числа, недѣлящіяся на p; ибо для x, кратнаго p, будетъ $x^m \equiv 0$ (*мод.* p). Но, по теоремѣ Фермата, для x, недѣлящагося на p будетъ

$$x^{p-1}-1 \equiv 0 \ (\textit{мод. } p).$$

Итакъ, всѣ числа, удовлетворящія сравненію $x^m-1\equiv 0$ (*мод.* p), будутъ также удовлетворять сравненію $x^{p-1}-1\equiv 0$ (*мод.* p); откуда слѣдуетъ, по доказанной нами теоремѣ, что эти числа будутъ удовлетворять сравненію

$$x^{\omega}-1\equiv 0 \ (\textit{мод. } p),$$

гдѣ ω общій наибольшій дѣлитель чиселъ $p-1$ и m.

www.rcin.org.pl

Также не трудно убѣдиться въ обратномъ, что всѣ числа, удовлетворяющія этому сравненію, будутъ удовлетворять и сравненію $x^m - 1 \equiv 0$ (*мод. p*).

Въ самомъ дѣлѣ, изъ сравненія $x^\omega - 1 \equiv 0$ (*мод. p*) выходитъ $x^\omega \equiv 1$ (*мод. p*), а это, по возведеніи въ степень $\frac{m}{\omega}$ (число $\frac{m}{\omega}$ есть цѣлое, ибо ω есть дѣлитель m), даетъ $x^m \equiv 1$ (*мод. p*), или $x^m - 1 \equiv 0$ (*мод. p.*).

Итакъ, сравненіямъ $x^m - 1 \equiv 0$, $x^\omega - 1 \equiv 0$ (*мод. p*) будутъ удовлетворять однѣ и тѣ же числа. Намъ остается теперь показать, что эти сравненія имѣютъ ω рѣшеній. Это легко сдѣлать надъ сравненіемъ $x^\omega - 1 \equiv 0$ (*мод. p*). Такъ какъ ω есть дѣлитель $p-1$, то $\frac{p-1}{\omega}$ есть число цѣлое; называя его черезъ n, найдемъ $p - 1 \equiv \omega n$. Вслѣдствіе чего $x^p - x$ представится такъ $x(x^{n\omega} - 1)$, или $x\,[(x^\omega)^n - 1^n]$, а это дѣлится на $x^\omega - 1$: ибо разность степеней дѣлится на разность корней. Но, если $x^p - x$ дѣлится на $x^\omega - 1$ безъ остатка, то, по 26-ой теоремѣ, сравненіе $x^\omega - 1 \equiv 0$ (*мод. p*) имѣетъ ω рѣшеній. А такъ какъ это сравненіе удовлетворяется одними числами съ $x^m - 1 \equiv 0$ (*мод. p*), то и это сравненіе имѣетъ ω рѣшеній; откуда и слѣдуетъ предложенная нами теорема.

Такъ, сравненіе $x^{10} - 1 \equiv 0$ (*мод.* 17), гдѣ общій наибольшій дѣлитель чиселъ 10 и 17—1 есть 2, будетъ имѣть только два рѣшенія, которыя найдутся изъ сравненія $x^2 \equiv 1$ (*мод.* 17). Замѣчая, что этому сравненію удовлетворяетъ 1 и 17—1 = 16, вслѣдствіе чего рѣшенія его суть

$$x \equiv 1,\ x \equiv 16 \text{ (мод. 17)},$$

мы заключаемъ, что рѣшенія сравненія $x^{10} - 1 \equiv 0$ (*мод.* 17) суть

$$x \equiv 1,\ x \equiv 16 \text{ (мод. 17)}.$$

На основаніи этой теоремы, рѣшеніе сравненія $x^m - 1 \equiv 0$ (*мод. p.*) сводится на рѣшеніе сравненія $x^\omega - 1 \equiv 0$ (*мод. p*), гдѣ ω дѣлитъ $p - 1$. Этимъ-то сравненіемъ мы теперь и займемся. Относительно его мы докажемъ слѣдующую теорему:

36. **Теорема.** *Сравненію* $x^\omega - 1 \equiv 0$ (*мод. p*), *гдѣ* ω *дѣлитъ* $p - 1$, *удовлетворяетъ число* $\alpha = n^{\frac{p-1}{\omega}}$, *если* n *простое съ* p.

www.rcin.org.pl

Доказательство. Въ самомъ дѣлѣ, полагая $\alpha = n^{\frac{p-1}{\omega}}$, находимъ

$$\alpha^{\omega} - 1 = n^{p-1} - 1.$$

Но, по теоремѣ Фермата, при n простомъ съ p будетъ

$$n^{p-1} - 1 \equiv 0 \pmod{p},$$

слѣдовательно, также

$$\alpha^{\omega} - 1 \equiv 0 \pmod{p},$$

что и слѣдовало доказать.

Такъ, $2^{\frac{11-1}{5}}$, $3^{\frac{11-1}{5}}$, $4^{\frac{11-1}{5}}$, ... будутъ удовлетворять сравненію $x^5 - 1 \equiv 0 \pmod{11}$.

Такимъ образомъ мы можемъ найти нѣсколько рѣшеній сравненія $x^{\omega} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$. Что же касается до опредѣленія всѣхъ его рѣшеній, то относительно ихъ докажется слѣдующая теорема:

37. **Теорема.** *Если число* θ *удовлетворяетъ сравненію* $x^{\omega} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ *и не удовлетворяетъ сравненіямъ* $x^{\alpha} - 1 \equiv 0$, $x^{\beta} \equiv 1$, ..., $x^{\varsigma} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$, *гдѣ* $\alpha, \beta, \ldots, \varsigma$ *суть дѣлители* ω (*включая сюда и* 1); *то всѣ* ω *рѣшеній сравненія* $x^{\omega} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ *опредѣлятся такъ*

$$x \equiv \theta,\ x \equiv \theta^2, \ldots\ldots,\ x \equiv \theta^{\omega} \pmod{p}.$$

Доказательство. Не трудно убѣдиться, что, если θ удовлетворяетъ сравненію $x^{\omega} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$, то ему удовлетворяетъ и θ^n, какое бы ни было число n. Въ самомъ дѣлѣ, если θ удовлетворяетъ сравненію $x^{\omega} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$, то $\theta^{\omega} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$, или $\theta^{\omega} \equiv 1 \pmod{p}$. Но, возведя обѣ части этого сравненія въ степень n, находимъ $\theta^{n\omega} \equiv 1 \pmod{p}$, или $\theta^{n\omega} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$, а это показываетъ, что θ^n удовлетворяетъ сравненію $x^{\omega} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$. На основаніи этого, мы заключаемъ, что $\theta, \theta^2, \ldots\ldots, \theta^{\omega}$ будутъ удовлетворять сравненію $x^{\omega} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$, и слѣд. будутъ удовлетворять ему всѣ числа, опредѣляемыя сравненіями

$$x \equiv \theta,\ x \equiv \theta^2, \ldots\ldots,\ x \equiv \theta^{\omega} \pmod{p} \ldots\ldots (20)$$

www.rcin.org.pl

Докажемъ же теперь, что въ этомъ ряду сравненій нѣтъ двухъ сравненій, тождественныхъ между собою. Для этого, допустимъ противное, допустимъ, что здѣсь какія нибудь два сравненія

$$x \equiv \theta^m,\ x \equiv \theta^n \ (\textit{мод. } p)$$

тождественны между собою, числа m и n, какъ показатели θ въ сравненіяхъ (20), будутъ болѣе 0 и не болѣе ω, и пусть m будетъ болѣе n.

Допустивши, что сравненія $x \equiv \theta^m,\ x \equiv \theta^n$ (*мод. p*) удовлетворяются однимъ и тѣмъ же числомъ x, мы находимъ $\theta^m \equiv \theta^n$ (*мод. p*), что, по сокращеніи на θ^n, даетъ

$$\theta^{m-n} - 1 \equiv 0 \ (\textit{мод. } p).$$

Это сравненіе вмѣстѣ съ сравненіемъ $\theta\omega \equiv 1$ (*мод. p*), которому θ удовлетворяетъ, по положенію, предполагаетъ

$$\theta^{\omega'} - 1 \equiv 0 \ (\textit{мод. } p),$$

гдѣ ω' общій наибольшій дѣлитель $m-n$ и ω (смотр. теор. 34). Но ω' не можетъ быть равнымъ ω: ибо ω' есть дѣлитель $m-n$, гдѣ m и n болѣе 0 и не болѣе ω а потому $m-n < \omega$. Но, если число ω' меньше ω, то, дѣля ω, оно должно быть однимъ изъ дѣлителей его: $\alpha, \beta, \ldots\ldots \varsigma$; вслѣдствіе чего предыдущее сравненіе должно быть однимъ изъ сравненій:

$$\theta^\alpha - 1 \equiv 0,\ \theta^\beta - 1 \equiv 0, \ldots\ldots,\ \theta^\varsigma - 1 \equiv 0 \ (\textit{мод. } p).$$

Эти же сравненія, по положенію, не могутъ имѣть мѣста. Итакъ, между сравненіями $x \equiv \theta,\ x \equiv \theta^2, \ldots\ldots,\ x \equiv \theta\omega$ (*мод. p*) не можетъ быть двухъ тождественныхъ между собою, слѣд. въ нихъ заключаются всѣ ω рѣшеній сравненія

$$x^\omega - 1 \equiv 0 \ (\textit{мод. } p),$$

что и слѣдовало доказать.

Такъ, чтобы найти всѣ рѣшенія сравненія $x^6 - 1 \equiv 0$ (*мод.* 13), мы должны найти число, которое бы удовлетворяло ему, не удовлетворяя сравненіямъ

www.rcin.org.pl

$$x-1 \equiv 0,\ x^2-1 \equiv 0,\ x^3-1 \equiv 0 \ (\textit{мод. } 13).$$

Замѣчая, что такое свойство принадлежитъ числу 4, мы заключаемъ, что рѣшенія сравненія $x^6-1 \equiv 0$ (*мод.* 13) суть

$$x \equiv 4,\ x \equiv 4^2,\ x \equiv 4^3,\ x \equiv 4^4,\ x \equiv 4^5,\ x \equiv 4^6 \ (\textit{мод. } 13),$$

или

$$x \equiv 4,\ x \equiv 3,\ x \equiv 12,\ x \equiv 9,\ x \equiv 10,\ x \equiv 1 \ (\textit{мод. } 13).$$

§ 32. Переходимъ теперь къ сравненіямъ $x^m - A \equiv 0$ (*мод.* p), гдѣ A какое нибудь число, недѣлящееся на p, а p число простое, которое мы опять предполагаемъ отличнымъ отъ 2.

Относительно сравненій этого вида, мы докажемъ слѣдующую теорему.

38. **Теорема.** *Сравненіе* $x^m - A \equiv 0$ (*мод.* p) *возможно только въ томъ случаѣ, когда* $A^{\frac{p-1}{\omega}} \equiv 1$ (*мод.* p), *гдѣ* ω *общій наибольшій дѣлитель чиселъ* $p-1$ *и* m. *Когда же это сравненіе возможно, оно имѣетъ* ω *рѣшеній, которыя найдутся изъ сравненія* $x^\omega - A^\pi \equiv 0$, (*мод.* p), *гдѣ* π *есть число, удовлетворяющее условію* $\frac{m}{\omega}\pi \equiv 1 \left(\textit{мод. } \frac{p-1}{\omega}\right)$.

Доказательство. Мы предполагаемъ A недѣлящимся на p; поэтому число x, удовлетворяющее сравненію $x^m - A \equiv 0$ (*мод.* p), или $x^m \equiv A$ (*мод.* p), не можетъ быть кратнымъ p: ибо въ этомъ случаѣ было бы $x^m \equiv 0$ (*мод.* p), и сравненіе $x^m \equiv A$ (*мод.* p) дало бы $A \equiv 0$ (*мод.* p). Но если x не дѣлится на p, то, по теоремѣ Фермата, будетъ

$$x^{p-1} \equiv 1 \ (\textit{мод. } p).$$

Возводя обѣ части этого сравненія въ степень $\frac{m}{\omega}$, а члены сравненія $x^m \equiv A$ (*мод.* p) въ степень $\frac{p-1}{\omega}$ (числа $\frac{m}{\omega}$, $\frac{p-1}{\omega}$ будутъ цѣлыя, ибо ω есть общій дѣлитель m и $p-1$), находимъ

$$x^{\frac{m(p-1)}{\omega}} \equiv 1, x^{\frac{m(p-1)}{\omega}} \equiv A^{\frac{p-1}{\omega}} \ (\textit{мод. } p);$$

www.rcin.org.pl

откуда слѣдуетъ

$$A^{\frac{p-1}{\omega}} \equiv 1 \ (\textit{мод. } p).$$

Итакъ, для возможности сравненія $x^m - A \equiv 0 \ (\textit{мод. } p.)$, необходимо, чтобы A удовлетворяло сравненію

$$A^{\frac{p-1}{\omega}} \equiv 1 \ (\textit{мод. } p) \ldots\ldots\ldots (21).$$

Предположимъ теперь, что это условіе выполняется и докажемъ, что въ такомъ случаѣ всѣ числа, удовлетворяющія сравненію $x^m \equiv A \ (\textit{мод. } p)$, удовлетворяютъ также сравненію $x^\omega \equiv A^\pi \ (\textit{мод. } p)$, гдѣ π число, опредѣляемое сравненіемъ

$$\frac{m}{\omega}\pi \equiv 1 \left(\textit{мод.} \frac{p-1}{\omega}\right).$$

Число ω будучи общимъ наибольшимъ дѣлителемъ чиселъ m и $p-1$, въ частныхъ $\frac{m}{\omega}$, $\frac{p-1}{\omega}$ даетъ числа, простыя между собою. Но, при $\frac{m}{\omega}$, $\frac{p-1}{\omega}$ простыхъ между собою, найдется число π, удовлетворяющее сравненію $\frac{m}{\omega}\pi \equiv 1 \left(\textit{мод. } \frac{p-1}{\omega}\right)$, и для такого числа π разность $\frac{m}{\omega}\pi - 1$ будетъ дѣлиться на $\frac{p-1}{\omega}$

Называя ς частное отъ этого дѣленія, будемъ имѣть

$$\frac{m}{\omega}\pi - 1 = \varsigma\frac{p-1}{\omega},$$

или $$m\pi - \varsigma\ (p-1) = \omega \ldots\ldots\ldots\ldots (22).$$

На основаніи этого уравненія, мы покажемъ, что сравненіе

$$x^m \equiv A \ (\textit{мод. } p)$$

предполагаетъ

$$x^\omega \equiv A^\pi (\textit{мод. } p).$$

Въ самомъ дѣлѣ, возводя обѣ части сравненія $x^m \equiv A$ *(мод. p)* въ степень π, находимъ $x^{m\pi} \equiv A^\pi$ *(мод. p)*; по тео-

www.rcin.org.pl

ремѣ же Ферма́та, имѣемъ $x^{(p-1)} \equiv 1$ *(мод. p)*, гдѣ, возведя обѣ части въ степень ς, получаемъ

$$x^{\varsigma(p-1)} \equiv 1, \text{ или } 1 \equiv x^{\varsigma(p-1)} \text{ (мод. } p).$$

Но изъ сравненій

$$x^{m\pi} \equiv A^{\pi}, \; 1 \equiv x^{\varsigma(p-1)} \text{ (мод. } p),$$

перемножая ихъ почленно, выводимъ $x^{m\pi} \equiv A^{\pi} x^{\varsigma(p-1)}$ (мод. p), что, по сокращеніи на $x^{\varsigma(p-1)}$, будетъ

$$x^{m\pi-\varsigma(p-1)} \equiv A^{\pi} \text{ (мод. } p).$$

Замѣняя же здѣсь $m\pi-\varsigma\,(p-1)$ числомъ ω, по (22), найдемъ

$$x^{\omega} \equiv A^{\pi} \text{ (мод. } p),$$

что и слѣдовало доказать.

Изъ этого видно, что сравненіе $x^m \equiv A$ (мод. p) не можетъ имѣть рѣшеній, отличныхъ отъ рѣшеній $x^{\omega} \equiv A^{\pi}$ (мод. p).

Убѣдившись въ этомъ, мы докажемъ остальную часть предложенной нами теоремы. Для этого, мы докажемъ, что сравненіе $x^{\omega} \equiv A$ (мод. p) имѣетъ ω рѣшеній и что всѣ они удовлетворяютъ сравненію $x^m \equiv A$ (мод. p).

Чтобы увѣриться въ первомъ, мы, по § 21, ищемъ остатокъ, получаемый при дѣленіи $x^p - x$ на $x^{\omega} - A^{\pi}$. Этотъ остатокъ мы легко находимъ, замѣчая, что $x^p - x$ можетъ быть такъ представлено

$$[(x^{\omega})^{\frac{p-1}{\omega}} - (A^{\pi})^{\frac{p-1}{\omega}}]x + (A^{\frac{\pi(p-1)}{\omega}} - 1)x,$$

гдѣ $[(x^{\omega})^{\frac{p-1}{\omega}} - (A^{\pi})^{\frac{p-1}{\omega}}]\,x$, очевидно, дѣлится на $x^{\omega} - A^{\pi}$. Откуда слѣдуетъ, что искомый остатокъ есть

$$[A^{\frac{\pi(p-1)}{\omega}} - 1]x.$$

Но здѣсь коэффиціентъ $A^{\frac{\pi(p-1)}{\omega}} - 1$ дѣлится на p, ибо, по (21), имѣемъ

www.rcin.org.pl

$$A^{\frac{p-1}{\omega}} \equiv 1 \ (\mathit{мод.}\ p),$$

что, по возведеніи въ степень π, даетъ

$$A^{\frac{\pi(p-1)}{\omega}} \equiv 1 \ (\mathit{мод.}\ p);$$

слѣд., по теоремѣ 26, сравненіе $x^{\omega} \equiv A^{\pi}$ $(\mathit{мод.}\ p)$ имѣетъ ω рѣшеній.

Намъ остается теперь доказать, что всѣ рѣшенія сравненія $x^{\omega} \equiv A^{\pi}$ $(\mathit{мод.}\ p)$ удовлетворяютъ сравненію $x^{m} - A \equiv 0$ $(\mathit{мод.}\ p)$. Для этого, мы замѣтимъ, что сравненіе $x^{\omega} \equiv A^{\pi}$ $(\mathit{мод.}\ p)$, по возведеніи его частей въ степень $\frac{m}{\omega}$, даетъ $x^{m} \equiv A^{\frac{\pi m}{\omega}}$ $(\mathit{мод.}\ p)$. Вычитая же A изъ обѣихъ частей этого сравненія, найдемъ

$$x^{m} - A \equiv A^{\frac{\pi m}{\omega}} - A \ (\mathit{мод.}\ p),$$

или

$$x^{m} - A \equiv A\left(A^{\frac{\pi m - \omega}{\omega}} - 1\right) \ (\mathit{мод.}\ p).$$

Внося сюда величину πm изъ (22), получаемъ

$$x^{m} - A \equiv A\left(A^{\frac{\varsigma(p-1)}{\omega}} - 1\right) \ (\mathit{мод.}\ p) \ldots\ldots\ldots\ldots (23)$$

Но, по (21), A удовлетворяетъ сравненію

$$A^{\frac{p-1}{\omega}} \equiv 1 \ (\mathit{мод.}\ p),$$

которое, по возведеніи его частей въ степень ς, будетъ

$$A^{\frac{\varsigma(p-1)}{\omega}} \equiv 1 \ (\mathit{мод.}\ p),$$

или

$$A^{\frac{(p-1)}{\omega}} - 1 \equiv 0 \ (\mathit{мод.}\ p).$$

*

www.rcin.org.pl

Вслѣдствіе же этого, сравненіе (23) приводится къ такому:

$$x^m - A \equiv 0 \pmod{p},$$

что и оставалось намъ доказать.

Для примѣра, возьмемъ сравненіе

$$x^8 - 3 \equiv 0 \pmod{11},$$

Общій наибольшій дѣлитель 8 и 11—1 есть 2. Слѣд., для возможности этого сравненія, необходимо должно быть $3^{\frac{11-1}{2}} \equiv 1 \pmod{11}$. Это условіе выполняется, ибо $3^{\frac{11-1}{2}} = 3^5 = 243$, что сравнимо съ 1 по модулю 11. Рѣшенія же этого сравненія найдутся изъ сравненія $x^2 - 3\pi \equiv 0 \pmod{11}$, гдѣ π опредѣляется условіемъ

$$\tfrac{8}{2}\pi \equiv 1 \left(\text{мод. } \frac{11-1}{2}\right).$$

или

$$4\pi \equiv 1 \pmod{5}$$

Рѣшая это сравненіе по способу, показанному въ § 15, находимъ $\pi \equiv 4^{5-2} \equiv 64 \pmod{5}$.

Откуда видимъ, что за π можно взять 4. Вслѣдствіе этого сравненіе $x^2 - 3\pi \equiv 0 \pmod{11}$ даетъ $x^2 - 81 \equiv 0 \pmod{11}$.

Но этому сравненію удовлетворяетъ $x = 9$ и $x = 11 - 9 = 2$
Слѣд., рѣшенія сравненія $x^8 - 3 \equiv 0 \pmod{11}$
суть

$$x \equiv 2,\ x \equiv 9 \pmod{11}.$$

Изъ доказанной нами теоремы, относительно сравненій вида $x^m - A \equiv 0 \pmod{p}$, выводимъ слѣдующую:

39. **Теорема.** *Сравненіе* $x^m + 1 \equiv 0 \pmod{p}$ *не имѣетъ рѣшенія, если* $p - 1$, *по освобожденіи отъ общихъ множителей съ* m, *приводится къ числу нечетному. Въ противномъ случаѣ, это сравненіе имѣетъ* ω *рѣшеній, если* $p - 1$ *и* m *имѣютъ общимъ наибольшимъ дѣлителемъ* ω, *и эти рѣшенія найдутся изъ сравненія* $x^\omega + 1 \equiv 0 \pmod{p}$.

www.rcin.org.pl

Доказательство. По теоремѣ 38, для возможности сравненія $x^m + 1 \equiv 0$ (*мод. p*) необходимо, чтобы удовлетворялось сравненіе

$$(-1)^{\frac{p-1}{\omega}} \equiv 1 \text{ (мод. } p\text{)};$$

а это не можетъ имѣть мѣста, если $\frac{p-1}{\omega}$ число нечетное; слѣд. частное отъ дѣленія $p-1$ на ω, общій наибольшій дѣлитель чиселъ m и $p-1$, должно быть числомъ четнымъ. Если-же $\frac{p-1}{\omega}$ число четное, то условіе

$$(-1)^{\frac{p-1}{\omega}} \equiv 1 \text{ (мод. } p\text{)}$$

выполняется, а въ этомъ случаѣ, по доказанной нами теоремѣ, сравненіе $x^m + 1 \equiv 0$ (*мод. p*) имѣетъ ω рѣшеній и эти рѣшенія найдутся изъ сравненія $x^\omega - (-1)^\pi \equiv 0$ (*мод. p*), гдѣ π есть число, удовлетворяющее сравненію

$$\frac{m}{\omega}\pi \equiv 1 \left(\text{мод. } \frac{p-1}{\omega}\right).$$

Но такъ какъ въ послѣднемъ сравненіи модуль—число четное, а вторая часть не дѣлится на 2, то и первая должна быть числомъ простымъ съ 2. Откуда слѣдуетъ, что π число нечетное, а потому сравненіе $x^\omega - (-1)^\pi \equiv 0$ (*мод. p*), которымъ опредѣляются рѣшенія сравненія $x^m + 1 \equiv 0$ (*мод. p*), приведется къ такому

$$x^\omega + 1 \equiv 0 \text{ (мод. } p\text{)}.$$

Такъ убѣждаемся мы въ справедливости предложенной нами теоремы.

На основаніи этой теоремы, мы заключаемъ, что сравненіе

$$x^4 + 1 \equiv 0 \text{ (мод. } 13\text{)}$$

не имѣетъ рѣшенія: ибо общій наибольшій дѣлитель 4 и 13—1 есть 4, а частное отъ дѣленія 13—1 на 4 есть 3, число нечетное. Напротивъ, сравненіе

Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

www.rcin.org.pl

$$x^9 + 1 \equiv 0 \ (\textit{мод.}\ 13)$$

имѣетъ три рѣшенія: ибо общій наибольшій дѣлитель 9 и 13—1 есть 3, а 3, дѣля 13—1, даетъ въ частномъ число четное 4, и рѣшенія этого сравненія найдутся изъ сравненія

$$x^3 + 1 \equiv 0 \ (\textit{мод.}\ 13).$$

§ 33. До сихъ поръ мы говорили о сравненіи $x^m - A \equiv 0$ (*мод.* p), предполагая p числомъ простымъ. Обращаемся теперь къ тѣмъ случаямъ, когда здѣсь p число составное. Мы предположимъ p числомъ простымъ относительно m и A и докажемъ, что въ этомъ случаѣ, если можно удовлетворить сравненію $x^m - A \equiv 0$, принимая за модуль его какое либо изъ простыхъ чиселъ, входящихъ въ составъ p, то ему можно удовлетворить и при модулѣ p.

Мы начнемъ съ частнаго случая, предположивъ, что $p = \alpha^m$, гдѣ α какое нибудь простое цѣлое, недѣлящее m и A, и покажемъ, какимъ образомъ изъ рѣшенія сравненія $x^m - A \equiv 0$ (*мод.* α) могутъ быть выведены рѣшенія сравненій:

$$x^m - A \equiv 0 \ (\textit{мод.}\ \alpha^2),\ x^m - A \equiv 0 \ (\textit{мод.}\ \alpha^3),\ \text{и т. д.}$$

Пусть будетъ a число, удовлетворяющее сравненію

$$x^m - A \equiv 0 \ (\textit{мод.}\ \alpha);$$

число a не будетъ дѣлиться на α, ибо A, по положенію, не дѣлится на α. Для опредѣленія числа, удовлетворяющаго сравненію $x^m - A \equiv 0$ (*мод.* α^2), положимъ $x = a + \alpha z$ и будемъ искать z подъ условіемъ $(a + \alpha z)^m - A \equiv 0$ (*мод.* α^2), которое приводится къ слѣдующему:

$$a^m - A + ma^{m-1}\alpha z + \frac{m(m-1)}{1 \cdot 2} a^{m-2}\alpha^2 z^2 + \ldots + \alpha^m z^m \equiv 0 \ (\textit{мод.}\ \alpha^2).$$

Но здѣсь α есть общій множитель членовъ сравненія и модуля, ибо a, будучи числомъ, удовлетворяющимъ сравненію $x^m - A \equiv 0$ (*мод.* α), въ разности $a^m - A$ даетъ число кратное α; во всѣхъ же прочихъ членахъ сравненія и въ модулѣ число α входитъ множителемъ. Сокращая его, находимъ

www.rcin.org.pl

$$\frac{a^m-A}{\alpha}+ma^{m-1}z+\frac{m(m-1)}{1.2}a^{m-2}\alpha z^2+\ldots\ldots+\alpha^{m-1}z^m\equiv 0 \ (\textit{мод. } \alpha).$$

Но такъ какъ

$$\frac{m(m-1)}{1.2}a^{m-1}\alpha z^2+\ldots\ldots\ldots+\alpha^{m-1}z^m\equiv 0 \ (\textit{мод. } \alpha),$$

то предыдущее сравненіе приведется къ такому

$$\frac{a^m-A}{\alpha}+ma^{m-1}z\equiv 0 \ (\textit{мод. } \alpha).$$

Это сравненіе, будучи первой степени относительно неизвѣстнаго z, легко рѣшается. Притомъ не трудно убѣдиться, что оно всегда имѣетъ рѣшеніе: въ немъ коеффиціентъ при z, будучи составленъ изъ произведенія чиселъ m и a простыхъ съ α, будетъ число простое съ модулемъ α; въ этомъ же случаѣ, сравненіе первой степени всегда имѣетъ рѣшеніе.

Итакъ, рѣшеніемъ сравненія

$$\frac{a^m-A}{\alpha}+ma^{m-1}z\equiv 0 \ (\textit{мод. } \alpha)$$

найдется число z, по которому число, удовлетворяющее сравненію $x^m-A\equiv 0 \ (\textit{мод. } \alpha^2)$, выразится такъ: $x=a+\alpha z$. Покажемъ теперь, какимъ образомъ по числу b, удовлетворяющему сравненію $x^m-A\equiv 0 \ (\textit{мод. } \alpha^2)$, найдется число x, для котораго $x^m-A\equiv 0 \ (\textit{мод. } \alpha^3)$.

Для этого, полагая въ этомъ сравненіи $x=b+\alpha^2u$, выводимъ

$$(b+\alpha^2u)^m-A\equiv 0 \ (\textit{мод. } \alpha^3).$$

Разлагая же $(b+\alpha^2u)^m$ по биному Ньютона, сокращая всѣ члены сравненія и модуль на α^2 и опуская члены кратные α, какъ дѣлали выше, найдемъ, для опредѣленія u, сравненіе

$$\frac{b^m-A}{\alpha^2}+mb^{m-1}u\equiv 0 \ (\textit{мод. } \alpha).$$

Отсюда опредѣлится u. Зная же u, мы опредѣлимъ число, удовлетворяющее сравненію $x^m-A\equiv 0 \ (\textit{мод. } \alpha^3)$, изъ уравненія $x=b+\alpha^2u$.

Поступая такимъ образомъ, мы будемъ находить рѣшенія сравненій $x^m-A\equiv 0$ при модуляхъ α^4, α^5, и т. д.

GABINET MATEMATYCZNY Towarzystwa Naukowego Warszaw

www.rcin.org.pl

Для примѣра, найдемъ рѣшеніе сравненія $x^5 - 2 \equiv 0$ (*мод.* 3^2). Сначала рѣшаемъ сравненіе $x^5 - 2 \equiv 0$ (*мод.* 3), которое, по теоремѣ 38-й, приводится къ слѣдующему

$$x - 2^{\pi} \equiv 0 \text{ (мод. 3)},$$

гдѣ π опредѣляется условіемъ: $5\pi \equiv 1$ (*мод.* 2).

Замѣчая, что этому условію удовлетворяетъ $\pi = 1$, мы для рѣшенія сравненія $x^5 - 2 \equiv 0$ (*мод.* 3) находимъ $x - 2 \equiv 0$ (*мод.* 3).

Откуда заключаемъ, что 2 есть число, ему удовлетворяющее, и для рѣшенія сравненія $x^5 - 2 \equiv 0$ (*мод.* 3^2) полагаемъ: $x = 2 + 3z$, гдѣ z опредѣляется условіемъ

$$\frac{2^5 - 2}{3} + 5 \cdot 2^{5-1} z \equiv 0 \text{ (мод. 3)},$$

или

$$10 + 80z \equiv 0 \text{ (мод. 3)},$$

которое, по сокращеніи на 10, приводится съ слѣдующему

$$8z \equiv -1 \text{ (мод. 3)}.$$

Между числами, удовлетворяющими этому сравненію, находимъ 1; принимая ее за z, мы находимъ; что $2 + 3z$ равно 5, и это будетъ число, удовлетворяющее сравненію

$$x^5 - 2 \equiv 0 \text{ (мод. } 3^2).$$

Обращаемся теперь къ сравненію $x^m - A \equiv 0$ (*мод.* p), гдѣ p какое нибудь число простое съ m и A, и докажемъ, что если p состоитъ изъ произведенія простыхъ чиселъ $\alpha, \beta, \gamma \ldots\ldots$, для которыхъ сравненія

$$x^m - A \equiv 0 \text{ (мод. } \alpha), \; x^m - A \equiv 0 \text{ (мод. } \beta), \; x^m - A \equiv 0 \text{ (мод. } \gamma) \ldots$$

имѣютъ рѣшенія; то можно найти рѣшеніе сравненія

$$z^m - A \equiv 0 \text{ (мод. } p).$$

Пусть будетъ $p = \alpha^{\lambda} \beta^{\mu} \gamma^{\nu} \ldots\ldots$ По пріему, показанному нами, мы найдемъ числа, удовлетворящія сравненіямъ

$$x^m - A \equiv 0 \text{ (мод. } \alpha^{\lambda}), \; x^m - A \equiv 0 \text{ (мод. } \beta^{\mu}), \; x^m - A \equiv 0 \text{ (мод. } \gamma^{\nu}) \ldots$$

www.rcin.org.pl

Пусть эти числа будутъ M, N, P, ...; по теоремѣ 13 й, всѣ числа, опредѣляемыя сравненіемъ $x \equiv M \ (мод.\ \alpha^{\lambda})$, будутъ удовлетворять сравненію

$$x^m - A \equiv 0 \ (мод.\ \sigma^{\lambda});$$

числа, опредѣляемыя сравненіемъ $x \equiv N \ (мод.\ \beta^{\mu})$, будутъ удолетворять сравненію

$$x^m - A \equiv 0 \ (мод.\ \alpha^{\lambda});$$

и т. д. Но въ § 30 видѣли, какимъ образомъ можно найти число, удовлетворяющее всѣмъ сравненіямъ

$$x \equiv M \ (мод.\ \alpha^{\lambda}),\ x \equiv N \ (мод.\ \beta^{\mu}),\ x \equiv P \ (мод.\ \gamma^{\nu}) \ldots,$$

и слѣд, всѣмъ сравненіямъ

$$x^m - A \equiv 0 \ (мод.\ \alpha^{\lambda}),\ x^m - A \equiv 0 \ (мод.\ \beta^{\mu}),\ x^m - A \equiv 0 \ (мод.\ \gamma^{\nu}) \ldots$$

А такъ какъ α, β, γ.... различныя простыя числа, то модули этихъ сравненій α^{λ}, β^{μ}, γ^{ν},..... суть числа относительно другъ друга простыя; а въ этомъ случаѣ эти сравненія, по § 9, предполагаютъ

$$x^m - A \equiv 0 \ (мод.\ \alpha^{\lambda}\beta^{\mu}\gamma^{\nu} \ldots.).$$

Такъ, мы найдемъ число, удовлетворяющее сравненію

$$x^m - A \equiv 0 \ (мод.\ \alpha^{\lambda}\beta^{\mu}\gamma^{\nu} \ldots..),$$

опредѣливши число, которое удовлетворяетъ сравненіямъ

$$x \equiv M \ (мод.\ \alpha^{\lambda}),\ x \equiv N \ (мод.\ \gamma^{\mu}),\ x \equiv P \ (мод.\ \beta^{\nu}) \ldots\ldots,$$

гдѣ M, N, P..... числа, опредѣляемыя условіями

$$M^m - A \equiv 0 \ (мод.\ \alpha^{\lambda});$$

$$N^m - A \equiv 0 \ (мод.\ \beta^{\mu});$$

$$P^m - A \equiv 0 \ (мод.\ \gamma^{\nu});$$

.....

www.rcin.org.pl

ГЛАВА V.

О сравненіяхъ вида $a^x \equiv A \ (мод.\ p)$.

§ 34. До сихъ поръ мы занимались изслѣдованіемъ такихъ сравненій, которыя заключаютъ въ себѣ алгебраическую цѣлую функцію неизвѣстнаго и разсмотрѣли замѣчательнѣйшія изъ этихъ сравненій: сравненія первыхъ двухъ степеней и сравненія двучленныя. Теперь переходимъ къ сравненіямъ, которыя содержатъ неизвѣстное показателемъ. Изъ этихъ сравненій самое замѣчательное есть $a^x \equiv A \ (мод.\ p)$, гдѣ p число простое, недѣлящее a и A. Этимъ сравненіемъ мы теперь и займемся. Относительно его легко доказать слѣдующую теорему:

40. **Теорема.** *Если число α удовлетворяетъ сравненію $a^x \equiv A$, $(мод.\ p)$, то ему удовлетворяетъ и всякое число, сравнимое съ α по модулю $p-1$.*

Доказательство. Если z сравнимо съ α по модулю $p-1$, то $z-\alpha$ дѣлится на $p-1$. Называя ς частное отъ дѣленія $z-\alpha$ на $p-1$, найдемъ $z-\alpha=(p-1)\varsigma$; откуда слѣдуетъ

$$a^{z-\alpha} \equiv a^{(p-1)\varsigma}.$$

Но, по теоремѣ Фермата, a^{p-1} и, слѣд. $a^{(p-1)\varsigma}$ сравнимо съ 1 по модулю p; поэтому

$$a^{z-\alpha} \equiv 1 \ (мод.\ p).$$

Имѣя же, по положенію, $a^\alpha \equiv A \ (мод.\ p)$, мы, перемноживъ это сравненіе съ предыдущимъ, находимъ

$$a^z \equiv A \ (мод.\ p),$$

что и слѣдовало доказать.

Изъ доказанной нами теоремы видно, что, если сравненію $a^x \equiv A \ (мод.\ p)$ удовлетворяетъ одно число, то ему удовлетво-

www.rcin.org.pl

ряетъ безконечное множество другихъ, сравнимыхъ съ первымъ по модулю $p-1$. Но всѣ эти числа, сравнимыя между собою по модулю $p-1$, мы принимаемъ за одно рѣшеніе сравненія $a^x \equiv A$ (*мод. p*). Въ этомъ значеніи сравненіе $a^x \equiv A$ (*мод. p*) будетъ имѣть столько рѣшеній, сколько положительныхъ чиселъ меньшихъ $p-1$ и, слѣд., несравнимыхъ между собою по модулю $p-1$ ему удовлетворяетъ *). Эти рѣшенія представятся такъ

$$x \equiv \alpha_1,\ x \equiv \alpha_2,\ \ldots,\ x \equiv \alpha_n \ (\text{мод. } p-1),$$

гдѣ $\alpha_1, \alpha_2, \ldots\ldots, \alpha_n$ суть положительныя числа, меньшія $p-1$ и удовлетворяющія сравненію

$$a^x \equiv A \ (\text{мод. } p).$$

Показавши, какъ считаются рѣшенія сравненія $a^x \equiv A$ (*мод. p*), мы приступимъ къ опредѣленію числа ихъ и начнемъ съ частнаго случая $A=1$.

Относительно сравненія $a^\alpha \equiv 1$ (*мод. p*) легко доказать слѣдующія теоремы:

41. **Теорема**. *Если сравненію* $a^x \equiv 1$ (*мод. p*) *удовлетворяетъ* $x=\alpha$, *то ему удовлетворяетъ всякое число кратное* α.

Доказательство. Въ самомъ дѣлѣ, если сравненію $a^x \equiv 1$ (*мод. p*) удовлетворяетъ $x=\alpha$, то $a^\alpha \equiv 1$ (*мод. p*). Это же сравненіе, по возведеніи въ какую нибудь степень n, будетъ $a^{n\alpha} \equiv 1$ (*мод. p*); откуда слѣдуетъ, что $n\alpha$ удовлетворяетъ сравненію $a^x \equiv 1$ (*мод. p*).

42 **Теорема**. *Если сравненію* $a^x \equiv 1$ (*мод. p*) *удовлетворяетъ число* α, *то ему удовлетворяетъ и общій наибольшій дѣлитель чиселъ* α *и* $p-1$.

Доказательство. Эту теорему легко вывести изъ теоремы

*) До этого мы доходимъ, повторяя о рѣшеніяхъ сравненія $a^\alpha \equiv A$ (*мод. p*) тѣже сужденія, которыя дѣлали въ § 12 при опредѣленіи числа рѣшеній сравненія $fx \equiv 0$ (*мод. p*).

www.rcin.org.pl

35-й, доказанной нами для двучленнаго сравненія $x^m - 1 \equiv 0$ (*мод. p*), по которой число a, удовлетворяющее этому сравненію, должно также удовлетворять сравненію $x^\omega - 1 \equiv 0$ (*мод. p*), гдѣ ω общій наибольшій дѣлитель m и $p-1$ и, слѣд., сравненіе $a^m \equiv 1$ (*мод. p*) предполагаетъ сравненіе $a^\omega \equiv 1$ (*мод. p*), въ чемъ и заключается предложенная нами теорема.

43. **Теорема.** *Наименьшее число, за исключеніемъ* 0, *удовлетворяющее сравненію* $a^x \equiv 1$ (*мод. p*), *есть дѣлитель* $p-1$; *прочія же числа, ему удовлетворяющія, суть кратныя этого дѣлителя.*

Доказательство. Пусть будетъ α наименьшее число, удовлетворяющее сравненію $a^x \equiv 1$ (*мод. p*); по предыдущей теоремѣ, сравненію $a^x \equiv 1$ (*мод. p*) будетъ удовлетворять общій наибольшій дѣлитель чиселъ α и $p-1$. Но этотъ дѣлитель чиселъ $p-1$ и α, удовлетворяя сравненію $a^x \equiv 1$ (*мод. p*), долженъ быть равенъ α; ибо, въ противномъ случаѣ, онъ бы былъ меньше α, между тѣмъ какъ, по положенію, α есть наименьшее число, удовлетворяющее сравненію $a^x \equiv 1$ (*мод. p*). Итакъ, α должно быть дѣлителемъ числа $p-1$.

Теперь докажемъ, что всѣ числа, удовлетворяющія сравненію $a^x \equiv 1$ (*мод. p*), суть кратныя α. Для этого мы замѣчаемъ, что, по предыдущей теоремѣ, сравненіе $a^x \equiv 1$ (*мод. p*) предполагаетъ $a^\omega \equiv 1$ (*мод. p*), гдѣ ω общій наибольшій дѣлитель чиселъ x и $p-1$. Это же сравненіе вмѣстѣ съ $a^\alpha \equiv 1$ (*мод. p*) предполагаетъ (см. теор. 34) $a^{\omega'} \equiv 1$ (*мод. p*), гдѣ ω' общій наибольшій дѣлитель α и ω. Но ω' должно быть равно α; иначе ω', будучи общимъ наибольшимъ дѣлителемъ α и ω, было бы меньше α, и такъ какъ ω' удовлетворяетъ сравненію $a^x \equiv 1$ (*мод. p*), то мы бы нашли въ ω' число меньше α, которое удовлетворяетъ сравненію $a^x \equiv 1$ (*мод. p*), что противно положенію. Итакъ, ω' равно α. Но мы видѣли, что ω' есть общій наибольшій дѣлитель x и $p-1$; слѣд. α, равное ω', дѣлитъ x, что и слѣдовало доказать.

Такъ, замѣчая, что наименьшее число (послѣ 0), удовлетво-

www.rcin.org.pl

ряющее сравненію $2^x \equiv 1$ (*мод.* 31), есть 5, мы заключаемъ, что только числа кратныя 5 будутъ удовлетворять этому сравненію.

По доказанной нами теоремѣ, мы заключаемъ, что наименьшее число, удовлетворяющее сравненію $a^x \equiv 1$ (*мод.* p), есть одинъ изъ дѣлителей $p-1$ [изъ этого числа не исключается само $p-1$, которое, по теоремѣ Фермата, удовлетворяетъ сравненію $a^{p-1} \equiv 1$ (*мод.* p)], и если это число есть α, то всѣ числа, удовлетворяющія этому сравненію, начиная отъ 0, представятся такимъ рядомъ 0, α, 2α,....., откуда видно, что

$$0,\ \alpha,\ 2\alpha,\ \ldots\ldots,\ \alpha\left(\frac{p-1}{\alpha}-1\right)$$

суть единственныя числа, удовлетворяющія сравненію $a^x \equiv 1$ (*мод.* p) и меньшія $p-1$; слѣд., рѣшенія сравненія $a^x \equiv 1$ (*мод.* p) суть

$$x \equiv 0,\ x \equiv \alpha,\ x \equiv 2\alpha,\ \ldots\ldots,\ x \equiv \alpha\left(\frac{p-1}{\alpha}-1\right) \text{ (мод. } p-1),$$

и число ихъ есть $\frac{p-1}{\alpha}$.

Такъ, замѣчая, что наименьшее число, удовлетворяющее сравненію $2^x \equiv 1$ (*мод.* 31), есть 5, мы заключаемъ, что это сравненіе имѣетъ $\frac{31-1}{5}=6$ рѣшеній, которыя суть

$$x \equiv 0,\ x \equiv 5,\ x \equiv 2.5,\ x \equiv 3.5,\ x \equiv 4.5,\ x \equiv 5.5 \text{ (мод. 30)}.$$

Мы нашли, что число рѣшеній сравненія $a^x \equiv 1$ (*мод.* p) опредѣляется отношеніемъ $p-1$ къ α, гдѣ α наименьшее число, удовлетворяющее этому сравненію. Отсюда слѣдуетъ, что это сравненіе имѣетъ одно только рѣшеніе, если наименьшее число, удовлетворяющее этому сравненію, есть $p-1$.

§ 35. Переходимъ, теперь въ сравненіямъ $a^x \equiv A$ (*мод.* p), гдѣ A какое нибудь число, недѣлящееся на p, и докажемъ слѣдующую теорему.

44. **Теорема**. *Если сравненію* $a^x \equiv A$ (*мод.* p) *удовлетво-*

www.rcin.org.pl

ряетъ λ, *а наименьшее число, удовлетворяющее сравненію* $a^x \equiv 1$ (*мод.* p), *есть* α, *то первое имѣетъ* $\frac{p-1}{\alpha}$ *рѣшеній, которыя суть*

$$x \equiv \lambda,\ x \equiv \lambda+\alpha,\ x \equiv \lambda+2\alpha,\ \ldots,\ x \equiv \lambda+\left(\frac{p-1}{\alpha}-1\right)\alpha \ (\text{мод. } p-1).$$

Доказательство. Если λ и α удовлетворяютъ сравненіямъ

$$a^x \equiv A,\ x^x \equiv 1 \ (\text{мод. } p),\ \text{то}\ a^\lambda \equiv A,\ a^\alpha \equiv 1 \ (\text{мод. } p).$$

Возведя обѣ части послѣдняго сравненія въ какую нибудь степень n и перемноживъ его почленно съ $a^\lambda \equiv A$ (*мод.* p), находимъ

$$a^{\lambda+n\alpha} \equiv A \ (\text{мод. } p).$$

Откуда ясно, что $\lambda+n\alpha$ удовлетворяетъ сравненію $a^x \equiv A$ (*мод.* p), какое бы ни было цѣлое число n.

Не трудно также убѣдиться, что, кромѣ чиселъ вида $\lambda+\alpha n$, нѣтъ другихъ способныхъ удовлетворить сравненію $a^x \equiv A$ (*мод.* p).

Въ самомъ дѣлѣ, если $a^x \equiv A$ (*мод.* p), то $a^x \equiv a^\lambda$ (*мод.* p); ибо, по положенію, λ удовлетворяетъ сравненію $a^\lambda \equiv A$ (*мод.* p). Но, сокращая сравненіе $a^x \equiv a^\lambda$ (*мод.* p) на a^λ, находимъ $a^\lambda \equiv 1$ (*мод.* p), что, по 43-й теоремѣ, предполагаетъ дѣлимость $x-\lambda$ на α равнымъ n, находимъ $x-\lambda=\alpha n$ и слѣд. $x=\lambda+\alpha n$.

Итакъ, числа, удовлетворяющія сравненію $a^x \equiv A$ (*мод.* p), опредѣляются формулою $x=\lambda+\alpha n$, гдѣ n какое нибудь число. Но эта формула при значеніяхъ n, сравнимыхъ по модулю $\frac{p-1}{\alpha}$, даетъ числа сравнимыя между собою по модулю $p-1$, и обратно, при двухъ значеніяхъ n, несравнимыхъ по модулю $\frac{p-1}{\alpha}$, значенія $\lambda+\alpha n$ будутъ также несравнимы. Въ этомъ мы убѣждаемся, замѣтивъ, что сравненіе $\lambda+\alpha n \equiv \lambda+\alpha n'$ (*мод.* $p-1$), по уничтоженіи λ и сокращеніи α въ обѣихъ частяхъ сравненія и модулѣ, приводится къ слѣдующему

www.rcin.org.pl

$$n \equiv n' \left(\text{мод.} \frac{p-1}{\alpha}\right)$$

Но по модулю $\frac{p-1}{\alpha}$ всѣ числа сравнимы съ однимъ изъ слѣдующихъ

$$0,\ 1,\ 2,\ \ldots,\ \frac{p-1}{\alpha} - 1,$$

которыя несравнимы между собою; слѣд. всѣ числа, опредѣляемыя формулю $x = \lambda + \alpha n$, будутъ сравнимы по модулю $p-1$ съ однимъ изъ чиселъ

$$\lambda,\ \lambda+\alpha,\ \lambda+2\alpha,\ \ldots\ldots,\ \lambda+\alpha\left(\frac{p-1}{\alpha}-1\right);$$

сами же они другъ съ другомъ будутъ несравнимы. А потому всѣ числа вида $\lambda + \alpha n$, или, что одно и тоже, удовлетворяющія сравненію $a^x \equiv A$ (*мод.* p), опредѣлятся сравненіями

$$x \equiv \lambda,\ x \equiv \lambda+\alpha,\ x \equiv \lambda+2\alpha,\ \ldots,\ x \equiv \lambda+\alpha\left(\frac{p-1}{\alpha}-1\right) (\text{мод. } p-1),$$

и эти сравненія всѣ различны между собою; откуда и слѣдуетъ предложенная нами теорема.

Такъ, замѣчая, что сравненію $2^x \equiv 13$ (*мод.* 17) удовлетворяетъ $x = 6$, наименьшее же число, удовлетворяющее сравненію $2^x \equiv 1$ (*мод.* 17), есть 8, мы заключаемъ, что сравненіе $2^x \equiv 13$ (*мод.* 17) имѣетъ $\frac{17-1}{8}$, или 2 рѣшенія, которыя суть

$$x \equiv 6,\ x \equiv 6+8 \text{ (мод. 16)}.$$

§ 36. На основаніи доказанной нами теоремы, число рѣшеній сравненія $a^x \equiv A$ (*мод.* p), въ случаѣ его возможности, опредѣляется числомъ рѣшеній сравненія $a^x \equiv 1$ (*мод.* p). Теперь мы разсмотримъ особенно тотъ случай, когда сравненіе $a^x \equiv 1$ (*мод.* p) имѣетъ одно рѣшеніе, и слѣд. наименьшее число, удовлетворяющее сравненію $a^x \equiv 1$ (*мод.* p), есть $p-1$. Въ этомъ случаѣ, число a получаетъ названіе первообразнаго корня числа p и $a^x \equiv A$ (*мод.* p) особенно замѣчательно по своимъ приложеніямъ. Этимъ сравненіемъ мы теперь и займемся. Относительно его мы докажемъ слѣдующую теорему:

www.rcin.org.pl

45. **Теорема**. *Если a есть первообразный корень числа p, и A не дѣлится на p, то сравненіе $a^x \equiv A$ (мод. p) имѣетъ одно рѣшеніе.*

Доказательство. Въ самомъ дѣлѣ, по свойству первообразнаго корня a, наименьшее число, удовлетворяющее сравненію $a^x \equiv 1$ (мод. p), есть $p-1$. Но, въ этомъ случаѣ, по предыдущей теоремѣ, сравненіе $a^x \equiv A$ (мод. p) или имѣетъ одно рѣшеніе, или не имѣетъ ни одного. Докажемъ же, что послѣднее не можетъ имѣть мѣста при A недѣлящемся на p. Для этаго допустивъ, что сравненіе $a^x \equiv A$ (мод. p) не имѣетъ рѣшенія, мы замѣчаемъ, что A, не будучи кратнымъ p, при дѣленіи на p даетъ въ остаткѣ одно изъ чиселъ

$$1, 2, \ldots\ldots, p-1,$$

и слѣд. съ однимъ изъ этихъ чиселъ будетъ сравнимо по модулю p. Пусть это число будетъ r. Имѣя $A \equiv r$ (мод. p), мы изъ сравненія $a^x \equiv A$ (мод. p) выведемъ $a^x \equiv r$ (мод. p), которое не будетъ имѣть рѣшенія: ибо, по положенію, не имѣетъ его сравненіе $a^x \equiv A$ (мод. p). Но такъ какъ a число простое съ p, то a^0, a^1, a^2, ..., a^{p-2} не дѣлятся на p, и слѣд. каждое изъ нихъ по модулю p сравнимо съ однимъ изъ чиселъ

$$1, 2, 3, \ldots, p-1.$$

Откуда слѣдуетъ, что всѣ $p-1$ чиселъ 0, 1, 2, ..., $p-2$ удовлетворяютъ какому либо изъ $p-1$ сравненій

$$a^x \equiv 1,\ a^x \equiv 2,\ a^x \equiv 3, \ldots\ldots,\ a^x \equiv p-1 \text{ (мод. } p).$$

Но такъ какъ одно изъ нихъ есть $a^x \equiv r$ (мод. p), которое не имѣетъ рѣшенія, то всѣ $p-1$ чиселъ 0, 1, 2, ..., $p-2$ должны удовлетворять остальнымъ $p-2$ сравненіямъ, и слѣд. по крайней мѣрѣ одному изъ нихъ удовлетворяютъ два числа изъ ряда 0, 1, 2, ..., $p-2$, что невозможно: ибо это предполагаетъ въ этомъ сравненіи два рѣшенія. Итакъ, нельзя допустить, чтобы сравненіе $a^x \equiv A$ (мод. p) при A, недѣлящемся на p, не имѣло рѣшенія, а это и слѣдовало доказать.

На основаніи этой теоремы мы заключаемъ, что если a есть

www.rcin.org.pl

первообразный корень числа p, то для всякаго числа A, недѣлящагося на p, сравненіе $a^x \equiv A \pmod{p}$ будетъ имѣть одно рѣшеніе, и слѣд. будетъ удовлетворяться однимъ числомъ меньшимъ $p-1$ и не меньшимъ нуля. Такое число называютъ *указателемъ* числа A; первообразный же корень a получаетъ въ этомъ случаѣ названіе *основанія указателей*. Итакъ, число x будетъ указателемъ числа A, по основанію a, если x, будучи меньше $p-1$ и не меньше 0, удовлетворяетъ сравненію $a^x \equiv A \pmod{p}$, и въ этомъ случаѣ мы будемъ писать такъ

$$x = Ind.\ A.$$

По сказанному нами мы найдемъ $Ind.\ A$, рѣшая сравненіе $a^x \equiv A \pmod{p}$ и выбирая между числами, удовлетворяющими ему то, которое меньше $p-1$ и не меньше нуля. Такъ, при однихъ и тѣхъ же модулѣ p и основаніи a мы найдемъ одну величину для указателя какого либо числа A, недѣлящагося на p. Обратно зная, что $Ind.\ A = x$, мы для опредѣленія числа A будемъ имѣть сравненіе $a^x \equiv A \pmod{p}$. Но этимъ не опредѣляется вполнѣ число A; этому сравненію удовлетворяютъ всѣ числа, сравнимыя съ A по модулю p, и слѣд. всѣ они имѣютъ одинъ и тотъ же указатель. Итакъ, зная указатель A, мы будемъ знать только число, съ которымъ A сравнимо по модулю p. Это число опредѣляется сравненіемъ $A \equiv a^x \pmod{p}$, при $x = Ind\ A$. Поясникъ это примѣромъ. Пусть будетъ $p=7$. Такъ какъ сравненію $3^x \equiv 1 \pmod{7}$ не удовлетворяютъ числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, то 3 есть первообразный корень числа 7. Примемъ же его за основаніе и найдемъ указателей 1, 2, 3, 4, 5, которые будутъ также указателями всѣхъ чиселъ, сравнимыхъ съ 1, 2, 3, 4, 5, 6, по модулю 7.

Чтобы найти указателя 1, мы должны рѣшить сравненіе $3^x \equiv 1 \pmod{7}$. Но ему, очевидно, удовлетворяютъ 0; слѣд.,

$$Ind.\ 1 = 0.$$

Не трудно убѣдиться, что и всегда указатель 1 есть 0: ибо сравненію $a^x \equiv 1 \pmod{p}$ всегда удовлетворяетъ $x=0$.

Чтобы найти указателей 2, 3, 4, 5, 6, мы должны рѣшить сравненія $3^x \equiv 2$, $3^x \equiv 3$, $3^x \equiv 4$, $3^x \equiv 5$, $3^x \equiv 6 \pmod{7}$, и ме-

www.rcin.org.pl

жду числами, ему удовлетворяющими, найти тѣ, которыя меньше 7—1 и не меньше 0; а это приводится къ тому, чтобы найти, которое изъ чиселъ 3^1, 3^2, 3^3, 3^4, 3^5 сравнимо съ 2, 3, 4, 5, 6 по модулю 7. Но такъ какъ эти числа равны

$$3,\ 9,\ 27,\ 81,\ 243,$$

и остатки отъ дѣленія ихъ на 7 суть

$$3,\ 2,\ 6,\ 4,\ 5;$$

то мы заключаемъ, что

$$3^1 \equiv 3,\ 3^2 \equiv 2,\ 3^3 \equiv 6,\ 3^4 \equiv 4,\ 3^5 \equiv 5 \ (\textit{мод. } 7).$$

Слѣд.

$$\textit{Ind. } 3=1,\ \textit{Ind. } 2=2,\ \textit{Ind. } 6=3,\ \textit{Ind. } 4=4,\ \textit{Ind. } 5=5.$$

Отсюда для опредѣленія указателей чиселъ 1, 2, 3, 4, 5, 6, по модулю 7, и основанію 3, выходитъ такая таблица

$$\textit{Ind. } 1=0,\ \textit{Ind. } 3=1,\ \textit{Ind. } 5=5,$$
$$\textit{Ind. } 2=2,\ \textit{Ind. } 4=4,\ \textit{Ind. } 6=3.$$

По этой таблицѣ мы находимъ указателей всякаго числа A, простаго съ 7, замѣчая, что такое число будетъ сравнимо по модулю 7 съ однимъ изъ чиселъ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и, слѣд., съ этимъ числомъ имѣетъ одного указателя. Такъ, для опредѣленія указателей 20 и —18, мы находимъ, что по модулю 7 эти числа сравнимы съ 6 и 3. Откуда слѣдуетъ

$$\textit{Ind. } 20=\textit{Ind. } 6=3,\ \textit{Ind.} -18=\textit{Ind. } 3=1.$$

Для опредѣленія чиселъ по данному указателю мы предыдущую таблицу расположимъ такъ:

$$0=\textit{Ind. } 1,\ 2=\textit{Ind. } 2,\ 4=\textit{Ind. } 4,$$
$$1=\textit{Ind. } 3,\ 3=\textit{Ind. } 6,\ 5=\textit{Ind. } 5.$$

По этой таблицѣ мы найдемъ, какое изъ чиселъ 1, 2, 3, 4, 5 имѣетъ данный указатель. Такъ найдемъ, что указатель 3 принадлежитъ числу 6. Откуда заключаемъ, что всѣ числа, имѣющія указателемъ 3, по модулю 7 и основанію 3, сравнимы съ 6 по модулю 7.

Изъ сказаннаго нами видно, что составленіе таблицъ указателей не представляетъ никакихъ затрудненій, когда найдены

www.rcin.org.pl

первообразные корни. Но какъ найти ихъ — мы покажемъ впослѣдствіи. Теперь же мы займемся изложеніемъ свойствъ указателей, на основаніи которыхъ таблицы ихъ могутъ быть употребляемы съ чрезвычайною выгодою при рѣшеніи многихъ вопросовъ Теоріи чиселъ. Въ концѣ этой книги помѣщены таблицы указателей для модулей меньшихъ 200. Онѣ заимствованы нами изъ лекцій Алгебрическаго и Трансцендентнаго Анализа Г-на Академика Остроградскаго. Таблицы подъ буквою *I* служатъ для опредѣленія указателей по данному числу; таблицы же подъ буквою *N* по данному указателю служатъ для опредѣленія чиселъ. Въ тѣхъ и другихъ таблицахъ данное (будетъ ли это указатель или число) разбивается на десятки и единицы; единицы находятся въ верхней строкѣ, десятки въ крайней лѣвой; искомое же находится на одной вертикальной съ единицами и на одной горизонтальной съ десятками.

Такъ, чтобы найти указателя 167 по модулю 193, мы въ таблицѣ подъ буквою *I* для модуля 193 ищемъ въ верхней строкѣ 7, а въ крайней слѣва 16; число же на одной горизонтальной съ 16 и на одной вертикальной съ 7 есть 101; это и есть искомый указатель 167. Обратно, желая опредѣлить при томъ же модулѣ и основаніи, какія числа имѣютъ указателемъ 101, мы въ таблицѣ подъ буквою *N* въ верхней строкѣ ищемъ 1, въ крайней 10; соотвѣтствующее имъ число въ таблицѣ 167. Откуда заключаемъ, что числа, имѣющія указателемъ 101, сравнимы съ 167 по модулю 193.

§ 37. Займемся теперь изслѣдованіемъ свойствъ указателей, на которыхъ основывается употребленіе ихъ таблицъ.

46. **Теорема.** *При модулѣ p указатель произведенія нѣсколькихъ чиселъ сравнимъ съ суммою ихъ указателей по модулю p—1.*

Доказательство. Пусть будетъ A, B, C,.... данныя числа и i, i', i'',.... ихъ указатели по модулю p и основанію a; по свойству указателей будетъ $a^i \equiv A$, $a^{i'} \equiv B$, $a^{i''} \equiv C$,..... (*мод. p*) Перемножая эти сравненія между собою, найдемъ

*

www.rcin.org.pl

$$a^{i+i'+i''+\ldots.} \equiv ABC..... \ (\textit{мод. } p).$$

Но если I есть указатель $ABC....$, то $a^I \equiv ABC..... \ (\textit{мод. } p)$

Изъ этого же сравненія и предыдущаго выходитъ $a^{i+i'+i''+\ldots.} \equiv a^I$ (*мод. p*), что, по сокращеніи на a^I, даетъ

$$a^{i+i'+i''+\ldots.-I} \equiv 1 \ (\textit{мод } p).$$

Итакъ, число $i+i'+i''+\ldots.-I$ удовлетворяетъ сравненію $a^x \equiv 1$ (*мод. p*), а это, по теоремѣ 43-й, предполагаетъ, что это число есть кратное наименьшаго числа, удовлетворяющаго сравненію $a^x \equiv 1$ (*мод. p*), которое, по свойству первообразныхъ корней, есть $p-1$. Слѣд., разность $i+i'+i''+\ldots.-I$ дѣлится на $p-1$, а это выражается сравненіемъ

$$I \equiv i+i'+i''+..... \ (\textit{мод. } p-1),$$

что и слѣдовало доказать.

Такъ, по модулю 199 и основанію 127, находимъ *Ind.* $2 \equiv 194$, *Ind.* $5 \equiv 6$, *Ind.* $19 \equiv 11$, слѣдовательно *Ind.* $2.5.19 \equiv 194+6+11$ (*мод.* 198), или *Ind.* $190 \equiv 211$ (*мод.* 198).

Замѣчая, что число меньшее 198 и сравнимое съ 211 по модулю 198 есть 13, мы заключаемъ, что *Ind.* $190 = 13$. Такъ мы можемъ всегда найти указателя составнаго числа, зная указателей простыхъ чиселъ, входящихъ въ составъ его.

На основаніи доказанной нами теоремы мы заключаемъ, что указатель степени сравнимъ по модулю $p-1$ съ произведеніемъ показателя степени на указателя корня. Въ самомъ дѣлѣ, мы нашли, что

$$\textit{Ind. } ABC..... \equiv \textit{Ind. } A+\textit{Ind. } B+\textit{Ind. } C.... \ (\textit{мод. } p-1).$$

Предполагая здѣсь $A=B=C=.....$ и называя n число чиселъ A, B, C,....., мы находимъ

$$\textit{Ind. } A^n \equiv n. \textit{ Ind. } A \ (\textit{мод. } p-1).$$

Такъ, при модулѣ 199 находимъ *Ind.* $2^3 \equiv 3$ *Ind.* 2 (*мод.* 198). Но *Ind.* 2 есть 194. Слѣд. *Ind.* $2^3 \equiv 3 \ 194 \equiv 582$ (*мод.* 198).

47. Теорема. *Если x удовлетворяетъ сравненію $Ax^n \equiv B$ (мод. p), гдѣ A и B числа, недѣлящіяся на p, и p число простое,*

www.rcin.org.pl

то указатель x удовлетворяетъ сравненію n. Ind. x ≡ Ind. B —Ind. A (мод. p—1).

Доказательство. Такъ какъ два числа, сравнимыя по модулю p, имѣютъ одного указателя при томъ же модулѣ, то изъ сравненія $Ax^n \equiv B$ (*мод.* p) выходитъ *Ind.* $Ax^n = Ind.\ B$.

Но, по предыдущей теоремѣ, *Ind.* Ax^n по модулю $p-1$ сравнимъ съ *Ind.* $A + Ind.\ x^n$, а *Ind.* x^n сравнимъ съ n *Ind.* x: слѣдовательно, *Ind.* $A + n\ Ind.\ x \equiv Ind.\ B$ (*мод.* $p-1$; откуда выходитъ

$$n.\ Ind.\ x \equiv Ind.\ B - Ind.\ A\ (мод.\ p-1),$$

что и слѣдовало доказать.

На основаніи этой теоремы, легко рѣшаются всѣ сравненія вида $Ax^n \equiv B$ (*мод.* p) при p простомъ и A и B недѣлящихся на p. Сюда относятся сравненія первой степени, сравненія второй степени вида $x^2 \equiv q$ (*мод.* p) и всѣ сравненія двухчленныя.

Начнемъ съ приложенія этой теоремы къ сравненіямъ первой степени. Если данное сравненіе есть $Ax \equiv B$ (*мод.* p), то, на основаніи предыдущей теоремы, найдемъ

$$Ind.\ x \equiv Ind.\ B - Ind.\ A\ (мод.\ p-1).$$

Замѣчая, что *Ind.* x не можетъ быть менѣе 0 и болѣе $p-2$ мы изъ этого сравненія найдемъ его величину, опредѣляя наименьшее положительное число, сравнимое съ *Ind.* B—*Ind.* A по модулю $p-1$. Найдя указателя x, мы по таблицѣ найдемъ число, съ которымъ x сравнимо по модулю p: это и будетъ искомое рѣшеніе.

Такъ, для рѣшенія сравненія

$$10x \equiv 9\ (мод.\ 11)$$

находимъ *Ind.* $x \equiv Ind.\ 9 - Ind.\ 10$ (*мод.* 10). Но изъ таблицъ указателей видимъ, что *Ind.* $9 = 6$, *Ind.* $10 = 5$;
откуда выходитъ

$$Ind.\ x \equiv 6 - 5 \equiv 1\ (мод.\ 10),$$

и, слѣдовательно, *Ind.* $x = 1$. Но *Ind.* $x = 1$ соотвѣтствуетъ $x = 2$, слѣд., $x \equiv 2$ (*мод.* 11).

www.rcin.org.pl

Для рѣшенія сравненія $x^2 \equiv q$ (*мод.* p), мы изъ предыдущей теоремы выводимъ 2 *Ind.* $x \equiv$ *Ind.* q (*мод.* $p-1$).

Предполагая здѣсь p числомъ нечетнымъ, мы замѣчаемъ, что коеффиціентъ искомаго *Ind.* x и модуль имѣютъ общимъ наибольшимъ дѣлителемъ 2. Изъ этого, по теоремѣ 18-й, мы заключаемъ, что сравненіе и слѣд. $x^2 \equiv q$ (*мод.* p) не имѣютъ рѣшенія, если *Ind.* q не дѣлится на 2. Въ противномъ случаѣ, по теоремѣ 19-й, сравненіе 2 *Ind.* $x \equiv$ *Ind.* q (*мод.* $p-1$) будетъ имѣть два рѣшенія и, слѣд., найдется два числа въ ряду 0, 1, 2, ..., $p-2$, ему удовлетворяющія. Эти числа будутъ значенія *Ind.* x и по нимъ мы найдемъ два рѣшенія сравненія $x^2 \equiv q$ (*мод.* p).

Для примѣра возьмемъ сравненіе $x^2 \equiv 10$ (*мод.* 101). Рѣшеніе его приведется къ сравненію 2 *Ind.* $x \equiv$ *Ind.* 10 (*мод.* 100).

Но по таблицамъ находимъ *Ind.* $10 = 25$, что на 2 не дѣлится, слѣд. это сравненіе не имѣетъ рѣшенія. Дѣйствительно, опредѣляя значеніе $\left(\frac{10}{101}\right)$, находимъ

$$\left(\frac{10}{101}\right) = \left(\frac{2}{101}\right)\left(\frac{5}{101}\right) = -\left(\frac{5}{101}\right) = -\left(\frac{101}{5}\right) = -\left(\frac{1}{5}\right) = -1,$$

что обнаруживаетъ невозможность сравненія $x^2 \equiv 10$ (*мод.* 101).

Для другаго примѣра возьмемъ сравненіе $x^2 \equiv 30$ (*мод.* 107). Рѣшеніе этого сравненія приводится къ такому 2 *Ind.* $x \equiv$ *Ind.* 30 (*мод.* 106).

Но *Ind.* 30 есть 80, число четное. Слѣд., это сравненіе имѣетъ рѣшеніе.

Рѣшая сравненіе

$$2 \text{ Ind. } x \equiv 80 \text{ (мод. 106)},$$

мы находимъ, что наименьшія числа, ему удовлетворяющія, суть 40 и 93. Слѣд., *Ind.* $x = 40$, *Ind.* $x = 93$.

Но эти показатели соотвѣтствуютъ числамъ 64 и 43. Слѣд., рѣшенія сравненія $x^2 \equiv 30$ (*мод.* 107) суть

$$x \equiv 64, \quad x \equiv 43 \text{ (мод. 107)}.$$

www.rcin.org.pl

Обращаемся теперь къ рѣшенію двучленныхъ сравненій $x^n \equiv B$ (*мод.* p).

Рѣшеніе этого сравненія, по предыдущей теоремѣ, приводится къ слѣдующему

$$n.\ Ind.\ x \equiv Ind.\ B\ (мод.\ p-1).$$

По теоремѣ 18-ой, это сравненіе будетъ невозможно, если общій наибольшій дѣлитель чиселъ n и $p-1$ не дѣлитъ $Ind.\ B$, слѣд., въ этомъ случаѣ, сравненіе $x^n \equiv B$ (*мод.* p) не имѣетъ рѣшенія. Если же общій наибольшій дѣлитель n и $p-1$ есть ω, и ω дѣлитъ $Ind.\ B$, то сравненіе

$$n.\ Ind.\ x \equiv Ind.\ B\ (мод.\ p-1),$$

по теоремѣ 19-й, имѣетъ ω рѣшеній. Откуда выходитъ ω различныхъ значеній $Ind.\ x$, и слѣд. ω рѣшеній сравненія $x^n \equiv B$ (*мод.* p); все это подтверждаетъ намъ 38-ю теорему, по которой сравненіе $x^n \equiv B$ (*мод.* p) или не имѣетъ рѣшенія, или имѣетъ ихъ столько, сколько единицъ въ общемъ наибольшемъ дѣлителѣ чиселъ n и $p-1$.

Для примѣра, возьмемъ сравненіе $x^{12} \equiv 17$ (*мод.* 127). Для рѣшенія этого сравненія выводимъ

$$12\ Ind.\ x \equiv Ind.\ 17\ (мод.\ 126).$$

Находя для величины $Ind.\ 17$ число 118, которое не дѣлится на 6, общаго наибольшаго дѣлителя 12 и 126, мы заключаемъ, что сравненіе $12\ Ind.\ x \equiv Ind.\ 17$ (*мод.* 126), и, слѣд., сравненіе

$$x^{12} \equiv 17\ (мод.\ 127)$$

не имѣетъ рѣшенія.

Для другаго примѣра, возьмемъ сравненіе $x^{12} \equiv 38$ (*мод.* 127). Изъ этого сравненія выходитъ $12\ Ind.\ x \equiv Ind.\ 38$ (*мод.* 126), или $12\ Ind.\ x \equiv 60$ (*мод.* 126).

Здѣсь 60 дѣлится на 6, общій наибольшій дѣлитель чиселъ 12 и 126. Слѣд., это сравненіе имѣетъ 6 рѣшеній; эти рѣшенія мы найдемъ по 19-й теоремѣ, сокращая въ предыдущемъ сравненіи модуль и обѣ части на 6. Это даетъ намъ $2\ Ind.\ x \equiv 10$ (*мод.* 21).

www.rcin.org.pl

Рѣшая это сравненіе, мы находимъ, что наименьшее число, ему удовлетворяющее, есть 5. Откуда для рѣшенія сравненія $12\ Ind.\ x \equiv 60$ (*мод.* 126) выходитъ

$$\left.\begin{array}{l} Ind.\ x \equiv 5,\ Ind.\ x \equiv 26,\ Ind.\ x \equiv 47, \\ Ind.\ x \equiv 68,\ Ind.\ x \equiv 89,\ Ind.\ x \equiv 110. \end{array}\right\} \text{(мод. 126)}.$$

Изъ этихъ же сравненій слѣдуютъ такія 6 значеній $Ind.\ x$

$$5,\ 26,\ 47,\ 68,\ 89,\ 110.$$

Но этимъ указателямъ соотвѣтствуютъ числа

$$65,\ 30,\ 92,\ 62,\ 97,\ 35.$$

Слѣд., рѣшенія сравненія $x^{12} \equiv 17$ (*мод.* 127) суть

$$x \equiv 65,\ x \equiv 30,\ x \equiv 92,\ x \equiv 62,\ x \equiv 97,\ x \equiv 35\ (\text{мод. } 126).$$

§ 38. Переходимъ теперь къ опредѣленію первообразныхъ корней и докажемъ, что всякое число a простое съ p и неудовлетворяющее сравненіямъ

$$a^{\frac{p-1}{\alpha}} \equiv 1,\ a^{\frac{p-1}{\beta}} \equiv 1,\ a^{\frac{p-1}{\gamma}} \equiv 1, \ldots\ (\text{мод. } p),$$

гдѣ $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$ суть простыя числа, входящія въ составъ $p-1$, есть первообразный корень числа p.

Мы видѣли, что a будетъ первообразнымъ корнемъ числа p, если сравненіе $a^x \equiv 1$ (*мод.* p) не удовлетворяется числомъ меньшимъ $p-1$. Покажемъ же, что это будетъ имѣть мѣсто въ сдѣланныхъ нами предположеніяхъ. Для этого мы допустимъ противное и обнаружимъ несообразность его.

Если сравненіе $a^x \equiv 1$ (*мод.* p) удовлетворяется при $x < p-1$, то, по теоремѣ 42-й, удовлетворяется сравненіе $a^\omega \equiv 1$ (*мод.* p), гдѣ ω общій наибольшій дѣлитель чиселъ $p-1$ и x, и слѣд. ω меньше $p-1$. Поэтому, дробь $\frac{p-1}{\omega}$ приведется къ цѣлому числу, превосходящему 1. Но въ составъ этого числа могутъ входить только числа $\alpha, \beta, \gamma, \ldots\ldots$, входящія въ составъ $p-1$; слѣдов., одно изъ чиселъ $\alpha, \beta, \gamma, \ldots\ldots$ дѣлитъ частное $\frac{p-1}{a}$.

www.rcin.org.pl

Пусть же это будетъ β и частное отъ дѣленія $\frac{p-1}{\omega}$ на β пусть будетъ ς. Имѣя $\frac{p-1}{\omega\beta} = \varsigma$, мы выводимъ

$$\omega\varsigma = \frac{p-1}{\beta}.$$

На основаніи же этого уравненія, мы изъ сравненія $\alpha^{\omega} \equiv 1$ (*мод. p*), возводя обѣ части его въ степень ς, находимъ

$$a^{\frac{p-1}{\beta}} \equiv 1 \text{ (мод. } p),$$

что противно положенію.

Итакъ, сравненіе $a^x \equiv 1$ (*мод. p*) не можетъ удовлетворяться при $x < p-1$, а потому a есть первообразный корень числа p, что и слѣдовало доказать.

На основаніи этого, не трудно доказать слѣдующую теорему:

48. **Теорема.** *Если для a невозможны сравненія* $x^{\alpha} \equiv a$, $x^{\beta} \equiv a$, $x^{\gamma} \equiv a$, ... (*мод. p*), *гдѣ* $\alpha, \beta, \gamma, \ldots\ldots$ *суть простыя числа, входящія въ составъ* $p-1$, *то a есть первообразный корень. Въ противномъ случаѣ a не есть первообразный корень.*

Доказательство. По теоремѣ 38-й, отсутствіе рѣшеній въ сравненіяхъ $x^{\alpha} \equiv a$, $x^{\beta} \equiv a$, $x^{\gamma} \equiv a, \ldots$. (*мод. p*), гдѣ $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$. суть дѣлители $p-1$, предполагаетъ, что сравненія

$$a^{\frac{p-1}{\alpha}} \equiv 1,\ a^{\frac{p-1}{\beta}} \equiv 1,\ a^{\frac{p-1}{\gamma}} \equiv 1, \ldots\ldots \text{ (мод. } p)$$

не имѣютъ рѣшенія, а въ этомъ случаѣ, какъ доказали, число a есть первообразный корень числа p.

Напротивъ того, если какое нибудь изъ сравненій

$$x^{\alpha} \equiv a,\ x^{\beta} \equiv a,\ x^{\gamma} \equiv a, \ldots\ldots \text{ (мод. } p)$$

удовлетворяется, то имѣетъ мѣсто одно изъ сравненій

$$a^{\frac{p-1}{\alpha}} \equiv 1,\ a^{\frac{p-1}{\beta}} \equiv 1,\ a^{\frac{p-1}{\gamma}} \equiv 1, \ldots. \text{(мод. } p),$$

www.rcin.org.pl

и, слѣд., число a не есть первообразный корень.

§ 39. На основаніи этой теоремы, легко найти всѣ числа въ ряду 1, 2, 3,....., $p-1$, которыя не суть первообразные корни. По доказанной нами теоремѣ, если a не есть первообразный корень p, то какое нибудь изъ сравненій $x^\alpha \equiv a$, $x^\beta \equiv a$, $x^\gamma \equiv a$,..... (*мод.* p) имѣетъ рѣшеніе, а это мы узнаемъ потому, что одно изъ сравненій

$$\left.\begin{array}{l} 1^\alpha \equiv a,\ 2^\alpha \equiv a,\ 3^\alpha \equiv a, \ldots,\ (p-1)^\alpha \equiv a, \\ 1^\beta \equiv a,\ 2^\beta \equiv a,\ 3^\beta \equiv a, \ldots,\ (p-1)^\beta \equiv a, \\ 1^\gamma \equiv a,\ 2^\gamma \equiv a,\ 3^\gamma \equiv a, \ldots,\ (p-1)^\gamma \equiv a, \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \end{array}\right\} (\text{мод. } p)$$

удовлетворяется, Слѣд., число a, не будучи первообразнымъ корнемъ, будетъ сравнимо по модулю p съ однимъ изъ чиселъ

$$1^\alpha,\ 2^\alpha,\ 3^\alpha, \ldots\ldots\ldots,\ (p-1)^\alpha,$$
$$1^\beta,\ 2^\beta,\ 3^\beta, \ldots\ldots\ldots,\ (p-1)^\beta,$$
$$1^\gamma,\ 2^\gamma,\ 3^\gamma, \ldots\ldots\ldots,\ (p-1^\gamma,$$

а потому между остатками отъ дѣленія этихъ чиселъ на p найдутся всѣ числа, которыя меньше p и не первообразные корни p. Выкинувъ же эти числа изъ ряда 1, 2, 3, 4,....., $p-1$ мы найдемъ всѣ первообразные корни, меньшіе p. Что же касается до чиселъ, которыя превосходятъ p и имѣютъ свойство первообразныхъ корней, они, какъ не трудно убѣдиться, будутъ сравнимы съ первыми по модулю p; мы на нихъ не будемъ останавливаться, потому что они ничего особеннаго не представляютъ и, говоря о числѣ первообразныхъ корней p, мы будемъ разумѣть только тѣ, которые меньше p.

Приложимъ сказанное нами къ опредѣленію первообразныхъ корней числа 13. Такъ какъ въ составъ 13—1 входятъ 2 и 3, то въ ряду 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 всѣ числа, отличныя отъ остатковъ дѣленія

$$1^2,\ 2^2,\ 3^2,\ 4^2,\ 5^2,\ 6^2,\ 7^2,\ 8^2,\ 9^2,\ 10^2,\ 11^2,\ 12^2,$$
$$1^3,\ 2^3,\ 3^3,\ 4^3,\ 5^3,\ 6^3,\ 7^3,\ 8^3,\ 9^3,\ 10^3,\ 11^3,\ 12^3,$$

на 13 будутъ первообразные корни.

www.rcin.org.pl

Но дѣля 1^2, 3^2, 4^2, 5^2, 6^2, 7^2, 8^2, 9^2, 10^2, 11^2, 12^2 на 13, мы находимъ такой рядъ остатковъ

1, 5, 4, 9, 3, 12, 10, 10, 12, 3, 9, 4, 1;

дѣля же 1^3, 2^3, 4^3, 5^3, 6^3, 7^3, 8^3, 10^3, 11^3, 12^3 находимъ остатки

1, 8, 1, 12, 8, 8, 5, 5, 1, 12, 5, 12.

Исключая изъ ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 числа равныя этимъ остаткамъ, находимъ, что первообразные корни числа 13 суть

2, 6, 7, 11.

§ 40. Показанный нами способъ опредѣленія первообразныхъ корней, замѣчательный тѣмъ, что даетъ всѣ эти корни, становится почти не выполнимымъ, когда ищутъ первообразные корни числа довольно большаго. Въ этомъ случаѣ, легче бываетъ найти одинъ изъ первообразныхъ корней (чего для насъ, какъ увидимъ, совершенно достаточно), пробуя различныя числа возводить въ степени и искать, которая изъ нихъ сравнима съ 1 по модулю p, числу котораго ищемъ первообразный корень. Если, возводя a въ степени 1, 2, 3,....., мы дойдемъ до a^{p-1}, не найдя между ними числа сравнимаго съ 1 по модулю p, мы заключаемъ, что a есть первообразный корень числа p. Если же мы найдемъ, что $a^n \equiv 1$ (*мод.* p), гдѣ n, меньше $p-1$, то мы убѣдимся, что a непервообразный корень. Въ этомъ случаѣ, мы будемъ искать число, котораго наименьшая степень, сравнимая съ единицею по модулю p, превосходила бы n, и такое число мы всегда найдемъ, поступая слѣдующимъ образомъ.

Мы возьмемъ число изъ ряда

$$1, 2, 3, \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots, p-1,$$

отличное отъ остатковъ дѣленія a^1, a^2, a^3,..... a^n на p и станемъ искать низшую степень его, сравнимую съ единицею по модулю p. Пусть выбранное нами число будетъ b и низшая степень его, сравнимая съ единицею, будетъ m. Не трудно убѣдиться, что m не будетъ ни равнымъ n, ни дѣли-

www.rcin.org.pl

телемъ n: ибо, въ томъ и другомъ случаѣ, число b удовлетворяло бы сравненію $b^n \equiv 1$ (*мод.* p), что не возможно по теоремѣ 37-й при b^n несравнимомъ съ $a^1, a^2, \ldots\ldots, a^{n-1}$ по модулю p и n наименьшемъ числѣ, удовлетворяющемъ сравненію $a^n \equiv 1$ (*мод.* p). Поэтому, или m будетъ больше n и, слѣд., само b будетъ числомъ, котораго низшая степень, сравнимая съ единицею, превосходитъ n, или m, будучи меньше n, въ составѣ своемъ будетъ заключать множителя, недѣлящаго n. Въ послѣднемъ случаѣ, мы легко найдемъ по a, b, m и n число, котораго низшая степень, сравнимая съ единицею, превосходитъ n. Для этаго, мы найдемъ общаго наибольшаго дѣлителя чиселъ m и n, и этого дѣлителя разложимъ на два множителя π и ς такъ, чтобы $\frac{n}{\pi}$ и $\frac{m}{\varsigma}$ были числа относительно другъ друга простыя (*); потомъ найдемъ значеніе $a^{\pi}b^{\varsigma}$, или числа сравнимаго съ нимъ по модулю p. Такого числа низшая степень, сравнимая, съ единицею, будетъ всегда болѣе n. Чтобы убѣдиться въ этомъ, мы докажемъ, что если

$$c \equiv a^{\pi}b^{\varsigma},\ c^N \equiv 1 \text{ (мод. } p),$$

то N дѣлится на $\frac{nm}{\pi\varsigma}$ и, слѣд., низшая степень c, сравнимая съ единицею по модулю p, превосходитъ n: ибо $\pi\varsigma$, будучи общимъ дѣлителемъ m и n, гдѣ m не дѣлитъ n, будетъ меньше m.

Чтобы доказать дѣлимость N на $\frac{mn}{\pi\varsigma}$, гдѣ $c^N \equiv 1, c \equiv a^{\pi}b^{\varsigma}$ (*мод.* p),, мы замѣчаемъ, что изъ этихъ сравненій, по исключеніи c, выходитъ

$$a^{\pi N}b^{\varsigma N} \equiv 1 \text{ (мод. } p).$$

Возводя-же это сравненіе въ степени $\frac{n}{\pi}$, $\frac{m}{\varsigma}$, находимъ

(*) Чтобы сдѣлать такое разложеніе ω общаго наибольшаго дѣлителя чиселъ m и n, мы разложимъ его на произведеніе простыхъ чиселъ и возьмемъ въ составъ π тѣ простыя числа, которыхъ показатели въ ω не ниже показателей въ n; въ составъ же ς возьмемъ тѣ простыя числа, которыхъ показатели въ ω не ниже, чѣмъ въ m. Что-же касается до простыхъ чиселъ, которыхъ показатель въ m и n, и, слѣ. въ ω одинъ и тотъ-же, мы ихъ безъ различія можемъ взять въ составъ π или ς.

www.rcin.org.pl

$$a^{N}{}^{\frac{\varsigma n N}{\pi}} \equiv 1, a^{\frac{m\pi N}{\varsigma}} b^{Nm} \equiv 1 \text{ (мод. } p).$$

Но мы видѣли, что m и n удовлетворяютъ сравненіямъ $a^n \equiv 1$, $b^m \equiv 1$ (*мод.* p); вслѣдствіе чего предыдущія сравненія приводятся къ

$$b^{\frac{n\varsigma N}{\pi}} \equiv 1, a^{\frac{m\pi N}{\varsigma}} \equiv 1 \text{ (мод. } p).$$

Эти-же сравненія, по теоремѣ 43, предполагаютъ. что $\frac{Nn\varsigma}{\pi}$ дѣлится на m, $\frac{m\pi N}{\varsigma}$ дѣлится на n. ибо n и m суть наименьшія числа, удовлетворяющія сравненіямъ $a^x \equiv 1$, $b^x \equiv 1$ (*мод.* p). Но дѣлимость $\frac{n\varsigma N}{\pi}$ на m, $\frac{m\pi N}{\varsigma}$ на m предполагаетъ числа $\frac{n\varsigma N}{\pi m}$, $\frac{m\pi N}{\varsigma n}$, или $\frac{N\frac{n}{\pi}}{\frac{m}{\varsigma}}$, $\frac{N\frac{m}{\varsigma}}{\frac{n}{\pi}}$ цѣлыми. А потому, число $\frac{m}{\varsigma} N$ должно дѣлиться на $\frac{n}{\pi}$, а число $\frac{n}{\pi} N$ должно дѣлиться на $\frac{m}{\varsigma}$. Но эта дѣлимость, при $\frac{m}{\varsigma}$ и $\frac{n}{\pi}$ простыхъ между собою, предполагаетъ дѣлимость N на числа $\frac{n}{\pi}$ и $\frac{m}{\varsigma}$, и, слѣд., на произведеніе ихъ $\frac{mn}{\pi\varsigma}$, что и имѣли въ виду доказать.

Такимъ образомъ, числу, котораго низшая степень, сравнимая съ единицею по модулю p, есть n, гдѣ n, меньше $p-1$, мы всегда найдемъ число, котораго низшая степень, сравнимая съ единицею, будетъ превосходить n, и, слѣд., повторяя эти пріемы достаточное число разъ, мы необходимо дойдемъ до числа, котораго низшая степень, сравнимая съ единицею по модулю p, будетъ не меньше $p-1$; такое число и будетъ первообразный корень числа p.

Для примѣра, опредѣлимъ по этому способу первообразный корень числа 17. Испытываемъ, не есть ли 2 первообразный корень его. Для этого, дѣлимъ 2, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6, 2^7, 2^8,..... на 17; въ остаткѣ отъ этихъ дѣленій находимъ

1, 2, 8, 16 15, 13, 9, 1,.....

Дойдя до остатка 1, который получаемъ при дѣленіи 2^8 на

www.rcin.org.pl

17, мы оканчиваемъ дѣленіе и заключаемъ, что 2 не есть первообразный корень. Послѣ того беремъ другое число меньшее 17 и незаключающееся между остатками 1, 2, 8, 16, 15, 13, 9 и пробуемъ, не есть-ли оно первообразный корень. Наименьшее изъ этихъ чиселъ есть 3; его мы и беремъ для испытанія. Дѣля $3, 3^2, 3^3, 3^4, 3^5, 3^6, 3^7, 3^8, 3^9, 3^{10}, 3^{12}, 3^{13}, 3^{14}, 3^{15}$, на 17 и не находя къ остаткѣ 1, мы заключаемъ, что 3 есть первообразный корень 17.

Для другаго примѣра, возьмемъ число 73 и найдемъ его первообразный корень. Начнемъ испытанія съ 2, какъ числа простѣйшаго. Дѣля числа, $2, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6, 2^7, 2^8,\ldots\ldots$, на 73, мы найдемъ въ остаткѣ 17.

Для другаго примѣра, возьмемъ число 73 и найдемъ его первообразный корень. Начнемъ испытанія съ 2, какъ числа простѣйшаго. Дѣля числа $2, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5\ 2^6, 2^7, 2^8,\ldots\ldots$ на 73, мы найдемъ въ остаткѣ

$$2, 4, 8, 16, 32, 64, 55, 37\ 1,\ldots\ldots$$

Откуда видимъ, что 2 удовлетворяетъ сравненію

$$2^\varsigma \equiv 1 \ (\textit{мод.}\ 73).$$

и, слѣд., 2 не есть первообразный корень. Далѣе, замѣчая, что между остатками 2, 4, 8, 16, 32, 65, 55, 37 нѣтъ числа 3, мы беремъ его для испытанія. Дѣля числа

$$3, 3^2, 3^3, 3^4, 3^5, 3^6, 3^7. 3^8, 3^9. 3^{10}, 3^{11}, 3^{12},\ldots\ldots,$$

на 73, находимъ въ остаткѣ

$$3, 9, 27, 8, 24, 72, 64, 46, 65, 49, 1\ldots\ldots$$

Слѣдовательно, $3^{12} \equiv 1$ (*мод.* 73). Откуда заключаемъ, что 3 также не есть первообразный корень числа 73. Но изъ 2 и 3, удовлетворяющихъ сравненіямъ $2^9 \equiv 1$, $3^{12} \equiv 1$ (*мод.* 73), мы, по сказанному нами, легко составимъ число, котораго низшая степень, сравнимая съ 1 по модулю 72, будетъ больше 12.

Для этого, мы замѣчаемъ, что общій наибольшій дѣлитель 9 и 12 есть 3 и это число, будучи простымъ, въ составъ 12 входитъ въ первой степени, а въ составъ 9 во второй; поэтому для разложенія 3 на два множителя π и ς такъ, чтобы $\frac{9}{\pi}, \frac{12}{\varsigma}$

www.rcin.org.pl

были числа простыя относительно другъ друга, мы возьмемъ $\pi = 1$, $\varsigma = 3$. Вслѣдствіе чего 2.3^3, или 54 будетъ число, котораго низшая степень, сравнимая съ единицею по модулю 73, превзойдетъ 12. Опредѣляя остатки отъ дѣленія

$$54,\ 54^2,\ 54^3,\ 54^4,\ 54^5,\ 54^6,\ 54^7,\ 54^8,\ 54^9,\ 54^{10},\ 54^{11},\ 54^{12},\ 54^{13},\ 54^{14},\ 54^{15},$$
$$54^{16},\ 54^{17},\ 54^{18},\ 54^{19},\ 54^{20},\ 54^{21},\ 54^{22},\ 54^{23},\ 54^{24},\ 54^{25},\ 54^{26},\ 54^{27},\ 54^{28},$$
$$54^{29},\ 54^{30},\ 54^{31},\ 54^{32},\ 54^{33},\ 54^{34},\ 54^{35},\ 54^{36}$$

на 73, находимъ

$$54,\ 69,\ 3,\ 16,\ 61,\ 9,\ 48,\ 37,\ 27,\ 71,\ 38,\ 8,\ 67,\ 41,\ 24,\ 55,\ 50,\ 72,\ 19,\ 4,$$
$$70,\ 57,\ 12,\ 64,\ 25,\ 36,\ 46,\ 2,\ 35,\ 65,\ 6,\ 32,\ 49,\ 18,\ 23.\ 1.$$

Откуда заключаемъ, что 36 есть наименьшее число, удовлетворяющее сравненію $54^x \equiv 1$ (*мод.* 73).

Продолжая искать первообразный корень 73, мы должны взять число, не заключающееся между найденными нами остатками отъ дѣленія степеней 54 на 73. Наименьшее изъ этихъ чиселъ есть 5; его то мы и будемъ испытывать. Возводя 5 во всѣ степени до 72-й, мы не находимъ числа, сравнимаго съ 1 по модулю 73. Слѣдов., наименьшее число, удовлетворящее сравненію

$$5^x \equiv 1 \ (\textit{мод.}\ 73),$$

есть 72; отвуда заключаемъ, что 5 есть первообразный корень 73.

Такимъ образомъ, мы найдемъ одинъ изъ первообразныхъ корней всякаго простаго числа. Но, когда извѣстенъ одинъ первообразный корень числа p, то мы легко найдемъ всѣ другіе. Въ самомъ дѣлѣ, пусть будетъ a найденный нами первообразный корень числа p, и $\alpha, \beta, \gamma, \ldots\ldots$ различныя простыя числа, входящія въ составъ $p-1$. Если A есть первообразный корень, то, по теоремѣ 48-й, сравненія

$$x^\alpha \equiv A, x^\beta \equiv A, x^\lambda \equiv A, \ldots\ldots \ (\textit{мод.}\ p)$$

не должны имѣть рѣшенія. Но изъ этихъ сравненій выходитъ

$$\alpha\ Ind.\ x \equiv Ind.\ A, \beta\ Ind.\ x \equiv Ind.\ A, \gamma\ Ind.\ x \equiv Ind.\ A\ldots. \ (\textit{мод.}\ p-1),$$

а такъ какъ $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$ суть простыя числа, входящія въ составъ $p-1$, то условіе невозможности ихъ заключается въ недѣлимости *Ind.* A на $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$ или, что одно и то же, не

www.rcin.org.pl

возможность ихъ условливается тѣмъ, что *Ind. A* число простое съ $p-1$. Но если за основаніе указателей мы предположимъ принятымъ извѣстный намъ первообразный корень a, то

$$A \equiv a^{Ind.\ A} \ (мод.\ p).$$

Откуда слѣдуетъ, что число, которое есть первообразный корень p, будетъ сравнимо по модулю p съ a, возведеннымъ въ степень простую съ $p-1$.

Такъ, всѣ первообразные корни числа 17, по найденному нами, 3 опредѣлятся сравненіями

$$x \equiv 3,\ x \equiv 3^3,\ x \equiv 3^5,\ x \equiv 3^7,\ x \equiv 3^9,\ x \equiv 3^{11},\ x \equiv 3^{13},\ x \equiv 3^{15}\ (мод.\ 17);$$

откуда слѣдуетъ, что первообразные корни 17 суть

3, 10, 5, 11, 14, 7, 12, 6.

§ 41. На основаніи сказаннаго нами, мы замѣчаемъ, что въ ряду 1, 2,....., $p-1$ находится столько первообразныхъ корней p, сколько чиселъ меньшихъ $p-1$ и простыхъ съ $p-1$.

Не трудно также вывести это непосредственно изъ свойствъ первообразныхъ корней, показанныхъ нами въ § 33. Чтобы найти въ ряду 1, 2, 3,...., $p-1$ всѣ первообразные корни числа p, намъ стоитъ только выкинуть отсюда всѣ числа, которыя не могутъ быть первообразными корнями числа p. Но, по § 38, это приводится къ тому, чтобы здѣсь выкинуть всѣ числа, которыя удовлетворяютъ сравненіямъ

$$x^{\frac{p-1}{\alpha}} \equiv 1,\ x^{\frac{p-1}{\beta}} \equiv 1,\ x^{\frac{p-1}{\gamma}} \equiv 1,\ \ldots\ldots\ (мод.\ p),$$

гдѣ $\alpha, \beta, \gamma, \ldots\ldots$ простыя числа, входящія въ составъ $p-1$.

На основаніи этого, не трудно сосчитать, сколько первообразныхъ корней между числами 1, 2, 3,..., $p-1$. Начнемъ съ простѣйшаго случая. Предположимъ, что $p-1$ дѣлится только на простое число a, и слѣд. $p-1=\alpha^m$. Въ этомъ случаѣ, всѣ тѣ изъ чиселъ 1, 2, 3,....., $p-1$, которыя не удовлетворяютъ сравненію $x^{\frac{p-1}{\alpha}} \equiv 1\ (мод.\ p)$, будутъ перво-

www.rcin.org.pl

образные корни. Но, по теоремѣ 35, между числами 1, 2, 3, ..., $p-1$ находится $\frac{p-1}{\alpha}$ чиселъ, удовлетворяющихъ сравненію $x^{\frac{p-1}{\alpha}} \equiv 1 \pmod{p}$; слѣд., здѣсь всѣ остальныя $p-1-\frac{p-1}{\alpha}$ суть первообразные корни p. Число же $p-1-\frac{p-1}{\alpha}$ приводится къ $(p-1)\left(1-\frac{1}{\alpha}\right)$, а это, по 12 теоремѣ, означаетъ, сколько простыхъ чиселъ съ $p-1$ и меньшихъ $p-1$, если $p-1=\alpha^m$.

Обращаемся теперь къ тому случаю, когда $p-1=\alpha^m \beta^n$, гдѣ α, β различныя простыя числа. Въ этомъ случаѣ, мы найдемъ всѣ первообразные корни p между 1, 2, 3, ..., $p-1$, выкинувши отсюда числа, удовлетворяющія сравненіямъ

$$x^{\frac{p-1}{\alpha}} \equiv 1, \; x^{\frac{p-1}{\beta}} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Но, по 35 теоремѣ, первому сравненію удовлетворяетъ $\frac{p-1}{\alpha}$ чиселъ меньшихъ p; второму же удовлетворяетъ $\frac{p-1}{\beta}$ такихъ чиселъ. Притомъ, между этими числами, удовлетворяющими сравненіямъ

$$x^{\frac{p-1}{\alpha}} \equiv 1, \; x^{\frac{p-1}{\beta}} \equiv 1 \pmod{p},$$

будетъ $\frac{p-1}{\alpha\beta}$ однихъ и тѣхъ же чиселъ, удовлетворяющихъ сравненію

$$x^{\frac{p-1}{\alpha\beta}} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Слѣд., различныхъ чиселъ, удовлетворяющихъ сравненіямъ

$$x^{\frac{p-1}{\alpha}} \equiv 1, \; x^{\frac{p-1}{\beta}} \equiv 1 \pmod{p},$$

будетъ $\frac{p-1}{\alpha}+\frac{p-1}{\beta}-\frac{p-1}{\alpha\beta}$. За исключеніемъ ихъ всѣ числа въ ряду 1, 2, 3...., $p-1$ будутъ первообразные корни, и число ихъ

www.rcin.org.pl

будетъ $p-1-\frac{p-1}{\alpha}-\frac{p-1}{\beta}+\frac{p-1}{\alpha\beta}$, или $(p-1)\left(1-\frac{1}{\alpha}\right)\left(1-\frac{1}{\beta}\right)$

Но, по 12 теоремѣ, извѣстно, что $(p-1)\left(1-\frac{1}{\alpha}\right)\left(1-\frac{1}{\beta}\right)$ означаетъ, сколько простыхъ чиселъ съ $p-1$ и меньшихъ $p-1$, если $p-1=\alpha^m\beta^n$.

Подобнымъ образомъ, полагая $p-1=\alpha^m\beta^n\gamma^r$, $p-1=\alpha^m\beta^n\gamma^r\delta^s$, $p-1=\alpha^m\beta^n\gamma^r\delta^s\varsigma^t$, и т. д., докажемъ, что между числами 1, 2, 3,...., $p-1$ столько же первообразныхъ корней, сколько чиселъ простыхъ съ $p-1$ и меньшихъ $p-1$.

Каждый изъ первообразныхъ корней p можетъ быть принятъ за основаніе при опредѣленіи указателей по модулю p. Выгоднѣе другихъ принимать тѣ, которые легче возводить въ степени и слѣд. опредѣлять по нимъ указателей. Впрочемъ, зная указателей по одному основанію, не трудно найти ихъ по другому. Пусть будетъ a то основаніе, по которому составлена таблица, а b основаніе, по которому хотимъ вычислить указателя какого нибудь числа A. Называя указателя A по основанію b черезъ x, для опредѣленія x, будемъ имѣть

$$A\equiv b^x \ (\textit{мод. } p).$$

Изъ этаго сравненія мы заключаемъ о равенствѣ указателей A и b^x по какому нибудь основанію a. Изображая этихъ указателей по принятому нами знакоположенію черезъ $Ind.\ x$ и $Ind.\ b^x$, мы имѣемъ

$$Ind.\ A\equiv Ind.\ b^x.$$

Но, по свойству указателей, $Ind.\ b^x\equiv x\ Ind.\ b\ (\textit{мод. } p-1)$. Слѣдовательно,

$$x.\ Ind.\ b\equiv Ind.\ A\ (\textit{мод. } p-1).$$

Рѣшеніемъ этого сравненія мы найдемъ x.

Это сравненіе будетъ имѣть одно рѣшеніе: ибо, какъ видѣли, указатель первообразнаго корня будетъ всегда число простое съ $p-1$. Рѣшивши это сравненіе, мы легко найдемъ положительное число меньше $p-1$ и ему удовлетворяющее; это и будетъ искомое число x, указатель числа A при основаніи b.

Для примѣра, опредѣлимъ указателя числа 25 по основанію 2 и модулю 29, зная указателей при этомъ модулѣ по осно-

www.rcin.org.pl

ванію 10, какъ находимъ въ нашихъ таблицахъ. Называя искомый указатель черезъ x, мы для опредѣленія его выводимъ

$$x\ Ind.\ 2 \equiv Ind.\ 25\ (мод.\ 28).$$

Но $Ind.\ 2 = 11$, $Ind.\ 25 = 8$. Слѣд., x опредѣлится сравненіемъ

$$11\ x \equiv 8\ (мод.\ 28).$$

Рѣшая это сравненіе, находимъ

$$x \equiv 16\ (мод.\ 28);$$

откуда для величины указателя 25 по основанію 2 получаемъ 10.

ГЛАВА VII.

О сравненіяхъ второй степени съ двумя неизвѣстными.

§ 42. До сихъ поръ мы занимались сравненіями, въ которыхъ одна неизвѣстная; теперь мы будемъ разсматривать сравненія съ двумя неизвѣстными. Замѣчательнѣйшія изъ нихъ и имѣющія наиболѣе приложенія суть сравненія второй степени вида

$$x^2 + Ay^2 + B \equiv 0\ (мод.\ p);$$

ими то мы и займемся теперь.

Относительно сравненій этого вида докажемъ слѣдующую теорему:

49. **Теорема.** *Если p число простое и не дѣлитъ A, то сравненію $x^2+Ay^2+B\equiv 0$ (мод. p) можно всегда удовлетворить.*

Доказательство. Эта теорема очевидна для $p=2$: ибо тогда сравненію $x^2 + Ay^2 + B \equiv 0$ (*мод.* p) удовлетворяетъ $y = 0$, $x = B$. Также очевидна она, если для какого нибудь значенія y суммы $Ay^2 + B$ обращается въ число кратное p:

www.rcin.org.pl

ибо такая величина y вмѣстѣ съ $x = 0$ удовлетворяетъ сравненію $x^2 + Ay^2 + B \equiv 0$ (*мод.* p).

Докажемъ же теперь возможность удовлетворить этому сравненію при $p > 2$ и $Ay^2 + B$ неспособномъ сдѣлатся дѣлимымъ на p.

Въ этомъ случаѣ, между всѣми значеніями $-Ay^2 - B$ отъ $y = 0$ до $y = p - 1$ найдется число, которое будетъ сравнимо съ x^2 по модулю p; ибо невозможность сравненія

$$x^2 \equiv -Ay^2 - B \ (\text{мод. } p)$$

при p простомъ большемъ 2 и $-Ay^2 - B$ недѣлящемся на p, какъ видѣли въ IV главѣ, предполагаетъ сравненіе

$$(-Ay^2 - B)^{\frac{p-1}{2}} + 1 \equiv 0 \ (\text{мод. } p),$$

это, по раскрытіи скобокъ, принимаетъ такой видъ

$$\pm A^{\frac{p-1}{2}} y^{p-1} \pm A^{\frac{p-3}{2}} py^{p-3} + \ldots \pm B^{\frac{p-1}{2}} + 1 \equiv 0 \ (\text{мод. } p).$$

Но этому сравненію не могутъ удовлетворить всѣ p чиселъ

$$0, 1, 2, \ldots, p-1;$$

ибо оно степени $p - 1$ и $A^{\frac{p-1}{2}}$ коеффиціентъ y^{p-1}, состоя изъ произведенія чиселъ простыхъ съ p, не дѣлится на p.

Итакъ, по крайней мѣрѣ одно изъ чиселъ

$$0, 1, 2, \ldots, p-1$$

не будетъ удовлетворять этому сравненію, и такое число обратитъ $-Ay^2 - B$ въ квадратичный вычетъ p. При такомъ же значеніи $Ay^2 - B$, найдется x, удовлетворяющій сравненію

$$x^2 \equiv -Ay^2 - B \ (\text{мод. } p),$$

откуда и слѣдуетъ предложенная нами теорема.

Изъ доказанной нами теоремы, какъ частный случай, выходитъ, что сравненіе $x^2 + y^2 + 1 \equiv 0$ (*мод.* p) имѣетъ рѣшеніе.

www.rcin.org.pl

§ 43, Остановимся на изслѣдованіи сравненія

$$x^2 + Ay^2 + C \equiv 0 \ (\text{мод. } p)$$

при $C=0$. Предметомъ нашихъ изслѣдованій будетъ показать, какія свойства имѣетъ число p, для котораго сравненіе

$$x^2 + Ay^2 \equiv 0 \ (\text{мод. } p)$$

удовлетворяется какими нибудь числами x, y, простыми между собою. Возможность этого сравненія намъ покажетъ, что число p можетъ быть дѣлителемъ числа, выражающагося формулою $x^2 + Ay^2$, гдѣ x, y простыя между собою. Въ противномъ случаѣ, мы заключимъ, что числа, выражающіяся этою формулою, недѣлимы на p. Въ первомъ случаѣ, мы будемъ называть p *дѣлителемъ квадратичной формы* x^2+Ay^2; во второмъ, *недѣлителемъ квадратичной формы*. Мы покажемъ средства—по данной формѣ x^2+Ay^2 находить всѣ дѣлители ея и недѣлители. Эти числа мы будемъ представлять или формулами вида $mz+\alpha$, гдѣ z произвольное цѣлое число, или формулами вида $au^2+2buv+cv^2$, гдѣ u, v произвольныя цѣлыя числа, простыя между собою. Первое составляетъ изслѣдованія, извѣстныя подъ именемъ теоріи *линейныхъ дѣлителей квадратичныхъ формъ*; второе, составляетъ *теорію квадратичныхъ дѣлителей квадратичныхъ формъ*.

Мы начнемъ съ теоріи линейныхъ дѣлителей и докажемъ слѣдующую теорему, которая служитъ основаніемъ ея:

50. **Теорема**. *Если сравненію* $x^2+Ay^2\equiv 0$ $(\text{мод. } p)$ *удовлетворяютъ какія нибудь числа* x, y *простыя между собою, то сравненіе* $x^2 + A \equiv 0$ $(\text{мод. } p)$ *имѣетъ рѣшеніе.*

Доказательство. Въ самомъ дѣлѣ, если y и x, не имѣя общаго множителя, удовлетворяютъ сравненію

$$x^2 + Ay^2 \equiv 0 \ (\text{мод. } p),$$

то y простое съ p: ибо, въ противномъ случаѣ, простое число, дѣлящее y и p, дѣлило бы x и, слѣд., x имѣло бы общаго дѣлителя съ y. Но если y простое съ p, то можно найти такое число u, которое будетъ удовлетворять сравненію

www.rcin.org.pl

$$yu \equiv x \ (\text{мод. } p).$$

Это же сравненіе, по возведеніи въ квадратъ обѣихъ частей, будетъ

$$y^2u^2 \equiv x^2 \ (\text{мод. } p),$$

что въ совокупности съ

$$x^2 + Ay^2 \equiv 0 \ (\text{мод. } p).$$

даетъ

$$y^2u^2 + Ay^2 \equiv 0 \ (\text{мод. } p).$$

Но это сравненіе можетъ быть сокращено на y^2, ибо, видѣли, число y простое съ p. Такимъ образомъ находимъ

$$u^2 + A \equiv 0 \ (\text{мод. } p),$$

что и слѣдовало доказать.

Итакъ, возможность удовлетворить сравненію

$$x^2 + Ay^2 \equiv 0 \ (\text{мод. } p)$$

числами x и y простыми между собою предполагаетъ возможность удовлетворить сравненію

$$u^2 + A \equiv 0 \ (\text{мод. } p).$$

Обратно, когда это сравненіе удовлетворяется, то мы всегда найдемъ рѣшеніе сравненія

$$x^2 + Ay^2 \equiv 0 \ (\text{мод. } p),$$

дѣлая $y = 1$, $x = u$.

На основаніи доказанной нами теоремы, не трудно узнать, будетъ-ли данное число дѣлителемъ данной формы, или нѣтъ.

Такъ, находя—1 для величины $\left(\frac{3}{5}\right)$ по пріемамъ, изложеннымъ въ IV главѣ, мы заключаемъ, что сравненіе $u^2 - 3 \equiv 0$ (*мод.* 5) не имѣетъ рѣшенія. Откуда, по доказанному нами слѣдуетъ, что при x и y простыхъ между собою нельзя удовлетворить сравненію

$$x^2 - 3y^2 \equiv 0 \ (\text{мод. } 5),$$

или, что одно и тоже, обратить $x^2 - 3y^2$ въ число кратное 5.

www.rcin.org.pl

Также замѣчая, что $\left(\frac{-1}{p}\right)$, при p простомъ вида $4n+3$, равно -1, мы заключаемъ, что въ этомъ случаѣ сравненіе $u^2+1\equiv 0$ (*мод.* p) не имѣетъ рѣшенія; а потому нельзя удовлетворить сравненію

$$x^2+y^2\equiv 0 \text{ (мод. } p)$$

числами простыми между собою.

Откуда слѣдуетъ, что никакое простое число вида $4n+3$ не будетъ дѣлителемъ чиселъ, разлагающихся на два квадрата простые между собою.

Такъ, числа

$$5=2^2+1,\ 10=3^2+1,\ 13=3^2+2^2,$$
$$17=4^2+1,\ 25=4^2+3^2,\ 26=5^2+1,\ \ldots\ldots$$

не дѣлятся на числа 7, 11, 19, 23, вида $4n+3$.

Напротивъ, замѣчая, что $\left(\frac{-1}{p}\right)$ есть $+1$, если n простое число вида $4n+1$, мы заключаемъ о возможности сравненія

$$u^2+1\equiv 0 \text{ мод. } p)$$

для такихъ значеній p. Отсюда слѣдуетъ возможность сравненія

$$x^2+y^2\equiv 0 \text{ (мод. } p)$$

и, слѣд., дѣлимость суммы двухъ квадратовъ на p.

На основаніи доказанной нами теоремы, не трудно показать видъ простаго числа p, которое можетъ быть дѣлителемъ данной формы x^2+Ay^2. Мы не будемъ останавливаться на случаѣ $p=2$: ибо 2 всегда дѣлитъ x^2+Ay^2 или при $x=1$, $y=1$, или $x=0$ $y=1$. Поэтому, мы теперь будемъ предполагать p, числомъ простымъ, отличнымъ отъ 2, и въ этомъ предположеніи докажемъ слѣдующія, теоремы:

51. **Теорема.** *Если A простое число вида $4n+3$ и p нечетный дѣлитель формы x^2+Ay^2, то* $\left(\frac{p}{A}\right)=+1$.

Доказательство. Если p есть дѣлитель формы x^2+Ay^2, то сравненіе

www.rcin.org.pl

$$x^2 + Ay^2 \equiv 0 \ (\text{мод.}\, p)$$

имѣетъ рѣшеніе; а это, по теоремѣ 50-й, предполагаетъ возможность удовлетворить сравненію

$$u^2 + A \equiv 0 \ (\text{мод.}\ p).$$

Разлагая здѣсь p на произведеніе простыхъ чиселъ $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$ мы, по § 30, возможность этого сравненія выразимъ такъ

$$\left(\frac{-A}{\alpha}\right) = 1, \left(\frac{-A}{\beta}\right) = 1, \left(\frac{-A}{\gamma}\right) = 1, \ldots\ldots$$

Изъ этихъ уравненій не трудно вывести значенія символомъ

$$\left(\frac{\alpha}{A}\right) = 1, \left(\frac{\beta}{A}\right) = 1, \left(\frac{\gamma}{A}\right) = 1, \ldots\ldots\ldots$$

Такъ, для опредѣленія перваго, мы выводимъ, по доказаннымъ свойствамъ символа $\left(\frac{p}{q}\right)$ въ IV главѣ, что

$$\left(\frac{\alpha}{A}\right) = \left(\frac{A}{\alpha}\right)(-1)^{\frac{\alpha-1}{2}\frac{A-1}{2}} = \left(\frac{-A}{\alpha}\right)(-1)^{\frac{\alpha-1}{2}} + \frac{\alpha-1}{2}\frac{A-1}{2}$$

$$= \left(\frac{-A}{\alpha}\right)(-1)^{\frac{\alpha-1}{2}\frac{A+1}{2}}$$

Но такъ какъ по предыдущимъ уравненіямъ $\left(\frac{-A}{\alpha}\right)$ равно 1 а число A, по положенію, вида $4n+3$, то изъ этого уравненія получаемъ

$$\left(\frac{\alpha}{A}\right) = 1.$$

Подобнымъ образомъ выводимъ

$$\left(\frac{\beta}{A}\right) = 1, \left(\frac{\gamma}{A}\right) = 1, \ldots\ldots$$

Перемножая же эти уравненія между собою, выводимъ

$$\left(\frac{\alpha}{A}\right)\left(\frac{\beta}{A}\right)\left(\frac{\gamma}{A}\right)\ldots\ldots\ldots = \left(\frac{\alpha\beta\gamma\ldots}{A}\right) = 1;$$

откуда замѣчая, что $\alpha\beta\gamma\ldots\ldots = p$, выводимъ

www.rcin.org.pl

$$\left(\frac{p}{A}\right) = 1;$$

что и слѣдовало доказать.

52. **Теорема**. *Если число A простое вида* $4n+1$ *и p дѣлитъ* x^2+Ay^2, то $\left(\frac{p}{A}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$, *т. е.* $\left(\frac{p}{A}\right) = 1$, *если* $p=4m+1$, и $\left(\frac{p}{A}\right) = -1$, *если* $p=4m+3$.

Доказательство. Если p есть дѣлитель x^2+Ay^2, то

$$x^2 + Ay^2 \equiv 0 \ (\textit{мод. } p).$$

и, слѣд., сравненіе

$$u^2 + A \equiv 0 \ (\textit{мод. } p)$$

имѣетъ рѣшеніе. А это, какъ видѣли, предполагаетъ

$$\left(\frac{-A}{\alpha}\right) = 1, \left(\frac{-A}{\beta}\right) = 1, \left(\frac{-A}{\gamma}\right) = 1, \ldots\ldots$$

гдѣ $\alpha, \beta, \gamma, \ldots\ldots$ суть простыя числа, входящія въ составъ p.

На основаніи свойствъ символа $\left(\frac{p}{p}\right)$, мы отсюда выведемъ значенія $\left(\frac{\alpha}{A}\right), \left(\frac{\beta}{A}\right), \left(\frac{\gamma}{A}\right), \ldots\ldots\ldots$

Такъ, для опредѣленія перваго выводимъ

$$\left(\frac{\alpha}{A}\right) = \left(\frac{A}{\alpha}\right)(-1)^{\frac{\alpha-1}{2}\cdot\frac{A-1}{2}} = \left(\frac{-A}{\alpha}\right)(-1)^{\frac{\alpha-1}{2}+\frac{\alpha-1}{2}\frac{A-1}{2}}$$

$$= \left(\frac{-A}{\alpha}\right)(-1)^{\frac{\alpha-1}{2}+\frac{A+1}{2}}$$

Внеся сюда величину $\left(\frac{-A}{\alpha}\right)$, которая по предыдущему есть 1, находимъ

$$\left(\frac{\alpha}{A}\right) = (-1)^{\frac{\alpha-1}{2}\cdot\frac{A+1}{2}}.$$

Но A вида $4n+1$, вслѣдствіе чего $(-1)^{\frac{\alpha-1}{2}\cdot\frac{A+1}{2}}$ равно $(-1)^{\frac{\alpha-1}{2}\cdot\frac{4n+2}{2}}$ или $(-1)^{\frac{\alpha-1}{2}(2n+1)}$, а это равно $(-1)^{\frac{\alpha-1}{2}}$:

www.rcin.org.pl

ибо $(-1)^{\frac{\alpha-1}{2}\cdot 2n}$ есть 1. Поэтому, величина $\left(\frac{\alpha}{A}\right)$ опредѣлится такимъ уравненіемъ

$$\left(\frac{\alpha}{A}\right)=(-1)^{\frac{\alpha-1}{2}}.$$

Подобнымъ образомъ выводимъ

$$\left(\frac{\beta}{A}\right)=(-1)^{\frac{\beta-1}{2}},\ \left(\frac{\gamma}{A}\right)=(-1)^{\frac{\gamma-1}{2}},\ \ldots\ldots$$

Перемножая же всѣ эти уравненія, имѣемъ

$$\left(\frac{\alpha}{A}\right)\left(\frac{\beta}{A}\right)\left(\frac{\gamma}{A}\right)\ldots\ldots=(-1)^{\frac{\alpha-1}{2}+\frac{\beta-1}{2}+\frac{\gamma-1}{2}+\ldots\ldots},$$

или

$$\left(\frac{\alpha\beta\gamma\ldots\ldots}{A}\right)=(-1)^{\frac{\alpha-1}{2}+\frac{\beta-1}{2}+\frac{\gamma-1}{2}+\ldots\ldots},$$

гдѣ, замѣнивъ $\alpha\beta\gamma\ldots\ldots$ чрезъ p, находимъ

$$\left(\frac{p}{A}\right)=(-1)^{\frac{\alpha-1}{2}+\frac{\beta-1}{2}+\frac{\gamma-1}{2}+\ldots\ldots}$$

Но нетрудно убѣдиться, что $\frac{p-1}{2}$ и

$$-\frac{\alpha-1}{2}+\frac{\beta-1}{2}+\frac{p-1}{2}+\ldots\ldots$$

разнятся между собою числомъ четнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, мы видѣли, что $p=\alpha\beta\gamma\ldots\ldots$, а потому $\frac{p-1}{2}$ равно $\frac{\alpha\beta\gamma\ldots-1}{2}$, что иначе представится такъ

$$\frac{-1+\left(1+2\frac{\alpha-1}{2}\right)\left(1+2\frac{\beta-1}{2}\right)\left(1+2\frac{\gamma-1}{p}\right)\ldots\ldots}{2}$$

Раскрывая же здѣсь скобки и откидывая члены, имѣющіе множителемъ 2, находимъ

$$\frac{\alpha-1}{p}+\frac{\beta-1}{2}+\frac{\gamma-1}{2}+\ldots\ldots$$

www.rcin.org.pl

Итакъ, это число съ $\frac{p-1}{2}$ разнится только числомъ четнымъ, а потому

$$(-1)^{\frac{\alpha-1}{2}+\frac{\beta-1}{2}+\frac{\gamma-1}{2}+\cdots} = (-1)^{\frac{p-1}{2}};$$

вслѣдствіе чего найденное нами выражаніе $\left(\frac{p}{A}\right)$ приводится къ такому

$$\left(\frac{p}{A}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}},$$

что и слѣдовало доказать.

53. **Теорема.** *Если A простое число вида $4n+1$ и нечетный дѣлитель формы x^2-Ay^2, то* $\left(\frac{p}{A}\right) = 1$.

Доказательство. Если p дѣлитъ x^2-Ay^2, то

$$x^2 - Ay^2 \equiv 0 \ (\textit{мод. } p).$$

Это сравненіе предполагаетъ такое

$$u^2 - A \equiv 0 \ (\textit{мод. } p),$$

а отсюда выходитъ

$$\left(\frac{A}{\alpha}\right) = 1, \left(\frac{A}{\beta}\right) = 1, \left(\frac{A}{\gamma}\right) = 1, \ldots\ldots$$

гдѣ $\alpha, \beta, \gamma, \ldots\ldots$ простыя числа, входящія въ составъ p. Опредѣляя по первому изъ этихъ уравненій значеніе $\left(\frac{\alpha}{A}\right)$, находимъ

$$\left(\frac{\alpha}{A}\right) = \left(\frac{A}{\alpha}\right)(=1)^{\frac{\alpha-1}{2}\frac{A-1}{2}} = (-1)^{\frac{\alpha-1}{2}\frac{A-1}{2}},$$

что приводится къ равенству

$$\left(\frac{\alpha}{A}\right) = 1;$$

потому что $A = 4n+1$, и слѣд. $\frac{A-1}{2}$ равно четному числу $2n$.

Подобнымъ образомъ находимъ

$$\left(\frac{\beta}{A}\right) = 1, \left(\frac{\gamma}{A}\right) = 1, \ldots\ldots$$

www.rcin.org.pl

Перемножая же всѣ эти уравненія между собою, найдемъ

$$\left(\frac{\alpha\beta\gamma.....}{A}\right) = 1.$$

Но здѣсь произведеніе $\alpha\beta\gamma.....$, равно p; слѣд.

$$\left(\frac{p}{A}\right) = 1;$$

въ чемъ и заключается предложенная теорема.

54. **Теорема**. *Если A простое число вида $4n+3$ и p нечетный дѣлитель формы $x^2 - Ay^2$, то* $\left(\frac{p}{A}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$, *т. е.* $\left(\frac{p}{A}\right) = 1$, *если p вида $4m+1$, и* $\left(\frac{p}{A}\right) = -1$, *если p вида $4m+3$.*

Доказательство. Дѣлимость $x^2 - Ay^2$ на p предполагаетъ сравненіе

$$x^2 - Ay^2 \equiv 0 \ (\text{мод. } p),$$

а это предполагаетъ сравненіе

$$u^2 - A \equiv 0 \ (\text{мод. } p),$$

и, слѣд. уравненія

$$\left(\frac{A}{\alpha}\right) = 1, \left(\frac{A}{\beta}\right) = 1, \left(\frac{A}{\gamma}\right) = 1, ...$$

гдѣ $\alpha, \beta, \gamma, ...$ простыя числа, входящія въ составъ p. Опредѣляя по этимъ уравненіямъ $\left(\frac{\alpha}{A}\right)$, находимъ

$$\left(\frac{\alpha}{A}\right) = \left(\frac{A}{\alpha}\right)(-1)^{\frac{\alpha-1}{2}\frac{A-1}{2}} = (-1)^{\frac{\alpha-1}{2}\frac{A-1}{2}},$$

и, слѣд.,

$$\left(\frac{\alpha}{A}\right) = (-1)^{\frac{\alpha-1}{2}};$$

потому что $(-1)^{\frac{\alpha-1}{2}\frac{A-1}{2}}$ для $A = 4n+3$ приводится къ

www.rcin.org.pl

$(-1)^{\frac{\alpha-1}{2}2n+\frac{\alpha-1}{2}}$, гдѣ $(-1)^{\frac{\alpha-1}{2}2n}$ равно 1.

Подобнымъ образомъ находимъ

$$\left(\frac{\beta}{A}\right)=(-1)^{\frac{\beta-1}{2}},\ \left(\frac{\gamma}{A}\right)=(-1)^{\frac{\gamma-1}{2}},\ldots\ldots$$

Перемножая же эти уравненія между собою, имѣемъ

$$\left(\frac{\alpha}{A}\right)\left(\frac{\beta}{A}\right)\left(\frac{\gamma}{A}\right)\ldots\ldots=(-1)^{\frac{\alpha-1}{2}+\frac{\beta-1}{2}+\frac{\gamma-1}{2}+\ldots\ldots}$$

и, слѣд.,

$$\left(\frac{p}{A}\right)=\left(\frac{\alpha\beta\gamma\ldots\ldots}{A}\right)=(-1)^{\frac{\alpha-1}{2}+\frac{\beta-1}{2}+\frac{\gamma-1}{2}+\ldots\ldots}$$

Но доказывая 52-ю теорему, нашли

$$(-1)^{\frac{\alpha-1}{2}+\frac{\beta-1}{2}+\frac{\gamma-1}{2}+\ldots\ldots}=(-1)^{\frac{p-1}{2}};$$

поэтому предыдущее уравненіе даетъ

$$\left(\frac{p}{A}\right)=(-1)^{\frac{p-1}{2}},$$

что и слѣдовало доказать.

§ 44. На основаніи доказанныхъ нами теоремъ, не трудно опредѣлить всѣ линейные дѣлители формъ вида $x^2\pm Ay^2$, при A простомъ нечетномъ. Мы видѣли, что нечетные дѣлители такихъ формъ опредѣляются или уравненіемъ

$$\left(\frac{p}{A}\right)=1,$$

или уравненіемъ

$$\left(\frac{P}{A}\right)=-1,$$

смотря потому, будетъ ли въ формѣ $x^2\pm Ay^2$ знакъ $+$, или $-$, будетъ ли A вида $4n+3$, или $4n+1$, и въ нѣкоторыхъ случаяхъ (см. 52 и 54, теоремы, будетъ ли искомое p вида $4m+1$, или $4m+3$.

www.rcin.org.pl

Но по способу, показанному нами въ § 28-мъ, мы легко найдемъ всѣ числа, удовлетворяющія уравненію $\left(\frac{p}{A}\right) = 1$ и $\left(\frac{p}{A}\right) = -1$. Рѣшенія перваго, какъ видѣли тамъ, опредѣляются уравненіями

$$p = a_1 + nA,\ p = a_2 + nA, \ldots\ p = a_{\frac{A-1}{2}} + nA,$$

гдѣ n произвольное число, $a_1,\ a_2, \ldots, a_{\frac{A-1}{2}}$ остатки отъ дѣленія $1^2\ 2^2, \ldots, \left(\frac{A-1}{2}\right)^2$ на A. Рѣшенія же втораго $\left(\frac{p}{A}\right) = -1$ опредѣляются уравненіями

$$p = b_1 + nA,\ p = b_2 + nA, \ldots,\ p = b_{\frac{A-1}{2}} + nA,$$

гдѣ $b_1, b_2, \ldots, b_{\frac{A-1}{2}}$ тѣ изъ чиселъ $1, 2 \ldots, A-1$, которыя неравны $a_1,\ a_2, \ldots,\ a_{\frac{A-1}{2}}$.

Теперь посмотримъ, какимъ образомъ каждая изъ этихъ формулъ можетъ служить для опредѣленія чиселъ вида $4m+1$ или $4m+3$.

Для того чтобы число p, опредѣляемое уравненіемъ

$$p = a + nA,$$

было вида $4m+1$, число n должно быть такого вида, чтобы сумма $a + nA$ привелась бы къ $4m+1$, другими словами, число n должно удовлетворять сравненію

$$a + nA \equiv 1 \pmod 4,$$

или

$$nA \equiv 1 - a \pmod 4.$$

Это сравненіе всегда будетъ имѣть одно рѣшеніе, потому что A нечетное число; рѣшая его по способу, показанному въ § 15, находимъ

$$n \equiv A\,(1-a)^{4\cdot\frac{2-1}{2}-1} \pmod 4,$$

www.rcin.org.pl

или

$$n \equiv A\ (1-a)\ (\textit{мод.}\ 4).$$

Этому сравненію будетъ удовлетворять одно изъ чиселъ 0, 1, 2, 3. Называя r то число, которое ему удовлетворяетъ, найдемъ

$$r \equiv A\ (1-a)\ (\textit{мод.}\ 4).$$

Вслѣдствіе чего, предыдущее сравненіе приводится къ такому

$$n \equiv r\ (\textit{мод.}\ 4),$$

откуда для выраженія n выходитъ

$$n = 4z + r.$$

Внося же эту величину n въ уравненіе

$$p = nA + a,$$

мы находимъ

$$p = 4Az + Ar + a$$

для выраженія чиселъ вида $4m+1$, опредѣляемыхъ уравненіемъ

$$p = nA + a.$$

Подобнымъ образомъ для чиселъ вида $4m+3$ мы найдемъ

$$p = 4Az + Ar' + a,$$

гдѣ r' наименьшее число, сравнимое съ $A\ (3-a)$ по модулю 4. Такъ, изъ уравненія

$$p = nA + a,$$

опредѣляющаго одно изъ рѣшеній уравненія

$$\left(\frac{p}{A}\right) = 1,$$

выводятся уравненія, которыя даютъ одни числа вида $4m+1$, или $4m+3$.

Не трудно также изъ уравненія

$$p = nA + a$$

вывести другое, которое будетъ давать вмѣстѣ и числа вида $4m+1$ и числа вида $4m+3$, слѣд., всѣ нечетныя числа. Для этаго мы должны будемъ найти видъ числа n, для котораго

www.rcin.org.pl

сумма $nA+a$ будетъ вида $2m+1$; или, что одно и тоже, найти рѣшеніе сравненія

$$nA+a \equiv 1 \ (\text{мод. } 2).$$

Но это сравненіе приводится къ такому

$$nA \equiv 1-a \ (\text{мод. } 2).$$

Если a число нечетное, ему удовлетворитъ $n=0$, слѣд., въ этомъ случаѣ его рѣшеніе будетъ

$$n \equiv 0 \ (\text{мод. } 2);$$

откуда для опредѣленія n выходитъ такое уравненіе

$$n=2z.$$

Если же n нечетное, то ему удовлетворитъ $n=1$ (ибо A число нечетное), и слѣд. рѣшеніе его будетъ

$$n=2z+1.$$

Внося эти значенія n въ уравненіе

$$p=nA+a,$$

мы находимъ для опредѣленія нечетныхъ чиселъ

$$p=2Az+a \text{ или } p=2Az+A+a,$$

смотря потому будетъ ли a число четное, или нечетное.

Поступая такимъ образомъ съ каждымъ изъ уравненій, опредѣляющихъ рѣшенія уравненій

$$\left(\frac{p}{A}\right)=1, \left(\frac{p}{A}\right)=-1,$$

мы найдемъ для выраженія нечетныхъ чиселъ, удовлетворяющихъ условію $\left(\frac{p}{A}\right)=1$, или $\left(\frac{p}{A}\right)=-1$, формулы вида $2Az+a$; для выраженія же однихъ чиселъ вида $4m+1$, или $4m+3$, мы будемъ имѣть формулы вида $4Az+a$. Этими-то формулами на основаніи доказанныхъ нами теоремъ и опредѣляются нечетные дѣлители квадратичной формы x^2+Ay^2.

Покажемъ это на примѣрахъ. Положимъ, что требуется найти видъ нечетныхъ дѣлителей квадратичной формы x^2+19y^2. Замѣчая что 19 есть число простое и вида $4n+3$, мы по

www.rcin.org.pl

теоремѣ 51 заключаемъ, что для нечетныхъ дѣлителей этой формы должно быть

$$\left(\frac{p}{19}\right) = 1.$$

Для опредѣленія чиселъ, удовлетворяющихъ этому уравненію мы дѣлимъ

$$1^2,\ 2^2,\ 3^2,\ 4^2,\ 5^2,\ 6^2,\ 7^2,\ 8^2,\ 9^2$$

на 19; находя въ остаткѣ

$$1,\ 4,\ 9,\ 16,\ 6,\ 17,\ 11,\ 7,\ 5,$$

мы заключаемъ, что p, удовлетворяющее уравненію $\left(\frac{p}{19}\right) = 1$, должно представиться какою либо изъ формулъ

$$19n+1,\ 19n+4,\ 19n+9,\ 19n+16,\ 19n+6,\ 19n+17,\ 19n+11,\ 16n+7,\ 19n+5.$$

Но чтобы эти формулы давали одни нечетныя числа, мы, по сказанному нами, формулу $19n+1$, въ которой первый членъ нечетный, замѣняемъ формулою $2.19z+1$, формулу $19n+4$, которой первый членъ четный, замѣняемъ формулою

$$2.19z+19+4, \text{ и т. д.}$$

Такимъ образомъ находимъ для нечетныхъ дѣлителей x^2+19y^2 слѣдующія формулы

$$2.19z+1,\ 2.19z+19+4,\ 2.19z+9,\ 2.19z+19+16,\ 2.19z+19+6,\ 2.19z+17,\ 2.19z+11,\ 2.19z+7,\ 2.19z+5,$$

которыя приводятся къ такому виду

$$38z+1,\ 38z+5,\ 38z+7,\ 38z+9,\ 38z+11,\ 38z+17,\ 38z+23,\ 38z+25,\ 38z+35.$$

Такъ опредѣляются всѣ числа, которыя могутъ дѣлить сумму x^2+19y^2 при x и y простыхъ между собою. Этимъ можно пользоваться при опредѣленіи дѣлителей данныхъ чиселъ, когда эти числа выражены формулою вида x^2+19y^2. Напр. пусть будетъ дано число 2021; такъ какъ оно равно $11^2+19.10^2$, то дѣлители его, если они есть, должны представиться какими либо изъ формулъ

www.rcin.org.pl

$38z+1$, $38z+5$, $38z+7$, $38z+9$, $38z+11$, $38z+17$, $38z+23$, $38z+25$, $38z+35$.

Но если 2021 имѣетъ дѣлителей, то по крайней мѣрѣ одинъ изъ этихъ дѣлителей меньше $\sqrt{2021}$, и, слѣд., меньше 45. Этого-то дѣлителя мы и будемъ отыскивать.

Первая формула $38z+1$ не даетъ его. Она при $z=0$ даетъ 1, при $z=1$ даетъ 39, что не можетъ дѣлить 2021, ибо это число не дѣлится на 3, а 39 въ составѣ своемъ содержитъ 3; при $z=2$ и болѣе 2 формула $38z+1$ даетъ числа, превосходящія 45.

Обращаемся ко второй формулѣ $38z+5$. При $z=0$ она даетъ 5, число, очевидно, не дѣлящее 2021, при $z=1$ она даетъ 43; и, пробуя дѣлить этимъ числомъ 2021, находимъ, что 43 есть дѣлитель 2021.

Для другаго примѣра, опредѣленія дѣлителей формъ вида $x^2 \mp Ay^2$ возьмемъ форму x^2-7y^2 и отыщемъ ея дѣлителей.

Такъ какъ число 7 вида $4n+3$, то по теоремѣ 54-й, дѣлители формы x^2-7y^2 вида $4m+1$ должны удовлетворять уравненію

$$\left(\frac{p}{7}\right)=1,$$

дѣлители же вида $4m+3$ должны удовлетворять уравненію

$$\left(\frac{p}{7}\right)=-1,$$

Опредѣлимъ же теперь числа вида $4m+1$, удовлетворяющія уравненію

$$\left(\frac{p}{7}\right)=1,$$

и числа вида $4m+3$, удовлетворяющія уравненію

$$\left(\frac{p}{7}\right)=-1.$$

Чтобы найти числа, удовлетворяющія уравненію

$$\left(\frac{p}{7}\right)=1,$$

мы дѣлимъ 1^2, 2^2, 3^2 на 7; находя въ остаткѣ 1, 4, 2, мы заключаемъ, что эти числа выражаются формулами:

www.rcin.org.pl

$$7n+1,\ 7n+4,\ 7n+2.$$

Посмотримъ же теперь, какъ выведутся изъ нихъ формулы, опредѣляющія однѣ числа вида $4m+1$.

По сказанному нами, изъ формулы $7n+1$ выходимъ

$$4.7z+7r+1,$$

гдѣ r то изъ чиселъ 0, 1, 2, 3, которое съ 7 (1—1), или 0 сравнимо по модулю 4. Это число есть 0. Слѣд., формула $7n+1$ для опредѣленія однихъ чиселъ вида $4m+1$ даетъ $4.7z+1$, или $28z+1$.

Поступая также съ формулами

$$7n+4,\ 7n+2,$$

мы изъ нихъ выводимъ $4.7z+7r+4$, $7z+7r'+2$, гдѣ r, r', суть тѣ изъ чиселъ 0, 1, 2, 3, которыя съ 7 (1—4), 7 (1—2) сравнимы по модулю 4. Но такія числа суть 3, 1. Слѣд., для опредѣленія однихъ чиселъ вида $4m+1$ формулы $7n+4$, $7n+2$ даютъ

$$4.7z+3.7+4,\ 4.7z+7+2,$$

или

$$28z+25,\ 28z+9.$$

Итакъ, всѣ числа вида $4m+1$, удовлетворяющія уравненію

$$\left(\frac{p}{7}\right)=1,$$

и, слѣд., способныя быть дѣлителями формы x^2-7y^2 опредѣляются формулами:

$$28z+1,\ 28z+9,\ 28z+25.$$

Переходимъ теперь къ дѣлителямъ вида $4m+3$. Они опредѣляются уравненіемъ

$$\left(\frac{p}{7}\right)=-1.$$

Чтобы найти рѣшенія этого уравненія, мы въ ряду 1, 2, 3, 4, 5, 6 выкидываемъ тѣ, которыя равны остаткамъ отъ дѣленія 1^2, 2^2, 3^2 на 7. Такимъ образомъ, находимъ числа 3, 5, 6, и заключаемъ, что числа, удовлетворяющія уравненію $\left(\frac{p}{7}\right)=-1$,

www.rcin.org.pl

опредѣляются формулами $7n+3$, $7n+5$, $7n+6$. Преобразовывая эти формулы въ такія, которыя даютъ одни числа вида $4m+3$, найдемъ

$$4.7z+7r+3,\ 4.7z+7r_1+5,\ 4.7z+7r_2+6,$$

гдѣ r, r_1, r_2 тѣ изъ чиселъ 0, 1, 2, 3, которыя сравнимы съ 7 (3—3), 7 (3—5), 7 (3—6) по модулю 4. Замѣчая, что $r=0$, $r_1=2$, $r_2=3$, мы заключаемъ, что эти формулы суть

$$4.7z+7.0+3,\ 4.7z+7.2+5,\ 4.7z+7.3+6,$$

или

$$28z+3,\ 28z+19,\ 28z+27.$$

Итакъ, всѣ дѣлители формы x^2-7y^2 вида $4m+1$ опредѣлятся формулами

$$28z+1,\ 28z+9,\ 28z+25,$$

дѣлители же вида $4m+3$ суть

$$28z+3,\ 28z+19,\ 28z+27.$$

Мы показали, какъ опредѣляются дѣлители формы $x^2\pm Ay^2$ при A простомъ, отличномъ отъ 2; покажемъ теперь, какъ найдутся дѣлители этой формы, если A равно 2. Для этого мы докажемъ слѣдующую теорему:

55. **Теорема.** *Всѣ нечетные дѣлители* x^2+2y^2 *суть вида* $8m+1$ *или* $8m+3$; *всѣ нечетные дѣлители* x^2-2y^2 *суть вида* $8m+1$ *или* $8m-1$.

Доказательство. Если p дѣлитъ x^2+2y^2, то

$$x^2+2y^2\equiv 0\ (\mathit{мод.}\ p).$$

Но это сравненіе предполагаетъ возможность такого

$$u^2+2\equiv 0\ (\mathit{мод.}\ p),$$

и, слѣд., предполагаетъ уравненія

$$\left(\frac{-2}{\alpha}\right)=1,\left(\frac{-2}{\beta}\right)=1,\left(\frac{-2}{\gamma}\right)=1,\ldots..$$

гдѣ α, β, γ, простыя числа, входящія въ составъ p. Посмотримъ же, какого вида должны быть числа α, β, γ, ..., чтобы удовлетворялись эти уравненія.

По свойству символовъ $\left(\frac{q}{p}\right)$, мы находимъ

www.rcin.org.pl

$$\left(\frac{-2}{\alpha}\right) = \left(\frac{2}{\alpha}\right)(-1)^{\frac{\alpha-1}{2}}.$$

Но $\left(\frac{2}{\alpha}\right)$, какъ видѣли, опредѣляется такъ

$$\left(\frac{2}{\alpha}\right) = (-1)^{-\frac{\alpha^2-1}{8}};$$

слѣдовательно,

$$\left(\frac{-2}{\alpha}\right) = (-1)^{-\frac{\alpha^2-1}{8}+\frac{\alpha-1}{2}} = (-1)^{\frac{-\alpha^2+4\alpha-3}{8}}.$$

Дѣлая въ этомъ уравненіи послѣдовательно $\alpha = 8m+1$ $\alpha=8m+3$, $\alpha=8m+5$, $\alpha=8m+7$, находимъ

$$\left(\frac{-2}{8m+1}\right)=1, \left(\frac{-2}{8m+3}\right)=1, \left(\frac{-2}{8m+5}\right)=-1, \left(\frac{-2}{8m+7}\right)=-1.$$

Слѣд., для возможности уравненій

$$\left(\frac{-2}{\alpha}\right)=1, \left(\frac{-2}{\beta}\right)=1, \left(\frac{-2}{\gamma}\right)=1, \ldots\ldots$$

необходимо, чтобы числа α, β, γ, ... были вида $8m+1$, или $8m+3$. А потому p, равное $\alpha\beta\gamma\ldots$, должно быть произведеніемъ такого вида

$$(8m+1)(8m'+1)(8m''+1)\ldots(8m_1+3)(8m_2+3)\ldots(8m_\sigma+3).$$

Раскрывая же здѣсь скобки и собирая въ одинъ всѣ члены, имѣющіе множителемъ 8, находимъ, что

$$p=8P+3^\sigma.$$

Если σ число четное, $3^\sigma \equiv 1$ (*мод.* 8): ибо $3^2 \equiv 1$ (*мод.* 8). Если же σ число нечетное, то сравненіе $3^2 \equiv 1$ (*мод.* 8), по возведеніи обѣихъ частей въ степень $\frac{\sigma-1}{2}$ и умноженіи на 3, дастъ $3^\sigma \equiv 3$ (*мод.* 8). Итакъ, 3^σ по модулю 8 сравнимо или съ 1, или съ 3. Откуда слѣдуетъ, что 3^σ или вида $8N+1$, или $8N+3$, а потому число p, опредѣляемое уравненіемъ

$$p=8P+3^\sigma,$$

будетъ или равно $8(P+N)+1$, или $8(P+N)+3$, въ чемъ

www.rcin.org.pl

и заключается первая часть предложенной нами теоремы. Переходимъ теперь къ доказательству второй части ея.

Если p дѣлитель формы x^2-2y^2, то

$$x^2-2y^2 \equiv 0 \ (\text{мод. } p).$$

Это же сравненіе предполагаетъ возможность сравненія

$$u^2-2 \equiv 0 \ (\text{мод. } p),$$

и, слѣд., уравненія

$$\left(\frac{2}{\alpha}\right)=1, \left(\frac{2}{\beta}\right)=1, \left(\frac{2}{\gamma}\right)=1, \ldots\ldots$$

гдѣ $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$ простыя числа, входящія въ составъ p. Но, по теоремѣ 32, изъ этихъ уравненій слѣдуетъ, что $\alpha, \beta, \gamma, \ldots\ldots$ суть числа вида $8m+1$, или $8m-1$, а потому произведеніе ихъ $\alpha\beta\gamma\ldots\ldots$, равное p, представится такъ

$$(8m'+1)\ (8m''+1)\ldots\ldots\ (8m_1-1)\ (8m_2-1)\ldots\ldots$$

Но въ разложеніи этаго произведенія, кромѣ членовъ кратныхъ 8, будетъ или $+1$, или -1. Слѣд., p должно быть вида $8m+1$, или $8m-1$, что и слѣдовало доказать.

Показавши, какъ опредѣляются линейные дѣлители формы $x^2 \pm Ay^2$, при A простомъ нечетномъ и $A=2$, намъ остается тоже сдѣлать для этихъ формъ при A составномъ. Но въ этомъ случаѣ линейные дѣлители $x^2 \pm Ay^2$ удобнѣе всего выводятся изъ квадратичныхъ дѣлителей, къ нимъ мы теперь и обращаемся.

§ 45. Выраженіе вида $au^2+2buv+cv^2$, гдѣ a, b, c опредѣленныя числа, u, v неопредѣленныя, мы называемъ квадратичною формою. Двѣ квадратичныя формы $au^2+2buv+cv^2$ $a'u^2+2b'uv+c'v^2$, которыя способны выражать однѣ и тѣже числа, мы будемъ называть тождественными и будемъ замѣнять одну другою. Такъ, формы $au^2+2buv+cv^2$, $au^2-2buv+cv^2$, различающіяся только знакомъ коефиціента uv суть тождественныя: ибо значенія первой при $u=\alpha$, $v=\beta$ равны значеніямъ второй при $u=-\alpha$, $v=\beta$.

Изъ этого видно, что знакъ коеффиціента b въ формѣ $au^2+2buv+cv^2$ можетъ быть всегда перемѣненъ и, слѣд.,

www.rcin.org.pl

этотъ коеффиціентъ можетъ быть обращенъ въ количество положительное: такимъ мы его и будемъ всегда предполагать.

Число равное b^2-ac мы будемъ называть *опредѣлителемъ* формы $au^2+2buv+cv^2$. Такъ, опредѣлитель формы $3u^2+10uv+7v^2$ будетъ $5^2-3.7$, или 4; опредѣлитель формы $3u^2+10uv-7v^2$ будетъ $5^2+3.7$, или 46.

Двѣ формы, имѣющія разныхъ опредѣлителей, мы будемъ называть *подобными*. Такъ, формы $3u^2+10uv+7v^2$, $3u^2+2uv-v^2$ подобны: ибо какъ опредѣлитель первой $5^2-3.7$, такъ и опредѣлитель второй $1^2+1^2.3$ равны 4.

Согласившись въ этихъ названіяхъ, мы докажемъ слѣдующую теорему, весьма важную по своимъ приложеніямъ.

56. **Теорема.** *Если въ формѣ* $au^2+2buv+cv^2$ *коеффиціентъ* $2b$ *превосходитъ* a *или* c, *то эта форма можетъ быть преобразована въ другую* $a'u^2+2b'uv+c'v^2$, *подобную* $au^2+2buv+cv^2$, *гдѣ* $2b'$ *не будетъ превосходить ни* a', *ни* c'. (*)

Доказательство. Для доказательства этой теоремы мы покажемъ, какимъ образомъ при $2b>a$, или $2b>c$ форма $au^2+2buv+cv^2$ можетъ быть преобразована въ другую $a_0u^2+2b_0uv+c_0v^2$, подобную первой, гдѣ численная величина b_0 меньше b. Но такъ какъ уменьшеніе численной величины коеффиціента b не можетъ итти далѣе нуля, то мы необходимо дойдемъ до такой формы $a'u^2+2b'uv+c'v^2$, гдѣ дальнѣйшее уменьшеніе коеффиціента b' не можетъ имѣть мѣста и слѣд. $2b'$ не $>a'$ и не $>c'$.

Чтобы преобразовать форму $au^2+2buv+cv^2$ въ другую $a_0u^2+2b_0uv+c_0v^2$, гдѣ бы b_0 было меньше b, пусть будетъ a наименьшее изъ двухъ чиселъ a и c (въ случаѣ равенства ихъ мы можемъ взять то или другое безъ различія) и цѣлое, число, которое разнится съ $\frac{b}{a}$ не болѣе какъ $\frac{1}{2}$, пусть будетъ m: очевидно, m будетъ цѣлое число, получаемое при дѣленіи b на a, если остатокъ не превосходитъ $\frac{1}{2}a$; въ против-

(*) Здѣсь мы разумѣемъ численную величину a, b, c, a', b', c', не обращая вниманія на знаки этихъ количествъ.

www.rcin.org.pl

номъ случаѣ, m будетъ цѣлое число, получаемое при дѣленіи b на a и сложенное съ 1. Полагаемъ $u + mv = U$, и на основаніи этого уравненія исключаемъ u изъ формы $au^2 + 2buv + cv^2$. Такимъ образомъ находимъ

$$a(U^2 - mv)^2 + 2b\ (U - mv)\ v + cv^2,$$

или

$$aU^2 + 2\ (b - am)\ Uv + (c^2 - bm + am^2)\ v^2..$$

Не трудно убѣдиться, что эта форма подобна $au^2 + 2buv + cv^2$, и что въ ней коеффиціентомъ Uv меньше $2b$. Въ самомъ дѣлѣ, опредѣлитель этой формы есть

$$(b - am)^2 - a\ (c - 2bm + am^2)$$

что приводится, по раскрытіи скобокъ, къ $b^2 - ac$, а это есть опредѣлитель формы $au^2 + 2buv + cv^2$.

Съ другой стороны, такъ какъ m выбрано нами подъ условіемъ, чтобы разность $\frac{b}{a} - m$ была числомъ, не превосходящимъ $\frac{1}{2}$, то $2\ (b - am) = 2a\left(\frac{b}{a} - m\right)$ будетъ число, непревосходящее a и потому меньшее $2b$: ибо мы разсматриваемъ форму $au^2 + 2buv + cv^2$, гдѣ $2b$ превосходитъ одно изъ чиселъ a и c притомъ a или равно c, или меньше c.

Слѣд., въ полученной нами формѣ

$$aU^2 + 2\ (b - am)\ Uv + (a - 2bm + cm^2)\ v^2$$

коеффиціентъ средняго члена меньше соотвѣтствующаго ему въ формѣ $au + 2buv + cv^2$.

Если въ полученной нами формѣ этотъ коеффиціентъ превосходитъ одинъ изъ коеффиціентовъ крайнихъ членовъ, то мы ее снова будемъ также преобразовывать, какъ преобразовывали $au^2 + 2buv + cv^2$ и будемъ повторять это преобразованіе до тѣхъ поръ, пока получимъ форму, гдѣ такое преобразованіе невозможно и, слѣд., средній коеффиціентъ не превосходитъ ни одного изъ крайнихъ. Напр., пусть будетъ дана форма $3u^2 + 10uv + 6v^2$. Для преобразованія ея ищемъ цѣлое число, которое бы съ $\frac{5}{3}$ разнилось не болѣе какъ на $\frac{1}{2}$, и такъ какъ это число есть

www.rcin.org.pl

2, то дѣлаемъ $u + 2v = U$. Внося отсюда величину u въ данную форму, находимъ

$$3\ (U-2v)^2+10\ (U-2v)\ v+6v^2,$$

что, по раскрытіи скобокъ, приводится къ такой формѣ

$$3\ U^2-2Uv-2v^2.$$

Въ этой формѣ средній коеффиціентъ не превосходитъ ни одного изъ крайнихъ; въ противномъ случаѣ, мы бы стали ее снова преобразовывать.

Изъ доказанной нами теоремы мы выводимъ слѣдующія:

57. **Теорема.** *Если опредѣлитель формы* $au^2+2buv+cv^2$ *есть положительное число* D, *то она можетъ быть приведена къ виду* $a_1u^2+2b_1uv-c_1v^2$, *гдѣ* $a_1c_1+b_1^2=D$, *числа* a_1, c_1 *положительныя, которыя не меньше* $2b$, *и* b *не превосходитъ* $\sqrt{\frac{D}{5}}$.

Доказательство. Въ самомъ дѣлѣ, по предыдущей теоремѣ, форма $au^2+2buv+cv^2$ преобразовывается въ форму

$$a_1u^2+2b_1uv+c_0v^2.$$

гдѣ $2b_1$ не превосходитъ численной величины ни a_1, ни c_0; притомъ въ этой формѣ, какъ подобной $au^2+2buv+cv^2$, опредѣлитель будетъ имѣть ту же величину D, и, слѣд., будетъ $b_1^2-a_1c_0=D$. Но при $D>0$ это уравненіе предполагаетъ разность $b_1^2-a_1c_0$ количествомъ положительнымъ, что не можетъ быть, если a_1 и c_0 имѣютъ одинакіе знаки: ибо тогда произведеніе $a_1\ c_0$ будетъ количествомъ положительнымъ, превосходящимъ b_1^2, потому что численныя величины a_1 и c_0 не меньше $2b$. Итакъ, въ формѣ $a_1u^2+2b_1uv+c_0v^2$ крайніе члены съ противными знаками. Положимъ же, что членъ a_1u^2 есть тотъ изъ крайнихъ, который имѣетъ знакъ $+$, а членъ c_0v^2 есть тотъ, который съ $-$. Называя черезъ c_1 численную величину c_0 мы будемъ имѣть $c_0=-c_1$; вслѣдствіе чего форма

$$a_1u^2+2b_1uv+c_0v^2$$

и уравненіе $b_1^2-a_1\ c_0=D$ измѣнятся въ такія:

www.rcin.org.pl

$$a_1u^2+2b_1uv-c_1v^2,\ b^2_1+a_1c_1=D.$$

Но по свойству коеффиціентовъ этой формы будетъ

$$a_1 \text{ не } < 2b_1,\ c_1 \text{ не } < 2b_1;$$

вслѣдствіе чего изъ уравненія

$$b_1{}^2+a_1c_1=D$$

выходитъ

$$D \text{ не } < b_1{}^2+2b_1.\ 2b_1, \text{ не } < 5b_1{}^2,$$

а потому

$$b_1 \text{ не } > \sqrt{\frac{D}{5}}.$$

Вотъ условіе, которому вмѣстѣ съ условіями

$$b_1{}^2+a_1c_1=D,\ a_1 \text{ не } < 2b_1,\ c_1 \text{ не } < 2b_1$$

будутъ удовлетворять коеффиціенты формы

$$a_1u^2+2b_1uv-c_1v^2,$$

выведенной нами изъ данной

$$au^2+2buv+cv^2.$$

Такъ убѣждаемся въ справедливости предложенной нами теоремы.

58. **Теорема.** *Если опредѣлитель формы* $au^2+2buv+cv^2$ *есть число отрицательное—*D, *то она можетъ быть приведена къ виду* $a_1u^2+2b_1uv+c_1v^2$, *гдѣ* $a_1c_1-b_1{}^2=D$, *количества* a_1 *и* c_1 *съ одинакими знаками и не меньше* $2b_1$; *притомъ,* b_1 *не превосходитъ* $\sqrt{\frac{D}{3}}$.

Доказательство. Мы видѣли, что форма $au^2+2buv+cv^2$ можетъ быть приведена къ виду $a_1u^2+2b_1\ uv+c_1v^2$, гдѣ $2b_1$ не превосходитъ ни a_1, ни c_1; притомъ, въ этой формѣ, какъ подобной $au^2+2buv+cv^2$, опредѣлитель будетъ имѣть ту-же величину—D, и, слѣд., $b_1{}^2-a_1c_1=-D$.

Но это уравненіе гдѣ D число положительное, предполагаетъ одинакіе знаки въ количествахъ a_1, c_1. Притомъ, замѣчая, что a_1 и c_1 не меньше $2b_1$, мы изъ этого уравненія выводимъ

www.rcin.org.pl

$$2b_1 . 2b_1 - b_1^2 \text{ не} > D,$$

или

$$3b_1^2 \text{ не} > D,$$

и, слѣд., b_1 не $> \sqrt{\frac{D}{3}}$.

Доказавши эту теорему, замѣтимъ, что въ разсматриваемомъ нами случаѣ форма $a_1u^2 + 2b_1uv + c_1v^2$ можетъ представлять положительныя числа только въ случаѣ a_1 положительнаго. Въ самомъ дѣлѣ, выраженіе $a_1u^2 + 2b_1uv + c_1v^2$ можетъ быть такъ представлено

$$a_1\left(u^2 + 2\frac{b_1}{a_1}uv + \frac{c_1}{a_1}v^2\right),$$

а это равняется

$$a_1\left[(u + \frac{b_1}{a_1}v)^2 + \frac{a_1c_1 - b_1^2}{a_1^2}v^2\right],$$

и вслѣдствіе уравненія $b_1^2 - a_1c_1 = -D$ приводится къ

$$a_1\left[(u + \frac{b_1}{a_1}v)^2 + \frac{D}{a_1^2}v^2\right]$$

что въ случаѣ a_1 отрицательнаго не можетъ имѣть значенія положительнаго: ибо $D > 0$, и квадраты $\left(u + \frac{b_1}{a_1}v\right)^2, \left(\frac{v}{a_1}\right)^2$ не могутъ имѣть значенія отрицательнаго.

§ 46. Показавши свойства квадратичныхъ формъ, необходимыя намъ впослѣдствіи, обращаемся опять къ дѣлителямъ формъ вида $x^2 \pm Ay^2$, и докажемъ слѣдующую теорему:

59. **Теорема.** *Всякій дѣлитель формы $x^2 - dy^2$ можетъ быть представленъ квадратичною формою, имѣющею опредѣлителемъ d.*

Доказательство. Пусть будетъ p дѣлитель формы $x^2 - dy^2$ и P частное отъ дѣленія $x^2 - dy^2$ на P; приравнивая дѣлимое произведенію дѣлителя на частное, имѣемъ

$$x^2 - dy^2 = pP.$$

Здѣсь y и P должны быть числа относительно другъ друга простыя: ибо, по этому уравненію, простое число, дѣлящее y и P, дѣлитъ x^2 и слѣд. x, что невозможно; ибо въ формѣ $x^2 - dy^2$ мы

www.rcin.org.pl

всегда предполагаемъ x и y неимѣющими общаго дѣлителя. Но при y простомъ съ P сравненіе

$$yt \equiv x \ (\text{мод. } P)$$

имѣетъ рѣшеніе, и, слѣд., найдется число t, для котораго разность $yt-x$ раздѣлится на P. Полагая же частное отъ дѣленія $yt-x$ на P равнымъ u, имѣемъ

$$\frac{yt-x}{P} = u;$$

откуда выходитъ

$$x=yt-uP.$$

Внося это выраженіе x въ уравненіе

$$x^2-dy^2=pP,$$

найдемъ

$$(yt-uP)^2-dy^2=pP,$$

или

$$P^2u^2-2\,Pytu+(t^2-d)\,y^2=pP.$$

Это уравненіе, по сокращеніи на P, даетъ

$$p=Pu^2-2ytu+\frac{t^2-d}{P}y^2,$$

гдѣ t^2-d раздѣлится на P: ибо это уравненіе предполагаетъ дѣлимость $(t^2-d)\,y^2$ на P, а y число простое съ P. Изъ этого уравненія мы видимъ, что p выражается квадратичною формою

$$p=Pu^2-2ytu+\frac{t^2-d}{P}y^2,$$

которой коеффиціенты суть P, $-2t$, $\frac{t^2-d}{P}$ и, слѣд., опредѣлитель ея равенъ $t^2-P.\frac{t^2-d}{P}$, или d, что и слѣдовало доказать.

Изъ этой теоремы, въ совокупности съ показанными нами свойствами квадратичныхъ формъ, легко вывести слѣдующія теоремы:

60. **Теорема.** *Дѣлитель x^2-Dy^2 при $D>0$ можетъ быть представленъ формою $au^2+2buv-cv^2$, гдѣ $ac+b^2=D$, числа a и c положительныя, не меньше $2b$, и b не превосходитъ $\sqrt{\frac{D}{5}}$.*

www.rcin.org.pl

Доказательство. По предыдущей теоремѣ всякій дѣлитель формы $x^2 - Dy^2$ можетъ быть представленъ формою

$$au^2 + 2bu + cv^2,$$

въ которой опредѣлитель $b^2 - ac$ будетъ равенъ D. Но такая форма, по теоремѣ 57-й, можетъ быть приведена къ виду

$$au^2 + 2buv - cv^2,$$

гдѣ a, b, c удовлетворяютъ уравненію $ac + b^2 = D$, числа a, c положительныя, которыя не меньше $2b$; число b не превосходитъ $\sqrt{\frac{D}{5}}$; откуда и слѣдуетъ предложенная нами теорема.

61. **Теорема.** *$z^2 + Dy^2$ при $D > 0$ можетъ быть представленъ формою $au^2 + 2buv + cv^2$, гдѣ $ac - b^2 = D$, числа a, c положительныя, не меньше $2b$, и b не превосходитъ $\sqrt{\frac{D}{3}}$.*

Доказательство. По теоремѣ 59-й, дѣлитель $x^2 + Dy^2$ представится формою

$$au^2 + 2buv + cv^2$$

которой опредѣлитель будетъ $-D$. Но такая форма, по теоремѣ 58 й, приводится къ виду

$$au^2 + 2buv + cv^2,$$

гдѣ $ac - b^2 = D$, численная величина a, c не меньше $2b$, и b не превосходитъ $\sqrt{\frac{D}{3}}$. Притомъ, a и c будутъ имѣть одинъ знакъ который здѣсь не можетъ быть —; ибо видѣли въ концѣ предыдущаго параграфа, что въ этомъ случаѣ формула $au^2 + 2buv + cv^2$ не можетъ имѣть значеній положительныхъ.

Такъ убѣждаемся въ справедливости предложенной нами теоремы.

На основаніи доказанныхъ нами теоремъ можно показать, какими квадратичными формами выражаются всѣ дѣлители данной формы вида $x^2 \pm Dy^2$.

Покажемъ это на примѣрахъ.

www.rcin.org.pl

Пусть будетъ дана форма x^2+y^2. По теоремѣ 61-й, дѣлители ея будутъ представляться формами

$$au^2+2buv+cv^2,$$

гдѣ $ac-b^2=1$, a и c положительныя числа, не меньше $2b$, и b не превосходитъ $\sqrt{\frac{1}{3}}$. Но изъ послѣдняго слѣдуетъ, что $b=0$; уравненіе же $ac-b^2=1$ при $b=0$ даетъ $ac=1$; откуда для значеній a и c, которыя должны быть >0, находитъ

$$a=1,\ c=1.$$

Изъ этого мы заключаемъ, что всѣ дѣлители формы x^2+y^2 представляются формою u^2+v^2.

На основаніи этой же теоремы дѣлители x^2+2y^2 будутъ представляться формами

$$au^2+2buv+cv^2,$$

въ которыхъ $ac-b^2=2$, a и c числа положительныя не меньше $2b$, и b не $>\sqrt{\frac{2}{3}}$.

Но изъ условія b не $>\sqrt{\frac{2}{3}}$ слѣдуетъ, что $b=0$; послѣ того изъ уравненія, $ac-b^2=2$ выводимъ $ac=2$. Но такъ какъ a и c должны быть числа положительныя, то это уравненіе предполагаетъ одно изъ двухъ, или $a=2$, $c=1$ или $a=1$, $c=2$. Первому предположенію соотвѣтствуетъ форма $2u^2+v^2$, второму u^2+2v^2.

Но эти формы тождественны между собою; слѣд., всѣ дѣлители x^2+2y^2 представятся одною формою $2u^2+v^2$.

Подобнымъ образомъ найдемъ, что дѣлители x^2-y^2 представляются формою u^2-v^2, дѣлители x^2-2y^2 представляются формою u^2-2v^2, или $2u^2-v^2$, дѣлители x^2-3y^2 представляются формами $3u^2-v^2$, u^2-3v^2.

Для примѣра болѣе сложныхъ формъ возьмемъ x^2-21y^2.

По теоремѣ 60-й, дѣлители этой формы будутъ представляться квадратичными формами

www.rcin.org.pl

$$au^2+2buv-cv^2,$$

въ которыхъ

$$b \text{ не } > \sqrt{\frac{21}{5}},\ ac+b^2=21.$$

Первое намъ опредѣляетъ всѣ возможныя величины b; изъ него мы заключаемъ, что b можетъ имѣть только значенія

$$0,\ 1,\ 2.$$

Предполагая b послѣдовательно равнымъ всѣмъ эти числамъ, мы изъ уравненія $ac+b^2=21$, обращая вниманіе на то, что a и c болѣе 0 и не менѣе $2b$, найдемъ всѣ значенія, которыя могутъ имѣть a, b, c въ формѣ $au^2+2buv-cv^2$, опредѣляющей дѣлителей x^2-21y^2. Такъ, дѣлая $b=0$, найдемъ $ac=21$, что можетъ быть удовлетворено только предположеніями

$$a=1,\ c=21;\ a=3,\ c=7;\ a=7,\ c=3;\ c=21,\ a=1,$$

которыя всѣ удовлетворяютъ условію: a и $c > 0$ и не $< 2b$, гдѣ $b=0$.

Дѣлая $b=1$; найдемъ $ac+1=21$; откуда $ac=20$, и это приводитъ насъ къ предположеніямъ

$a=1$	$a=2$	$a=4$	$a=5$	$a=10$	$a=20$
$c=20$	$c=10$	$c=5$	$c=4$	$c=2$	$c=1$.

Но первое и послѣднее не удовлетворяютъ условію: a и c не $< 2b$: ибо $b=1$.

Итакъ, для $b=1$ будетъ одно изъ четырехъ

$$a=2,\ c=10;\ a=4,\ c=5;\ a=5,\ c=4;\ a=10,\ c=2.$$

Наконецъ, для $b=2$ находимъ $ac+4=21$; откуда $ac=17$, и, слѣд., одно изъ двухъ

$$a=1,\ c=17;\ a=17,\ c=1.$$

Но оба эти случая невозможны: ибо $2b$, будучи здѣсь равно 4, въ первомъ предположеніи превосходитъ a, во второмъ — c.

www.rcin.org.pl

Итакъ, всѣ дѣлители $x^2 - 17y^2$ должны представляться формами

$$u^2-21v^2,\ 3u^2-7v^2,\ 7u^2-3v^2,\ 21u^2-v^2,\ 2u^2+2uv-10v^2,\ 4u^2+2uv-5v^2,$$
$$5u^2+2uv-4v^2,\ 10u^2+2uv-2v^2.$$

Но формы $2u^2+2uv-10v^2$, $10u^2+2uv-2v^2$ даютъ однѣ числа четныя; слѣд., всѣ нечетные дѣлители x^2-21y^2 будутъ представляться формами:

$$u^2-21v^2,\ 3u^2-7v^2,\ 7u^2-3v^2,\ 21u^2-v^2,\ 4u^2+2uv-5v^2,\ 5u^2+2uv-4v^2.$$

Для другаго примѣра, возьмемъ форму x^2+26y^2. По теоремѣ 61-й, дѣлители ея представятся формами

$$au^2+2buv+cv^2,$$

гдѣ

$$b \text{ не} > \sqrt{\frac{26}{3}},\ ac-b^2=26,\ a \text{ и } c \text{ не} < 2b.$$

Первое неравенство предполагаетъ b однимъ изъ трехъ чиселъ

$$0,\ 1,\ 2.$$

Дѣлая $b=0$, мы для опредѣленія a и c находимъ условія

$$ac=26,\ a \text{ и } c \text{ не} < 0.$$

Эти условія приводятъ насъ къ предположеніямъ

$a=1$	$a=2$	$a=13$	$a=26$
$c=26$	$c=13$	$c=2$	$c=1$.

Дѣлая $b=1$, мы находимъ

$$ac=27, a \text{ и } c \text{ не} < 2.$$

Уравненію $ac=27$ удовлетворяютъ

$a=1$	$a=3$	$a=9$	$a=27$
$c=27$	$c=9$	$c=3$	$c=1$.

Но изъ этихъ величинъ a и c условію

$$a \text{ не} < 2,\ c \text{ не} < 2$$

удовлетворяютъ только

www.rcin.org.pl

$$a = 3,\ c = 9;\ a = 9,\ c = 3$$

Наконецъ для $b = 2$ находимъ

$$ac = 30,\ a \text{ и } c \text{ не} < 4.$$

Уравненію $ac = 30$ мы удовлетворяемъ предположеніями

$a = 1$	$a = 2$	$a = 3$	$a = 5$	$a = 6$	$a = 10$	$a = 15$	$a = 30$
$c = 30$	$c = 15$	$c = 10$	$c = 6$	$c = 5$	$c = 3$	$c = 2$	$c = 1.$

Но изъ нихъ условію

$$a \text{ не} < 4,\ c \text{ не} < 4$$

удовлетворяютъ только

$$a = 5,\ c = 6;\ a = 6,\ c = 5$$

Отсюда для дѣлителей $x^2 + 26y^2$ выходятъ слѣдующія формы

$$u^2 + 26v^2,\ 2u^2 + 13v^2,\ 13u^2 + 2v^2,\ 26u^2 + v^2,\ 3u^2 + 2uv + 9v^2,$$
$$9u^2 + 2uv + 3v^2,\ 5u^2 + 4uv + 6v^2,\ 6u^2 + 4uv + 5v^2.$$

Замѣчая, что здѣсь $u^2 + 26v^2$ тождественно съ $26u^2 + v^2$, $2u^2 + 13v^2$ съ $13u^2 + 2v^2$, $3u^2 + 2uv + 9v^2$ съ $9u^2 + 2uv + 3v^2$, $5u^2 + 4uv + 6v^2$ съ $6u^2 + 4uv + 5v^2$, заключаемъ, что всѣ дѣлители $x^2 + 26y^2$ будутъ представляться формами

$$u^2 + 26v^2,\ 2u^2 + 13v^2,\ 3u^2 + 2uv + 9v^2,\ 5u^2 + 4uv + 6v^2.$$

Вотъ какимъ образомъ на основаніи доказанныхъ нами теоремъ могутъ быть выведены всѣ квадратичныя формы дѣлителей $x^2 \pm Dy^2$. Отсюда выходитъ много любопытныхъ предложеній относительно рѣшенія уравненій вида $ax^2 + 2bxy + cy^2 = H$, составляющихъ предметъ изслѣдованія Теоріи неопредѣленныхъ уравненій высшихъ степеней. Здѣсь же мы воспользуемся квадратичными формами дѣлителей $x^2 \pm Dy^2$ для опредѣленія его линейныхъ дѣлителей. Мы показали, какъ найдутся дѣлители $x^2 \pm Dy^2$, когда D число простое; теперь мы покажемъ, какъ найдутся дѣлители этой формы при всякомъ значеніи D, будетъ ли D число простое или составное. При этомъ мы будемъ предполагать D недѣлящимся на квадратъ какого ни-

www.rcin.org.pl

будь числа: ибо для $D = D_1 k^2$ форма $x^2 \pm D_1 k^2 y^2$ приведется къ $x^2 \pm D_1 (ky)^2$, и, слѣд., къ $x^2 \pm D_1 y_1^2$, полагая $y_1 = ky$. Итакъ, разсматривая дѣлителей формы $x^2 \pm Dy^2$, мы можемъ выкинуть изъ состава D всѣ точные квадраты; поступая такимъ образомъ, мы будемъ имѣть формы вида $x \pm Dy^2$, гдѣ D не дѣлится на квадратъ какого нибудь числа; опредѣленіемъ дѣлителей этихъ формъ мы теперь и займемся.

§ 47. Прежде чѣмъ покажемъ, какимъ образомъ изъ квадратичныхъ формъ дѣлителей могутъ быть выведены линейные дѣлители, мы докажемъ относительно формы $au^2 + 2buv + cv^2$ слѣдующія теоремы:

62. **Теорема.** *Если опредѣлитель формы* $au^2 + 2buv + cv^2$ *есть* d, *число недѣлящееся на квадратъ, то можно найти число* α, *для котораго* $a + 2b\alpha + c\alpha^2$ *будетъ число простое съ* d.

Доказательство. Въ самомъ дѣлѣ, пусть будетъ ω общій наибольшій дѣлитель c и d; число ω не будетъ заключать въ себѣ множителемъ никакого квадрата: ибо d не дѣлится на квадратъ. Но, по значенію d, мы имѣемъ $b^2 - ac = d$; откуда слѣдуетъ, что ω, общій дѣлитель c и d, дѣлитъ b^2, и слѣд. *по теоремѣ* 6-*й* дѣлитъ b. Докажемъ же теперь, во 1-хъ) что можно всегда найти число α, для котораго выраженіе $\frac{c\alpha + b}{\omega}$ приводится къ числу простому съ $\frac{d}{\omega}$, и во 2-хъ) что такое число α обращаетъ $a + 2b\alpha + c\alpha^2$ въ число простое съ d.

Въ первомъ не трудно убѣдиться, замѣтивъ, что при дѣлимости b на ω, общій наибольшій дѣлитель c и d, по теоремѣ 19, можно найти число, удовлетворяющее сравненію

$$c\alpha + b \equiv \omega \ (\text{мод. } d),$$

что предполагаетъ дѣлимость $c\alpha + b - \omega$ на d. Полагая же частное отъ дѣленія $c\alpha + b - \omega$ на d равнымъ N, будемъ имѣть

$$\frac{c + b - \omega}{d} = N;$$

откуда выходитъ

www.rcin.org.pl

$$\frac{c\alpha + b}{\omega} = 1 + N\frac{d}{\omega},$$

что обнаруживаетъ въ $\frac{c\alpha + b}{\omega}$ число простое съ $\frac{d}{\omega}$.

Чтобы убѣдиться во второмъ, мы замѣчаемъ, что выраженіе $a + 2b\alpha + c\alpha^2$ можетъ быть представлено такъ

$$\frac{\omega\left(\frac{c\alpha + b}{\omega}\right)^2 - \frac{b^2 - ac}{\omega}}{\frac{c}{\omega}},$$

гдѣ замѣняя $b^2 - ac$ черезъ d, имѣемъ

$$\frac{\omega\left(\frac{c\alpha + b}{\omega}\right)^2 - \frac{d}{\omega}}{\frac{c}{\omega}}.$$

Число же d разлагается на два множителя $\frac{d}{\omega}$ и ω, которые не могутъ имѣть общаго дѣлителя: ибо d не можетъ дѣлиться на квадратъ; притомъ $\frac{d}{\omega}$ по свойству числа α простое съ $\frac{c\alpha + b}{\omega}$. Отсюда слѣдуетъ, что ни ω, ни $\frac{d}{\omega}$ не могутъ имѣть общаго множителя съ $\omega\left(\frac{c\alpha + b}{\omega}\right)^2 - \frac{d}{\omega}$; ибо простыя числа, входящія въ составъ ω, дѣля $\omega\left(\frac{c\alpha + b}{\omega}\right)^2$, не могутъ дѣлить $\frac{d}{\omega}$; напротивъ, дѣлители $\frac{d}{\omega}$ не могутъ дѣлить $\omega\left(\frac{c\alpha + b}{\omega}\right)^2$. Итакъ, $\omega\left(\frac{c\alpha + b}{\omega}\right)^2 - \frac{d}{\omega}$ и, слѣд.,

$$\frac{c\left(\frac{c\alpha + b}{\omega}\right)^2 - \frac{d}{\omega}}{\frac{c}{\omega}} = a + 2b\alpha + c\alpha^2$$

число простое съ ω и $\frac{d}{\omega}$, а потому и съ произведеніемъ ихъ d, что и слѣдовало доказать.

Для примѣра найдемъ число α, для котораго бы $3 + 2.21\alpha + 217\alpha^2$ было число простое съ $21^2 - 3.217 = -210$. Замѣчая,

*

www.rcin.org.pl

что общій наибольшій дѣлитель 217 и 210 есть 7, мы для опредѣленія α находимъ условіе, что $\frac{217\alpha+21}{7}$, или $31\alpha+3$ число простое съ $\frac{210}{7}$ или 30. Этому условію, какъ видѣли, можно всегда удовлетворить, рѣшая сравненіе

$$217\alpha+21 \equiv 7 \ (\textit{мод.}\ 210).$$

Но въ этомъ случаѣ, какъ и въ большей части другихъ, мы можемъ легко найти α, пробуя различныя числа. Такъ, находимъ, что $\alpha = -2$ обращаетъ $31\alpha+3$ въ число простое съ 30. Слѣд., и выраженіе $3+2.21\alpha+217\alpha^2$ при $\alpha = -2$ будетъ число простое съ 210.

На основаніи доказанной нами теоремы для всякой формы $au^2+2buv+cv^2$ найдется число α, обращающее $a+2b\alpha+c\alpha^2$ въ число простое съ опредѣлителемъ ея. Опредѣливши такое число, мы можемъ преобразовать форму $au^2+2buv+cv^2$ въ другую, гдѣ первый членъ будетъ имѣть коеффиціентомъ число простое съ опредѣлителемъ ея d. Этого мы достигнемъ всегда, дѣлая въ этой формѣ $v-\alpha u = U$, гдѣ α есть число, обращающее $a+2b\alpha+c\alpha^2$ въ число простое съ d. Въ самомъ дѣлѣ, изъ этого уравненія найдемъ $v = \alpha u+U$, и внося эту величину въ форму $au+2buv+cv^2$, мы ее преобразуемъ въ такую

$$au^2+2b\ (\alpha u+U)\ u+c\ (\alpha u+U)^2,$$

что, по раскрытіи скобокъ, даетъ

$$(a+2b\alpha+c\alpha^2)\ u^2+2\ (b+\alpha c)\ uU+cU^2,$$

гдѣ коэффиціентъ перваго члена есть $a+2b\alpha+c\alpha^2$, число простое съ d по положенію.

Такъ, чтобы сдѣлать въ формѣ $3u^2+2.21uv+217v^2$ первый коеффиціентъ числомъ простымъ съ опредѣлителемъ ея, ищемъ число α, которое бы обратило $3+2.21\alpha+217\alpha^2$ въ число простое съ 210. Этому условію, какъ видѣли, удовлетворяетъ $\alpha = -2$. Поэтому для преобразованія формы $3u^2+2.21uv+217v^2$ дѣлаемъ $v+2u = U$, и на мѣсто v въ форму $3u^2+2.21uv+217v$ вносимъ $U-2u$. Это даетъ намъ

www.rcin.org.pl

$$3u^2 + 2.21\ (U - 2u)\ u + 217\ (U - 2u)^2,$$

или

$$787u^2 - 826Uu + 217U^2.$$

Такимъ образомъ данная форма

$$3u^2 + 2.21uv + 217v^2$$

преобразовывается въ форму

$$787u^2 - 826uU + 217U^2.$$

Послѣдняя форма сложнѣе первой, но она имѣетъ ту выгоду, что въ ней коеффиціентъ u^2 число простое съ опредѣлителемъ. Это послужитъ значительнымъ облегченіемъ при опредѣленіи линейныхъ дѣлителей, и теперь вездѣ мы будемъ предполагать квадратичныя формы преобразованными такъ, что въ нихъ первый коеффиціентъ число простое съ опредѣлителемъ. Въ этомъ предположеніи мы докажемъ слѣдующія теоремы относительно квадратичныхъ формъ:

63. **Теорема.** *Если въ формѣ* $au^2 + 2buv + cv^2$ *число* a *простое съ опредѣлителемъ* $b^2 - ac = d$, *то можно найти число* l, *удовлетворяющее сравненію*

$$au^2 + 2buv + cv^2 \equiv al^2 + 2bl + c \pmod{d}.$$

Доказательство. Въ самомъ дѣлѣ, при a простомъ съ d сравненіе

$$a\ (au^2 + 2bv + cv^2) \equiv a\ (al^2 + 2bl + c) \pmod{d}.$$

можетъ быть сокращено на a; вслѣдствіе чего оно приводится къ

$$au^2 + 2buv + cv^2 \equiv al^2 + 2bl + c \pmod{d},$$

которое хотимъ доказать. Но сравненіе

$$a\ (au^2 + 2buv + cv^2) \equiv a\ (al^2 + 2bl + c) \pmod{d},$$

можетъ быть такъ представлено:

$$(au + bv)^2 - (b^2 - ac)\ v^2 \equiv (al + b)^2 - (b^2 - ac) \ldots\ldots \pmod{d},$$

что, по равенству $b - ac^2$ съ модулемъ d, приводится къ слѣдующему.

www.rcin.org.pl

$$(au + bv)^2 \equiv (al + b)^2 \ (\text{мод. } d),$$

а это удовлетворяется, если

$$al + b \equiv au + bv \ (\text{мод. } d).$$

Но послѣднему сравненію мы всегда можемъ удовлетворить: ибо оно первой степени и a простое съ d; откуда и выходитъ предложенная нами теорема.

На основаніи этой теоремы, мы заключаемъ, что если при всѣхъ величинахъ l значенія $al^2 + 2bl + c$ по модулю d сравнимы съ числами

$$r_1, r_2, \ldots\ldots r_n;$$

то съ ними сравнимы также и всѣ значенія $au^2 + 2buv + cv^2$, и, слѣд., всѣ числа, опредѣляемыя этою формою будутъ одного изъ слѣдующихъ видовъ:

$$md + r_1, \ md + r_2, \ldots\ldots, \ md + r_n,$$

гдѣ m произвольное число. Что же касается до чиселъ $r_1, r_2, \ldots r_n$, съ которыми сравнимы по модулю d всѣ значенія $al^2 + 2al + c$, то мы ихъ найдемъ, опредѣляя числа, сравнимыя съ этимъ выраженіемъ при $l = 0, 1, 2, \ldots\ldots d - 1$: ибо съ этими значеніями $al^2 + 2bl + c$ по модулю d будутъ сравнимы всѣ другія.

Такъ, для выраженія чиселъ, опредѣляемыхъ формою

$$au^2 + 2buv + cv^2,$$

найдемъ линейныя формы

$$md + r_1, \ md + r_2, \ldots\ldots, \ md + r_n.$$

Но каждая изъ этихъ формъ приводится къ четыремъ, смотря по виду числа m. Такъ, предполагая въ первой формѣ m равнымъ $4z$, $4z + 1$, $4z + 2$ $4z + 3$, мы изъ нея выведемъ четыре

$$4dz + r_1, \ 4dz + d + r_1, \ 4dz + 2d + r_1, \ 4dz + 3d + r_1,$$

и ограничиваясь одними нечетными значеніями $au^2 + 2buv + cv^2$, посмотримъ, которыя изъ этихъ формъ должны быть выкинуты.

Начнемъ съ d нечетнаго. При d нечетномъ между числами $r_1, d + r_1, 2d + r_1, 3d + r_1$ будетъ два четныхъ и два нечет-

www.rcin.org.pl

ныхъ (см. теор. 10). Ограничиваясь одними нечетными значеніями $au^2 + 2buv + cv^2$, мы изъ четырехъ формъ

$$4dz + r_1,\ 4dz + r_1,\ 4dz + 2d z + r_1,\ 4dz + 3d + r_1$$

выкинемъ двѣ, въ которыхъ члены, не содержащіе z будутъ четныя. Затѣмъ для выраженія нечетныхъ значеній $au^2 + 2buv + cv^2$ останутся двѣ формы, изъ которыхъ одна будетъ давать числа вида $4m + 1$, другая вида $4m + 3$ (см § 44).

Изъ этихъ формъ мы оставимъ или одну только, или обѣ, смотря потому, даетъ ли форма $au^2 + 2buv + cu^2$ однѣ числа вида $4m + 1$ или однѣ числа вида $4m + 3$ или тѣ и другія вмѣстѣ. Но это узнаемъ мы, замѣчая, что относительно u и v можно сдѣлать четыре предположенія

$$\begin{array}{l|l|l|l} u = 2k & u = 2k+1 & u = 2k+1 & u = 2k \\ v = 2s & v = 2s & v = 2s+1 & v = 2s+1. \end{array}$$

Внеся же эти значенія u и v въ форму $au^2 + 2buv + cv^2$, находимъ результаты такого вида

$$4N,\ 4N_1 + a,\ 4N_2 + a + 2b + c,\ 4N_3 + c,$$

гдѣ называемъ черезъ $4N, 4N_1, 4N_2, 4N_3$ совокупность членовъ, имѣющихъ множителемъ 4.

Изъ этого видно, что если ни одно изъ чиселъ a, b, $a + 2b + c$ не есть вида $4m + 1$, или $4m + 3$, то форма $au^2 + 2buv + cv^2$ не даетъ чиселъ этого вида.

Обращаемся теперь къ случаю d четнаго.

При d четномъ всѣ числа r_1, $d + r_1$, $2d + r_1$, $3d + r_1$ или будутъ четныя, или всѣ будутъ нечетныя. Въ первомъ случаѣ, мы заключимъ, что форма $au^2 + 2buv + cv^2$ не даетъ чиселъ нечетныхъ; во второмъ же, по виду чиселъ r_1, $d + r_1$, $2d + r_1$, $3d + r_1$ мы узнаемъ, какого изъ четырехъ видовъ: $8m + 1$, $8m + 3$, $8m + 5$, $8m + 7$ числа выражаются каждою изъ линейныхъ формъ

$$4dz + r,\ 6dz + d + r_1,\ 4dz + 2d + r_1,\ 4dz + 3d + r_1,$$

и мы увидимъ, которыя изъ нихъ должны быть выкинуты, опредѣливъ, какихъ изъ четырехъ видовъ $8m + 1$, $8m + 3$, $8m + 5$, $8m + 7$ получаются числа изъ формы $au^2 + 2buv + cv^2$.

www.rcin.org.pl

Для этого мы замѣчаемъ, что относительно u и v можно сдѣлать только девять предположеній:

$$\begin{array}{l|l|l|l|l} u=2k+1 & u=2k+1 & u=2k+1 & u=4k & u=4k \\ v=2s+1 & v=4s & v=4s+2 & v=2s+1 & v=4s \end{array}$$

$$\begin{array}{l|l|l|l} u=4k & u=2k+2 & u=4k+2 & u=4k+2 \\ s=4s+2 & v=2s+1 & v=4s+2 & v=4s \end{array}$$

изъ которыхъ четыре

$$\begin{array}{l|l|l|l} u=4k & u=4k & u=4k+2 & u=4k+2 \\ v=4s & v=4s+2 & v=4s+2 & v=4s \end{array}$$

не должны имѣть мѣста: ибо въ нихъ значеніе $au^2+2buv+cv^2$ будетъ всегда число четное. Что же касается до остальныхъ предположеній, то дѣлая въ формѣ $au^2+2buv+cv^2$

$$\begin{array}{l|l|l|l|l} u=2k+1 & u=2k+1 & u=2k+1 & u=4k+2 & u=4k \\ v=2s+1 & v=4s & v=4s+2 & v=2s+1 & v=2s+1, \end{array}$$

мы находимъ результаты такого вида

$$8N+a+2b+c,\ 8N_1+a_1,\ 8N_2+a+4b+4c,\ 8N_3+4a+4b+c,$$
$$8N_4+c,$$

гдѣ $8N$, $8N_1$, $8N_2$, $8N_3$, $8N_4$ означаетъ совокупность всѣхъ членовъ, имѣющихъ множителемъ 8; сюда же относятся члены $4(k^2+k)$, $4(s^2+s)$, которыя на 8, очевидно, дѣлятся.

Отсюда слѣдуетъ, что числа, опредѣляемыя формою

$$au^2+2buv+cv^2,$$

могутъ имѣть какой либо изъ видовъ $8m+1$, $8m+3$, $8m+5$, $8m+7$ только тогда, когда этого вида есть число между a, c, $a+2b+c$, $4a+4b+c$, $a+4b+4c$, и этимъ опредѣляется, которыя изъ четырехъ формъ

$$4dz+r_1,\ 4dz+d+r_1,\ 4dz+2d+r_1,\ 4dz+3d+r_1$$

могутъ выражать нечетныя значенія $au^2+2buv+cv^2$ и которыя должны быть откинуты.

Покажемъ это на примѣрѣ.

Мы видѣли, что всѣ нечетные дѣлители x^2+26y^2 представляются формами

www.rcin.org.pl

$$u^2 + 26v^2,\ 2u^2 + 13v^2,\ 3u^2 + 2uv + 9v^2,\ 5u^2 + 4uv + 6v^2.$$

Чтобы опредѣлить линейныя формы чиселъ, представляемыхъ первою, мы замѣчаемъ, что въ ней коеффиціентъ u^2 не имѣетъ общаго дѣлителя съ опредѣлителемъ формы; поэтому къ ней можетъ быть приложена *теорема* 63. На основаніи этой теоремы мы заключаемъ, что всѣ значенія $u^2 + 26v^2$ по модулю 26 будутъ сравнимы съ тѣми же числами, съ которыми сравнимы значенія $l^2 + 26$ при $l = 0, 1, 2, \ldots\ldots, 25$. Но наименьшія числа, сравнимыя съ

$$0^2 + 26,\ 1^2 + 26,\ 2^2 + 26 \ldots\ldots, 25^2 + 26$$

по модулю 26, мы находимъ въ остаткѣ, получаемомъ при дѣленіи этихъ чиселъ на 26. Опредѣляя эти остатки, находимъ, что всѣ они равны

$$0,\ 1,\ 4,\ 9,\ 16,\ 25,\ 10,\ 23,\ 12,\ 3,\ 22,\ 17,\ 14,\ 13.$$

Откуда заключаемъ, что съ этими числами по модулю 26 сравнимы и всѣ значенія $u^2 + 26v^2$, а потому эти значенія должны представляться формами

$$26m + 0,\ 26m + 1,\ 26m + 4,\ 26m + 9,\ 26m + 16,$$
$$26m + 25,\ 26m + 10,\ 26m + 23,\ 26m + 12,\ 26m + 3,$$
$$26m + 22,\ 26m + 17,\ 26m + 14,\ 26m + 13.$$

Но изъ нихъ только формы

$$26m + 1,\ 26m + 9,\ 26m + 25,\ 26m + 23,\ 26n + 3,\ 26m + 17$$

даютъ числа нечетныя и простыя съ 26; ихъ мы только и оставимъ. Дѣлая здѣсь $m = 4z,\ 4z + 1,\ 4z + 2,\ 4z + 3$, мы выводимъ

$$\begin{array}{llll}
104z + 1, & 104z + 27, & 104z + 53, & 104z + 79,\\
104z + 9, & 104z + 35, & 104z + 61, & 104z + 87,\\
104z + 25, & 104z + 51, & 104z + 77, & 104z + 103,\\
104z + 23, & 104z + 49, & 104z + 75, & 104z + 101,\\
104z + 3, & 104z + 29, & 104z + 55, & 104z + 81,\\
104z + 17, & 104z + 43, & 104z + 69, & 104z + 95.
\end{array}$$

Но чтобы узнать, которыя изъ этихъ формъ должно оставить и которыя выкинуть, мы должны опредѣлить, какія изъ четырехъ

www.rcin.org.pl

видовъ $8m+1$, $8m+3$, $8m+5$, $8m+7$ имѣютъ числа, получаемыя изъ формы u^2+26v^2. Мы видѣли, что вообще для формы $au^2+2buv+cv^2$ это опредѣляется видами чиселъ

$$a,\ c,\ a+2b+c,\ 4a+4b+c,\ a+4b+4c.$$

Отсюда для формы u^2+26v^2 выходитъ

$$1,\ 26,\ 1+26,\ 4+26,\ 1+4.26.$$

Но здѣсь нѣтъ чиселъ вида $8m+5$ и $8m+7$. Слѣд., въ найденныхъ нами въ формахъ мы должны откинуть тѣ, которыя даютъ числа этого вида.

Такъ, замѣчая, что 53, 61, 77, 29, 101, 69 суть вида $8m+5$, а числа 79, 87, 103, 55, 23, 95 вида $8m+7$, мы откидываемъ формы

$$\begin{array}{cccc} 104z+53, & 104z+61, & 104z+77, & 104z+29, \\ 104z+101, & 104z+69, & 104z+79, & 104z+87, \\ 104z+103, & 104z+55, & 104z+23, & 104z+95, \end{array}$$

и у насъ остаются слѣдующія:

$$\begin{array}{cccc} 104z+1, & 104z+27, & 104z+9, & 104z+35, \\ 104z+25, & 104z+51, & 104z+49, & 104z+75, \quad 104z+3, \\ 104z+81, & 104z+17, & 104z+43. & \end{array}$$

Раскроемъ теперь линейныя формы чиселъ, опредѣляемыхъ квадратичною формою $2u^2+13v^2$. Но къ этой формѣ нельзя прямо приложить теорему 63: ибо въ ней коеффиціентъ u^2 есть 2, число непростое съ опредѣлителемъ — 26.

Поэтому, мы должны предварительно эту форму преобразовать по способу, показанному нами выше. Для этого, замѣчая, что общій наибольшій дѣлитель 2 и 26 есть 2, мы ищемъ α, которое бы обратило $\frac{2\alpha+0}{2}$, или α, въ число простое съ 26. Этому условію удовлетворяетъ 1, а потому для преобразованія формы $2u^2+13v^2$ вносимъ въ нее $U+u$ на мѣсто v, черезъ что она обращается въ слѣдующую

$$15u^2+26uU+13U^2.$$

Получивъ такимъ образомъ форму, въ которой первый коеффиціентъ число простое съ опредѣлителемъ — 26, мы на ос-

www.rcin.org.pl

нованіи теоремы 63 заключаемъ, что ея значенія по модулю 26 будутъ сравнимы съ остатками, получаемыми при дѣленіи

$$15.0^2 + 26.0 + 13,\ 15.1^2 + 26.1 + 13,\ 15.2^2 + 26.2 + 13,$$

$$\ldots\ldots\ldots,\ 15.25^2 + 26.25 + 13 \text{ на } 26.$$

Но эти остатки мы находимъ равными числамъ

$$13,\ 28,\ 21,\ 18,\ 19,\ 24,\ 7,\ 20,\ 11,\ 10,\ 5,\ 8,\ 15,\ 0;$$

слѣд., по модулю 26 сравнимы съ ними всѣ значенія $15u^2 + 26$ и $U + 13U^2$, а потому они могутъ быть представлены формами

$$26m + 13,\ 26m + 28,\ 26m + 21,\ 26m + 18,$$
$$26m + 19,\ 26m + 24,\ 26m + 7,\ 26m + 20,\ 26m + 11,$$
$$26m + 10,\ 26m + 5,\ 26m + 8,\ 26m + 15,\ 26m + 0.$$

Но изъ этихъ формъ только

$$26m + 21,\ 26m + 19,\ 26m + 7,\ 26m + 11,\ 26m + 5,\ 26m + 15$$

даютъ числа нечетныя и простыя съ опредѣлителемъ — 26 ихъ мы только и оставляемъ. Дѣлая здѣсь $m = 4z$, $4z + 1$ $4z + 2$, $4z + 3$, мы изъ этихъ формъ выводимъ

$$104z + 21,\ 104z + 47,\ 104z + 73,\ 104z + 99,$$
$$104z + 19,\ 104z + 45,\ 104z + 71,\ 104z + 97,$$
$$104z + 7,\ 104z + 33,\ 104z + 59,\ 104z + 85,$$
$$104z + 11,\ 104z + 37,\ 104z + 63,\ 104z + 89,$$
$$104z + 5,\ 104z + 31,\ 104z + 57,\ 104z + 83,$$
$$104z + 15,\ 104z + 41,\ 104z + 67,\ 104z + 93.$$

Но такъ какъ числа, выражаемыя формою

$$15u^2 + 26uU + 13U^2,$$

не могутъ быть вида $8m + 1$ и $8m + 3$: ибо ни одно изъ чиселъ

$$15,\ 13,\ 15 + 26 + 13,\ 4.15 + 2.26 + 13,\ 15 + 2.26 + 4.13$$

не есть этого вида. Поэтому изъ найденныхъ линейныхъ формъ мы должны выкинуть всѣ, которыя даютъ числа или вида $8m +$ или $8m + 3$.

Затѣмъ, для выраженія чиселъ нечетныхъ и простыхъ съ

www.rcin.org.pl

опредѣлителемъ, получаемыхъ изъ формы $15u^2 + 26uU + 13U^2$, остаются

$$104z + 21,\ 104z + 47,\ 104z + 45,\ 104z + 71,$$
$$104z + 7,\ 104z + 85,\ 104z + 37,\ 104z + 63,$$
$$104z + 5,\ 104z + 31,\ 104z + 15,\ 104z + 93.$$

Чтобы найти всѣ линейные дѣлители $x^2 + 26y^2$, намъ остается найти линейныя формы для выраженія чиселъ, опредѣляемыхъ формами

$$3u^2 + 2uv + 9v^2,\ 5u^2 + 4uv + 6v^2.$$

Но при этомъ мы находимъ для формы $3u^2 + 2uv + 9v^2$ тѣ же линейныя формы, какія нашли для $u^2 + 26v^2$, а для формы $5u^2 + 4uv + 6v^2$ тѣ же, какія нашли для $2u^2 + 13v^2$. Итакъ, всѣ нечетные дѣлители формы $x^2 + 26y^2$, простыя съ 26, опредѣляются слѣдующими формами

$$104z + 1,\ 104z + 3,\ 104z + 5,\ 104z + 7,$$
$$104z + 9,\ 104z + 15,\ 104z + 17,\ 104z + 21,$$
$$104z + 25,\ 104z + 27,\ 104z + 31,\ 104z + 35,$$
$$104z + 37,\ 104z + 43,\ 104z + 45,\ 104z + 47,$$
$$104z + 49,\ 104z + 51,\ 104z + 63,\ 104z + 71,$$
$$104z + 75,\ 104z + 81,\ 104z + 85,\ 104z + 93.$$

Такъ, съ помощію квадратичныхъ формъ могутъ быть опредѣлены линейные дѣлители $x^2 \pm Dy^2$, будетъ ли число простое или составное. Но чтобы при опредѣленіи ихъ не дѣлать лишнихъ выкладокъ, мы покажемъ теперь средство узнавать, что квадратичныя формы дѣлителей $x^2 \pm Dy^2$ приводятся къ однимъ линейнымъ формамъ, какъ въ предыдущемъ примѣрѣ

$$u^2 + 26v^2 \text{ и } 3u^2 + 2uv + 9v^2,\ 2u^2 + 13v^2 \text{ и } 5u^2 + 4u^2v + 6v^2.$$

Для этого, мы докажемъ слѣдующую теорему:

64. **Теорема.** *Если* $au^2 + 2buv + cv^2$, $a_1U^2 + 2b_1UV + c_1V$ *суть квадратичныя формы дѣлителей* $x^2 - dy^2$, *и* a, a_1 *числа простыя съ* d, *притомъ* $a_1 \equiv al^2 + 2bl + c \pmod{d}$, *гдѣ* l *какое-нибудь число; то можно найти* x, *удовлетворяющій сравненію*

$$a_1x^2 + 2b_1x + c_1 \equiv a\alpha^2 + 2b\alpha + c \pmod{d}.$$

www.rcin.org.pl

Доказательство. Въ самомъ дѣлѣ при a и a_1 простыхъ съ d сравненіе

$$a^2a_1\ (a_1x^2 + 2b_1x + c_1) \equiv a^2a_1\ (a\alpha^2 + 2b\alpha + c)\ (\text{мод. } d)$$

можетъ быть сокращено на a^2. a_1 и такимъ образомъ оно приводится къ

$$a_1x^2 + 2b_1x + c_1 \equiv a\alpha^2 + 2b\alpha + c\ (\text{мод. } d),$$

котораго возможность имѣемъ въ виду доказать. Но сравненіе

$$a^2a_1\ (a_1x + 2b_1x + c_1) \equiv a^2a_1\ (a\alpha^2 + 2b\alpha + c)\ (\text{мод. } d)$$

можетъ быть такъ представлено:

$$(aa_1x + ab_1)^2 - a^2(b_1^2 - a_1c_1) \equiv aa_1\ (a\alpha + b)^2 - aa_1(b^2 - ac)\ (\text{мод. } d),$$

гдѣ $b_1^2 - a_1c_1$, $b^2 - ac$ равны d: ибо, по положенію,

$$a_1U^2 + 2b_1UV + c_1V^2,\ au^2 + 2buv + cv^2$$

суть квадратичныя формы дѣлителей $x^2 - dy^2$ (см. теор. 59). Вслѣдствіе чего, предыдущее сравненіе приводится къ такому

$$(aa_1x + ab_1)^2 \equiv aa_1\ (a\alpha + b)^2\ (\text{мод. } d).$$

Это же сравненіе удовлетворяется, если

$$aa_1x + ab_1 \equiv (a\alpha + b)\ (al + b)\ (\text{мод. } d).$$

Чтобы убѣдиться въ этомъ, замѣтимъ, что для этой величины $aa_1x + ab_1$ оно приводится къ

$$(a\alpha + b)^2\ (al + b)^2 \equiv aa_1\ (a\alpha + b)^2\ (\text{мод. } d).$$

Но $(a^2 + b)^2$ сравнимо съ $a.a_1$ по модулю d: ибо, по положенію,

$$a_1 \equiv al^2 + 2bl + c\ (\text{мод. } d);$$

откуда выходитъ

$$aa_1 \equiv a\ (al^2 + 2bl + c)\ (\text{мод. } d),$$

или

$$aa_1 \equiv (al + b)^2 - (b^2 - ac)\ (\text{мод. } d),$$

и, слѣд., $aa_1 \equiv (al + b)^2$, потому что $b^2 - ac$ есть d.

Итакъ, чтобы удовлетворить сравненію

$$a_1x^2 + 2b_1x + c_1 \equiv a\alpha^2 + 2b\alpha + c\ (\text{мод. } d),$$

необходимо только найти x, для котораго

www.rcin.org.pl

$$aa_1x + ab_1 \equiv (a\alpha + b)\ (al + b)\ (\text{мод. } d),$$

что не представляетъ ни какой трудности: ибо здѣсь x въ первой степени и коеффиціентъ его aa_1 число простое съ модулемъ d.

Такъ убѣждаемся въ справедливости предложенной нами теоремы.

На основаніи ея и теоремы 63-й мы заключаемъ, что если a будетъ сравнимо по модулю d съ какимъ либо значеніемъ $al^2 + 2al + c$, то числа, опредѣляемыя формами

$$au^2 + 2buv + cv^2,\ a_1U^2 + 2b_1UV + c_1V^2,$$

будутъ сравнимы съ одними и тѣми же числами; а потому какъ для той, такъ и для другой линейныя формы вида $md + r$ будутъ однѣ и тѣже.

Что же касается до формъ вида $4md + r$, то мы ихъ легко выведемъ изъ формъ вида $md + r$, и на основаніи показаннаго нами способа выводить эти формы видно, что онѣ для $au^2 + 2buv + cv^2$ и $a_1U^2 + 2b_1UV + c_1V^2$ будутъ различныя или одинакія, смотря по виду чиселъ a, e, $a + 2b + c$, a_1, c_1, $a_1 + 2b_1 + c_1$ при d нечетномъ и по виду чиселъ a, c, $a + 2b + c$, $4a + 4b + c$, $a + 4b + 4c$, a_1, c_1, $a_1 + 2b_1 + c_1$, $4a + 4b_1 + c_1$, $a_1 + 4b_1 + 4c_1$ при d четномъ. Этимъ мы оканчиваемъ теорію дѣлителей $x^2 \pm dy^2$. Въ концѣ книги помѣщены таблицы линейныхъ дѣлителей формы $x^2 \pm dy^2$ для всѣхъ значеній d, недѣлящихся на квадратъ, отъ $d = 1$ до $d = 101$. Эти таблицы имѣютъ весьма важныя приложенія, какъ мы увидимъ въ слѣдующей главѣ.

ГЛАВА VIII.

Приложеніе теоріи сравненій къ разложенію чиселъ на простые множители.

§ 48. Въ заключеніе Теоріи сравненій, мы покажемъ, какимъ образомъ, на основаніи ея, можетъ быть упрощено разложеніе чиселъ на простые множители.

www.rcin.org.pl

Извѣстно, что для разложенія числа A на простые множители мы должны отыскать наименьшее простое число которое дѣлитъ A; если это число есть α, то дѣлитъ A на α и искать наименьшее простое число, которое дѣлитъ $\frac{A}{\alpha}$; если это число есть β, то искать наименьшаго дѣлителя $\frac{A}{\alpha\beta}$ и продолжать это до тѣхъ поръ, пока дойдемъ до частнаго. которое не дѣлится на всѣ простыя числа, не превосходящія его квадратнаго корня. Это частное будетъ число простое, и произведеніе его на $\alpha\beta$..... будетъ искомое разложеніе число A. Такимъ образомъ разложеніе чиселъ на простые множители приводится къ изслѣдованіямъ, что данное число имѣетъ-ли дѣлителей, или нѣтъ, и если имѣетъ, то какой наименьшій изъ нихъ. Но эти изслѣдованія представляютъ большія трудности для чиселъ значительныхъ. Такъ, на началахъ Ариѳметики наименьшаго дѣлителя числа N мы должны искать между всѣми простыми числами, меньшими $\sqrt{N}$, пробуя на нихъ дѣлить N. Но такихъ чиселъ будетъ много, если N велико, и намъ не рѣдко придется испытать значительную часть ихъ, прежде чѣмъ попадемъ на дѣлителя N. Еще болѣе трудности встрѣчаемъ при N простомъ; въ этомъ случаѣ мы должны будемъ испытать дѣлимость N на всѣ простыя числа до $\sqrt{N}$. Такъ, на началахъ Ариѳметики изслѣдованіе состава какого нибудь числа, превосходящаго 1000000, потребуетъ не рѣдко болѣе 160 дѣленій; ибо чиселъ простыхъ меньшихъ $\sqrt{1000000}$, или 1000, находимъ 168. На основаніи Теоріи сравненій эти изысканія значительно облегчаются: мы можетъ по виду даннаго числа опредѣлить видъ всѣхъ возможныхъ дѣлителей его, и намъ остается только испытать числа этого вида.

§ 49. Мы начнемъ съ частнаго случая, особенно замѣчательнаго, и покажемъ, какъ могутъ быть опредѣлены формы дѣлителей чиселъ вида $a^m \pm 1$, для которыхъ, на основаніи теоремъ V-й главы, не трудно доказать слѣдующее:

65. **Теорема.** *Если p нечетное число и дѣлитъ $a^m + 1$, то p можетъ быть выражено формою $\omega z + 1$, гдѣ ω дѣли-*

www.rcin.org.pl

тель m (*включая сюда и* 1), z *число простое съ* $\frac{m}{\omega}$; *притомъ* p *должно дѣлить* $a^{\alpha} - 1$.

Доказательство. Если ω есть общій наибольшій дѣлитель $p - 1$ и m, то числа $\frac{p-1}{\omega}$, $\frac{m}{\omega}$ цѣлыя и простыя между собою. Полагая первое изъ нихъ равнымъ z, будетъ имѣть

$$\frac{p-1}{\omega} = z,$$

откуда $p = \omega z + 1$.

Намъ остается теперь доказать, что p будетъ дѣлить $a^{\alpha} - 1$. Для этого мы замѣчаемъ, что дѣлимость $a^m - 1$ на p выражается сравненіемъ

$$a^m - 1 \equiv 0 \ (\mathit{мод.}\ p),$$

которое, по теоремѣ 35-й, при $p - 1$ и m, имѣющихъ общимъ наибольшимъ дѣлителемъ ω, предполагаетъ

$$a^{\omega} - 1 \equiv 0 \ (\mathit{мод.}\ p)$$

и, слѣд, дѣлимость $a^{\omega} - 1$ на p, что и слѣдовало доказать.

Изъ этой теоремы легко вывести слѣдующую:

66. **Теорема.** *Если* $2n + 1$ *число простое, то простые нечетные дѣлители* $a^{2n+1} - 1$ *должны быть вида* $2(2n+1)z + 1$ *или дѣлить* $a - 1$; *притомъ, они должны быть дѣлителями формы* $x^2 - ay^2$.

Доказательство. Если p нечетное число, то оно можетъ быть такъ представлено $2V + 1$. Но эта форма при дѣлимости N на $2n+1$ приводится къ такой $2(2n+1)z + 1$. Въ томъ же случаѣ, когда N не дѣлится на простое число $2n+1$, число $2N$ будетъ простое съ $2n+1$. Но, если p дѣлитъ $a^{2n+1} - 1$ и выражается черезъ $2N + 1$, гдѣ $2N$ простое съ $2n + 1$, то по предыдущей теоремѣ оно должно дѣлить $a - 1$, Итакъ, p должно быть вида $2(2n+1)z + 1$ или дѣлить $a - 1$.

Докажемъ же теперь, что p должно быть дѣлителемъ формы $x^2 - ay^2$. Въ этомъ не трудно убѣдиться: p дѣлитъ $a^{2n+1} - 1$,

www.rcin.org.pl

и, слѣд., дѣлитъ $a(a^{2n}+1-1)$, а это приводится къ $(a^{n}+1)^2-a$, враженію вида x^2-ay^2.

Замѣчая, что при $a=2$ никакое число не дѣлитъ $a-1$, дѣлители же x^2-ay^2, по 55-й теоремѣ, должны быть одного изъ двухъ видовъ: $8m+1$ или $8m-1$, мы на основаніи доказаннаго нами заключаемъ, что всѣ простые дѣлители $2^{2n}+1-1$ при $2n+1$ простомъ должны быть вида $2(2n+1)z+1$, и въ тоже время должны быть одного изъ двухъ видовъ: $8m+1$ или $8m-1$. Опредѣливши такимъ образомъ видъ дѣлителей числа $2^{2n}+1-1$, не трудно найти ихъ во всякомъ частномъ случаѣ, или убѣдиться въ отсутствіи ихъ.

Такимъ образомъ Эйлеръ нашелъ, что

$$2^{31}-1=2147483647$$

есть число простое, и это есть самое большое простое число доселѣ извѣстное.

Подобнымъ образомъ на основаніи доказанныхъ нами теоремъ легко изслѣдовать составъ всякаго числа, опредѣляемаго формулою a^m-1.

Переходимъ теперь къ числамъ вида a^m+1, и относительно ихъ дѣлителей докажемъ слѣдующую теорему:

67. **Теорема.** *Если p простое нечетное число и дѣлитъ a^m+1, то p можетъ быть такъ представлено*: $2\omega z+1$, *гдѣ ω дѣлитель m (не исключая 1), который въ частномъ $\frac{m}{\omega}$ даетъ число нечетное, z число простое съ $\frac{m}{\omega}$, притомъ p должно дѣлить $a^{\omega}+1$.*

Доказательство. Дѣлимость a^m+1 на p выражается сравненіемъ

$$a^m+1\equiv 0 \pmod{p},$$

которое, по 39-й теоремѣ, предполагаетъ

$$a^{\omega}+1\equiv 0 \pmod{p},$$

гдѣ ω общій наибольшій дѣлитель m и $p-1$, который въ частномъ $\frac{p-1}{\omega}$ долженъ дать число четное. Полагая это частное равнымъ $2z$, найдемъ

www.rcin.org.pl

$$\frac{p-1}{\omega} = 2z;$$

и слѣдовательно

$$p = 2\omega z + 1.$$

Но нетрудно убѣдиться, что здѣсь z число простое съ $\frac{m}{\omega}$, и частное $\frac{m}{\omega}$ число нечетное. Въ самомъ дѣлѣ, число ω, будучи общимъ наибольшимъ дѣлителемъ $p-1$ и m, въ частныхъ $\frac{p-1}{\omega}$, $\frac{m}{\omega}$ должно дать числа простыя между собою. Но первое есть $2z$, и оно не иначе можетъ быть простымъ съ $\frac{m}{\omega}$, какъ при недѣлимости $\frac{m}{\omega}$ на 2, и отсутствіи общихъ дѣлителей въ $\frac{m}{\omega}$ и z.

Намъ остается доказать, что p долженъ дѣлить $a^{\omega}+1$; но это слѣдуетъ изъ сравненія

$$a^{\omega}+1 \equiv 0 \ (\textit{мод. } p).$$

которое мы вывели выше.

Изъ этой теоремы, какъ частный случай, выходятъ такія:

68. **Теорема.** *Простые нечетные дѣлители числа* $a^{2n+1}+1$ *при* $2n+1$ *простомъ должны быть вида* $2(2n+1)z+1$, *или дѣлить* $a+1$.

Доказательство. Если p нечетное число, то оно можетъ быть такъ представлено: $2N+1$. Но эта форма, при дѣлимости N на $2n+1$, приводится къ $2(2n+1)z+1$. Въ томъ же случаѣ, когда N не дѣлится на простое число $2n+1$, число N простое съ $2n+1$, и дѣлимость $a^{2n+1}-1$ на $p = 2N+1$ по предыдущей теоремѣ, предполагаетъ дѣлимость $a+1$ на это число, что и слѣдовало доказать.

69. **Теорема.** *Всѣ нечетные дѣлители числа* $2^{2n}+1$ *должны быть вида* $2 \cdot 2^n+1$.

Доказательство. По теоремѣ 68-й всѣ нечетные дѣлители $2^{2n}+1$ могутъ быть такъ представлены

$$2\omega z+1,$$

www.rcin.org.pl

гдѣ ω есть дѣлитель 2^n, который въ частномъ $\frac{2^n}{\omega}$ даетъ число нечетное. Но этому условію удовлетворяетъ только $\omega = 2^n$, слѣд. всѣ нечетные дѣлители $2^{2^n} + 1$ должны представляться такъ

$$2.\ 2^n z + 1,$$

что и слѣдовало доказать. На основаніи трехъ послѣднихъ теоремъ легко найти дѣлителей числа, имѣющаго видъ $a^m + 1$, или убѣдиться, что оно не имѣетъ дѣлителей.

Для примѣра, возмемъ числа 65537 и 4294967297, изъ которыхъ первое равно $2^{2^4} + 1$; второе равно $2^{2^5} + 1$

По послѣдней изъ доказанныхъ нами теоремъ, дѣлители 65537 должны быть вида $32z + 1$. Дѣлая здѣсь $z = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$, мы находимъ, что всѣ числа этого вида и меньшія 65537, суть

33, 65, 97, 129, 161, 193, 225, 257.

Но изъ нихъ только 97 и 193 числа простыя, и такъ какъ эти числа не дѣлятъ 65537, то мы заключаемъ, что 65537 есть число простое.

По той же теоремѣ, для дѣлителей числа 4294967297 имѣемъ форму $64z + 1$. Дѣлая здѣсь $z = 1, 2, \ldots\ldots 1024$, мы найдемъ всѣ числа этого вида и меньшія $\sqrt{4294967297}$. Между этими числами мы находимъ такія простыя

183, 257, 449, 577, 641,.....

Дѣля на нихъ 4294967297, мы замѣчаемъ, что это число дѣлится на 641.

Этотъ примѣръ особенно замѣчателенъ тѣмъ, что онъ опровергаетъ мнѣніе Фермата, будто бы всѣ числа вида $2^{2^n} + 1$ суть простыя.

§ 50. Мы видѣли, какимъ образомъ теорія двучленныхъ сравненій облегчаетъ изслѣдованія чиселъ, подходящихъ подъ форму $a^m \pm 1$. Теперь покажемъ, какимъ образомъ для всякаго числа A можетъ быть найдено множество формъ вида $x^2 \pm ay^2$ съ незначительными величинами a, которыя будутъ выражать или данное число A, или кратное его. Во всякомъ случаѣ, бу-

*

www.rcin.org.pl

дутъ ли эти формы выражать A, или кратное A, дѣлители A будутъ дѣлителями этихъ формъ, и, слѣд., видъ ихъ опредѣлится по способамъ, показаннымъ въ предыдущей главѣ, или найдется изъ нашихъ таблицъ дѣлителей $x^2 \pm ay^2$, если a не превосходитъ 101.

Какое бы ни было число A, или кратное его kA, можно всегда выразить его формою вида $x^2 \pm ay^2$. Такъ, принимая за z какое нибудь числа, за y наибольшее число, квадратъ котораго дѣлитъ разность $A - x^2$., и полагая частное $\frac{A-x^2}{y^2}$ равнымъ a, будемъ имѣть

$$\frac{A-x^2}{y^2} = a;$$

откуда получаемъ для A такое выраженіе

$$A = x^2 + ay^2.$$

Подобнымъ образомъ могутъ быть выражены $2A$, $3A$.,.. Всѣ полученныя такимъ образомъ формы будутъ служить для опредѣленія дѣлителей A. Но изъ нихъ наиболѣе выгодны тѣ, въ которыхъ a имѣетъ незначительную величину: ибо какъ можно было замѣтить въ теоріи дѣлителей квадратичныхъ формъ, чѣмъ меньше a, тѣмъ проще формы дѣлителей $x^2 \mp ay^2$. Поэтому изъ всѣхъ возможныхъ выраженій A, или кратнаго A формами вида $x^2 \pm ay^2$ мы должны выбрать тѣ, въ которыхъ a незначительное число. Для нѣкоторыхъ чиселъ эти формы легко могутъ быть найдены непосредственно. Такъ, не трудно замѣтить, что $10001 = 100^2 + 1$, $3.3337 = 1000^2 + 11$. и т. п. Но вообще такія формы могутъ быть найдены на основаніи слѣдующей теоремы:

70. **Теорема.** *Если* d^0, d_1, d_2,..... *есть рядъ чиселъ, въ которомъ каждый членъ* d_{n+1} *подвумъ предыдущимъ опредѣляется уравненіемъ*

$$\sqrt{A - d_{n+1}d_n} = d_n E\frac{\sqrt{A - d_n d_{n+1}} + \sqrt{A}}{d_n} - \sqrt{A - d_n d_{n-1}}; \quad (*)$$

первые же два суть 1, $A - (E\sqrt{A})^2$; *то всякая изъ формъ* $x^2 - Dy$, *гдѣ* D *равно*

(*) Знакомъ E мы означаемъ здѣсь тоже, что въ § 26.

www.rcin.org.pl

$$(-1)^{\alpha+\beta+\gamma\ldots\ldots} d_\alpha, d_\beta, d_\gamma, \ldots\ldots$$

способна выражать A или кратное A.

Доказательство. Прежде чѣмъ приступимъ къ этому доказательству, замѣтимъ, что ряды

$$d_0, d_1, d_2, \ldots\ldots \sqrt{A-d_1d_0}, \sqrt{A-d_2d_1}, \sqrt{A-d_3d_2}, \ldots\ldots$$

состоитъ изъ чиселъ цѣлыхъ. По положенію $d_0 = 1$, $d_1 = A - (E\sqrt{A})^2$; отсюда слѣдуетъ, что d_0, d_1, $\sqrt{A-d_1d_0}$ суть числа цѣлыя. Но если эти количества числа цѣлыя, то и всѣ остальныя, заключающіяся въ рядахъ,

$$d_0, d_1, d_2, \ldots\ldots, \sqrt{A-d_1d_0}, \sqrt{A-d_2d_1}, \sqrt{A-d_3d_2}, \ldots\ldots$$

не могутъ имѣть значеній дробныхъ или ирраціональныхъ: ибо по уравненію

$$\sqrt{A-d_{n+1}d_n} = d_n E\frac{\sqrt{A-d_nd_{n-1}}+\sqrt{A}}{d_n} - \sqrt{A-d_nd_{n-1}},$$

изъ котораго выходитъ также

$$d_{n+1} = d_{n-1} + 2\sqrt{A-d_nd_{n-1}}\, E\frac{\sqrt{A-d_nd_{n-1}}+\sqrt{A}}{d_n} - d_n\left[E\frac{\sqrt{A-d_nd_{n-1}}+\sqrt{A}}{d_n}\right]^2,$$

количества d_{n+1} $\sqrt{A-d_nd_{n+1}}$ не могутъ имѣть значеній дробныхъ или ирраціональныхъ, если d_{n+1}, d_n, $\sqrt{A-d_nd_{n-1}}$ суть числа цѣлыя.

На основаніи этого, зная, что d_0, d_1, $\sqrt{A-d_0d_1}$ числа цѣлыя, мы заключаемъ что d_2, $\sqrt{A-d_1d_2}$ имѣютъ значенія цѣлыя; зная, что d_1, d_2, $\sqrt{A-d_1d_2}$ имѣютъ значенія цѣлыя, заключаемъ, что d_3, $\sqrt{A-d_3d_2}$ числа цѣлыя, и т. д.

Приступимъ теперь къ доказательству предложенной нами теоремы, и изобразимъ буквами x_0, x_1, x_2, $\ldots$ x_{n-1} значенія

$$\sqrt{A-d_1d_0}, \sqrt{A-d_1d_2}, \sqrt{A-d_3d_2}, \ldots, \sqrt{A-d_{n-1}d_{n-2}}, \sqrt{A-d_nd_{n-1}},$$

которыя, какъ видѣли, всѣ суть числа цѣлыя. Имѣя такимъ образомъ

$$\sqrt{A-d_1d_0} = x_0, \sqrt{A-d_2d_1} = x_1, \sqrt{A-d_3d_2} = x_2,$$

$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

$$\sqrt{A-d_{n-1}d_{n-2}} = xx_{n-2}, \sqrt{A-d_nd_{n-1}} = x_{n-1},$$

www.rcin.org.pl

мы изъ этихъ уравненій выводимъ

$$x_0^2 - A = -d_1 d_0,\ x_1^2 - A = -d_2 d_1,\ x_2^2 - A = d_3 d_2,$$
$$\ldots\ldots\ldots\ldots$$
$$x^2_{n-2} - A = -d_{n-1} d_{n-2},\ x^2_{n-1} - A = -d_n d_{n-1},$$

которыя иначе напишутся такъ

$$(x_0 + \sqrt{A})(x_0 - \sqrt{A}) = -d_1 d_0,$$
$$(x_1 + \sqrt{A})(x_1 - \sqrt{A}) = -d_2 d_1,$$
$$(x_2 - \sqrt{A})(x_2 - \sqrt{A}) = -d_3 d_2,$$
$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$
$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$
$$(x_{n-2} + \sqrt{A})(x_{n-2} - \sqrt{A}) = -d_{n-1} d_{n-2},$$
$$(x_{n-1} + \sqrt{A})(x_{n-1} - \sqrt{A}) = -d_n d_{n-1}.$$

Перемножая всѣ эти уравненія между собою, находимъ

$$(x_0 + \sqrt{A})(x_1 + \sqrt{A})(x_2 + \sqrt{A}) \ldots (x_{n-2} + \sqrt{A})(x_{n-1} + \sqrt{A}) \times$$
$$(x_0 - \sqrt{A})(x_1 - \sqrt{A})(x_2 - \sqrt{A}) \ldots (x_{n-2} - \sqrt{A})(x_{n-1} - \sqrt{A}) =$$
$$(-1)^n d_0 d_1^2 d_2^2 \ldots d^2_{n-1} d_n.$$

Но, перемножая между собою выраженія

$$x_0 \pm \sqrt{A},\ x_1 \pm \sqrt{A},\ x_2 \pm \sqrt{A}, \ldots x_{n-2} \pm \sqrt{A},\ x_{n-1} \pm \sqrt{A},$$

мы находимъ произведеніе такого вида $X_n \pm Y_n \sqrt{A}$, гдѣ X_n и Y числа цѣлыя.

Вслѣдствіе этого, предыдущее уравненіе приводится къ такому

$$(X_n + Y_n \sqrt{A})(X_n - Y_n \sqrt{A}) = (-1)^n d_0 d_1^2 d_2^2 \ldots d_n^2 d_n.$$

Полагая же здѣсь $d_1 d_2 \ldots d_{n-1} = Z_n$, и замѣчая, что $d_0 = 1$ мы находимъ

$$(X_n + Y_n \sqrt{A})(X_n - Y_n \sqrt{A}) = (-1)^n Z_n^2 d_n.$$

Такое уравненіе мы найдемъ для всякаго значенія n. Дѣлая здѣсь $n = \alpha$, $n = \beta$, $n = \gamma, \ldots\ldots$, мы будемъ имѣть

$$X_\alpha + Y_\alpha \sqrt{A})(X_\alpha - Y_\alpha \sqrt{A}) = (-1)^\alpha Z^2_\alpha d_\alpha,$$
$$X_\beta + Y_\beta \sqrt{A})(X_\beta - Y_\beta \sqrt{A}) = (-1)^\beta Z^2_\beta d_\beta,$$
$$(X_\gamma + Y_\gamma \sqrt{A})(X_\gamma - Y_\gamma \sqrt{A}) = (-1)^\gamma Z^2_\gamma d_\gamma,$$
$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

www.rcin.org.pl

и эти уравненія, по перемноженіи, дадутъ

$$(X_\alpha + Y_\beta\sqrt{A})(X_\beta + Y_\beta\sqrt{A})(X_\gamma + Y_\gamma\sqrt{A})\ldots\times$$
$$(X_\alpha - Y_\alpha\sqrt{A})(X_\beta - Y_\beta\sqrt{A})(X_\gamma - Y_\gamma\sqrt{A})\ldots =$$
$$(-1)^{\alpha+\beta+\gamma+\ldots}\ldots Z^2_\alpha Z^2_\beta Z^2_\gamma \ldots\ldots d_\alpha d_\beta d_\gamma \ldots$$

Но, перемножая между собою выраженія

$$X_\alpha \pm Y_\alpha\sqrt{A}, X_\beta \pm U_\beta\sqrt{A}, X_\gamma \pm Y_\gamma\sqrt{A}, \ldots,$$

мы находимъ произведеніе такого вида $X \pm Y\sqrt{A}$, гдѣ X, Y числа цѣлыя. Вслѣдствіе чего предыдущее уравненіе приводится къ такому

$$(X+Y\sqrt{A})(X-Y\sqrt{A}) = (-1)^{\alpha+\beta+\gamma+\ldots} Z_\alpha{}^2 Z_\beta{}^{2z}{}_\gamma \ldots d_\alpha d_\beta d_\gamma \ldots,$$

а это, по раскрытіи скобокъ, даетъ

$$X^2 - Y^2 A = (-1)^{\alpha+\beta+\gamma+\ldots} Z_\alpha{}^2 Z_\beta{}^2 Z_\gamma{}^2 \ldots d_\alpha d_\beta d_\gamma \ldots,$$

или $X^2 - (-1)^{\alpha+\beta+\gamma+\ldots} d_\alpha d_\beta d_\gamma \ldots (Z_\alpha Z_\beta Z_\gamma \ldots)^2 = AY^2$.

Откуда видимъ, что форма

$$x^2 - ay^2$$

при $a = (-1)^{\alpha+\beta+\gamma+\ldots} d_\alpha d_\beta d_\gamma \ldots$ будетъ выражать число кратное A, если x примемъ равнымъ X, и y равнымъ $Z_\alpha Z_\beta Z_\gamma \ldots$, что и слѣдовало доказать.

На основаніи этой теоремы, опредѣливши числа

$$d_0, d_1, d_2, \ldots$$

мы найдемъ множество формъ вида $x^2 \pm ay^2$, которыя будутъ способны выразить кратныя A.

Въ этихъ формахъ a опредѣляется произведеніемъ какихъ-либо изъ чиселъ

$$d_0, d_1, d_2, \ldots\ldots,$$

и между различными сочетаніями этихъ чиселъ мы выберемъ такія, которыхъ бы произведеніе привелось къ точному квадрату съ незначительнымъ множителемъ. Принимая такія произведенія для опредѣленія a въ формѣ $x^2 \pm ay^2$, и выкидывая изъ состава a точные квадраты по § 46, мы получимъ формы

www.rcin.org.pl

съ незначительными коэффиціентами, и эти то формы, на основаніи сказаннаго нами, послужатъ для опредѣленія дѣлителей A *). Если бы мы не нашли такимъ образомъ достаточнаго числа различныхъ формъ, то мы бы стали по предыдущей теоремѣ искать формы, выражающія кратныя $2A$, $3A$, $4A$,....., и между ними выбрали бы удобныя для опредѣленія дѣлителей A.

Для примѣра возьмемъ число 8520191. Не останавливаясь на формахъ, которыя могли бы быть открыты непосредственно для выраженія 8520191 или кратнаго 8520191, мы будемъ искать ихъ на основаніи предыдущей теоремы. Для этого мы опредѣлимъ числа

$$d_0,\ d_1,\ d_2,\ldots.$$

по уравненіямъ

$$d_0 = 1,\ d_1 = 8520191 - (E\sqrt{8520191})^2,$$

$$\sqrt{8520191 - d_{n+1}d_n} = d_n E\frac{\sqrt{8520191 - d_n d_{n-1}} + \sqrt{8520191}}{d_n} - \sqrt{8520191 - d_n d_{n-1}}.$$

Изъ этихъ уравненій находимъ

$d_0 = 1,$	$d_4 = 1313,$	$d_8 = 1169$	$d_{12} = 593,$	$d_{16} = 1210,$
$d_1 = 5467,$	$d_5 = 2630,$	$d_9 = 4223,$	$d_{13} = 2854,$	....., ...
$d_2 = 370,$	$d_6 = 3185,$	$d_{10} = 242,$	$d_{14} = 2965,$	.....
$d_3 = 4319,$	$d_7 = 203,$	$d_{11} = 1855,$	$d_{15} = 371,$	... .

Разлагая здѣсь числа на простые множители, что не представляетъ большой трудности **), получаемъ

$d_0 = 1,$	$d_4 = 13.101,$	$d_8 = 7.187,$	$d_{12} = 593,$
$d_1 = 7.11.71,$	$d_5 = 2\,5.263,$	$d_9 = 4523,$	$d_{13} = 2.14\,?7,$
$d_2 = 2.5.37,$	$d_6 = 5.7^2.13,$	$d_{10} = 2.11^2,$	$d_{14} = 5.593,$
$d_3 = 7.617,$	$d_7 = 7.29,$	$d_{11} = 5.7.53$	$d_{15} = 7.53,$
			$d_{16} = 2\,5.11^2.$

Разсматривая составъ чиселъ d_0, d_1, d_2,.....,.. d_1, мы замѣчаемъ, что числа

*) Въ этихъ формахъ не будутъ заключаться числа d_1, d_2, d_3,.... входящія въ составъ a, но они могутъ дѣлить A, и мы ихъ должны предварительно испытать.

**) При этомъ можно съ выгодою пользоваться таблицами Вега, въ которыхъ находимъ для всѣхъ чиселъ меньшихъ 102000 разложеніе на простые множители.

www.rcin.org.pl

$$d_6,\ d_{10},\ d_{16},\ d_{10},\ d_{16}\ \ d_6,\ d_{10}\ \ d_{16}\ \ d_2\ d_{16},\ d_4\ d_6\ d_{10}\ d_{16},$$

по исключеніи изъ состава ихъ точныхъ квадратовъ, приводится къ незначительнымъ числамъ.

Поэтому на основаніи доказанной нами теоремы для опредѣленія дѣлителей разсматриваемаго нами числа 8520191, принимаемъ формы вида $x^2 - ay^2$, гдѣ a имѣетъ такія значенія

$$a = (-1)^6 d_6 = 5.7^2.13,$$
$$a = (-1)^{10} d_{10} = 2.11^2,$$
$$a = (-1)^{16} d_{16} = 2.5.11^2,$$
$$a = (-1)^{10+16} d_{10} d_{16} = 2^2.5.11^2,$$
$$a = (-1)^{6+10+16} d_6 d_{10} d_{16} = 5^2.7^2.13.2^2.11^2,$$
$$a = (-1)^{2+16} d_2 d_{16} = 2^2.5^2.37.11^2,$$
$$a = (-1)^{4+6+10+16} d_4 d_6 d_{10} d_{16} = 13^2.101.5^2.7^2.2^2.11^4,$$

Исключая въ этихъ величинахъ a всѣ множители, составляющіе точные квадраты, находимъ для a слѣдующія величины

$$5.13,\ 2,\ 2.5,\ 5,\ 13\ \ 37,\ 101.$$

Отсюда видимъ, что дѣлители 8520191, должны имѣть видъ дѣлителей каждой изъ формъ

$$x^2 - 5.13y^2,\ x^2 - 2y^2,\ x^2 - 2.5y^2,\ x^2 - 5y^2,\ x^2 - 13y^2,\ x^2 - 13y^2,$$
$$x^2 - 37y^2,\ x^2 - 101y^2.$$

На этомъ основаніи мы и будемъ искать дѣлителей 8520191.

Для этого по таблицамъ линейныхъ дѣлителей, мы замѣчаемъ, что дѣлители $x^2 - 5.13y^2$ суть

$260z \pm$ 1, 7, 9, 29, 33, 37, 47, 49, 51, 57, 61, 63, 67, 69, 73, 79, 81, 83, 93, 97, 101, 121, 123, 129, 131, 137, 139, 159, 163, 167, 177, 179, 181, 187, 191, 193, 197, 199, 203, 209, 211, 213, 223, 227, 231, 251, 253, 259.

Но изъ нихъ дѣлителями $x^2 - 5y^2$ могутъ быть только тѣ, которые при дѣленіи на 20 даютъ остатки равные 1, 9, 11, 19, ибо для дѣлителей $x^2 - 5y^2$ находимъ

$$20z \pm 1,\ 9,\ 11,\ 19.$$

Выкидывая изъ предыдущихъ формъ всѣ, которыя не даютъ въ остаткѣ 1, 9, 11, 19, мы находимъ, что дѣлителями $x^2 - 5.13y^2$ и $x^2 - 5y^2$ вмѣстѣ могутъ быть числа вида

www.rcin.org.pl

$260z \pm$ 1, 9, 29, 49, 51, 61, 69, 79, 81,
101, 121, 129, 131, 139, 159, 179, 181, 191,
199, 209, 211, 231, 251, 259,

Но изъ этихъ чиселъ могутъ быть дѣлителями формы $x^2 - 2y^2$ только тѣ, которыя вида $8z \pm 1$ или $8z \pm 7$, и, слѣд., при дѣленіи на 8 даютъ въ остаткѣ 1 или 7. Чтобы вывести изъ найденныхъ нами формъ дѣлителей $x^2 - 5.13y^2$ и $x - 5y^2$ такія, которыя бы давали одни числа вида $8z \pm 1$ и $8z \pm 7$, мы преобразуемъ ихъ такъ, чтобы коеффиціентъ при переменномъ z былъ кратнымъ 8. Для этого мы замѣчаемъ, что z будетъ или вида $2u$, или вида $2u \pm 1$. Внося эти величины въ найденныя нами формы дѣлителей $x^2 - 15y^2$ и $x^2 - 5y^2$, мы ихъ представимъ такъ

$520m \pm$ 1, 9, 29, 49, 51, 61, 69, 79, 81, 101, 121, 129, 131, 139, 159,
179, 181, 191, 199, 209, 211, 231, 251, 259, 261, 269, 289, 309,
311, 321, 329, 339, 341, 361, 381, 389, 391, 399, 419, 439, 441,
451, 459, 469, 471, 491, 511, 519.

Выкидывая здѣсь тѣ формы, которыя при дѣленіи на 8 даютъ остатки, отличные отъ 1 и 7, находимъ, что общіе дѣлители формъ $x^2 - 5.13y^2$, $x^2 - 5y^2$, $x^2 - 2y^2$ должны быть вида

$520u \pm$ 1, 9, 49, 79, 81, 121, 129, 159, 191, 199, 209, 231, 289, 311, 321,
329, 361, 391, 399, 439, 441, 471., 511, 519.

У насъ остается еще для опредѣленія дѣлителей числа 8520191 четыре формы

$$x^2 - 2.5y^2,\ x^2 - 13y^2,\ x^2 - 37y^2,\ x^2 - 101y^2.$$

Изъ нихъ первыя двѣ имѣютъ дѣлителями вся числа, дѣлящія $x^2 - 5.13y^2$, $x^2 - 5y^2$, $x^2 - 2y^2$, въ чемъ не трудно убѣдиться, замѣтивъ, что дѣлимость $x_1^2 - 5.13y_1^2$, $x_2^2 - 5y_2^2$, $x_3^2 - 2y_3^2$ на p предполагаетъ

$$x_1^2 \equiv 5.13y_1^2,\ x_2^2 \equiv 5y_2^2,\ x_3^2 \equiv 2y_3^2 \ (\textit{мод. } p),$$

откуда слѣдуетъ $x^2{}_1 x_2^2 \equiv 5^2.13y_1^2 y_2^2$, $x^2{}_2 x_3^2 \equiv 2.5y_2^2 y_3^2$ (*мод. p*), и, слѣдов., дѣлимость формъ $x^2 - 13y^2$ и $x^2 - 2.5y^2$ на p. Что же касается до формъ

$$x^2 - 37y^2,\ x^2 - 101y^2;$$

www.rcin.org.pl

то опредѣляя ихъ дѣлителей и выкидывая изъ формъ

520 u + 1, 9, 49, 79, 81, 121, 129, 159, 191, 199,
209, 231, 289, 311, 321, 329, 361, 391, 399,
439, 441, 471, 511, 519.

тѣ, которыя не согласны съ ихъ видомъ, мы ограничили бы еще болѣе числа, между которыми должны искать дѣлителей 8520191. Для этого мы найденныя формы должны преобразовать такъ, чтобы коеффиціентъ при перемѣнномъ и былъ кратнымъ 4. 37 и 4. 101. Послѣ чего дѣленіемъ этихъ формъ на 4. 37 и 4. 101 мы узнаемъ, которыя изъ нихъ подходятъ подъ формы дѣлителей $x^2—31y^2$, $x^2—101y^2$. Но при этомъ мы получимъ чрезвычайно много линейныхъ формъ для опредѣленія дѣлителей 8520191. Поэтому, не пользуясь пока формами $x^2—37y^2$, $x^2—101y^2$ для опредѣленія дѣлителей 8520191, мы остановимся на найденныхъ нами линейныхъ дѣлителяхъ общихъ формамъ $x^2 — 5.13y^2$, $x^2—5y^2$, $x^2—2y^2$, и по нимъ опредѣлимъ всѣ простыя числа меньшія $\sqrt{8520191}$.

Эти числа суть

79	521	719	919	1231	1511	1889	2129	2521	2791.
191	569	751	991	1249	1559	1951	2161	2551	
199	599	809	1031	1361	1609	1999	2239	2591	
311	601	881	1039	1439	1759	2081	2311	2609	
439	641	911	1049	1481	1871	2089	2441	2729	

Между этими-то числами мы должны искать наименьшаго дѣлителя 8520191. Но по значительному количеству ихъ это было бы довольно продолжительно. Для этого мы предварительно исключимъ изъ нихъ тѣ, которыя не могутъ быть дѣлителями квадратичныхъ формъ $x^2 — 37y^2$, $x^2 — 101y^2$. Для этого мы замѣчаемъ изъ таблицъ, что дѣлители $x^2 — 37y^2$ при дѣленіи на 148 должны давать остатки

1, 3, 7, 9, 11, 21, 25, 27, 33, 41, 47, 49, 53, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 81, 73, 85, 95, 99, 101, 107, 115, 121, 123, 127, 137, 139, 141, 145, 147.

Но между найденными нами простыми числами этому условію удовлетворяютъ только числа

www.rcin.org.pl

521	751	1249	2081
599	881	1439	2441
601	1039	1481	2591
641	1049	1951	2729
719	1231	1999	2791.

Такимъ же образомъ находимъ, что изъ этихъ чиселъ дѣлителями $x^2 - 101y^2$ могутъ быть только

521, 601, 1231, 1249, 1999, 2441, 2729, 2791.

Пробуя дѣлить на эти числа 8520191, замѣчаемъ, что они его не дѣлятъ; откуда заключаемъ, что 8520191 число простое.

Такимъ образомъ, на основаніи теоріи дѣлителей квадратичныхъ формъ, мы можемъ изслѣдовать составъ всякаго числа, опредѣливши рядъ чиселъ

$$d_0,\ d_2,\ d_2,\ldots\ldots$$

по уравненіямъ: $d_0 = 1,\ d_1 = A - (E\sqrt{A})^2,$

$$\sqrt{A - d_n d_{n+1}} = d_n E \frac{\sqrt{A - d_n d_{n-1}} + \sqrt{A}}{d_n} - \sqrt{A - d_n d_n} - .$$

www.rcin.org.pl

ПРИБАВЛЕНІЯ.

I.

О квадратичныхъ вычетахъ.

Въ IV-й главѣ мы видѣли, какъ опредѣляется величина символа $\left(\frac{a}{p}\right)$, и черезъ это знаемъ, имѣетъ ли сравненіе $x \equiv a$ (*мод.* p) рѣшеніе, или нѣтъ. Но этотъ способъ опредѣленія величины $\left(\frac{a}{p}\right)$ можетъ быть значительно упрощенъ; можно опредѣлить значеніе $\left(\frac{a}{p}\right)$, не разлагая ни a, ни другихъ чиселъ на простые множители. Такое упрощеніе особенно важно при a большомъ; въ этомъ случаѣ разложеніе a на простые множители бываетъ очень трудно, и требуетъ гораздо болѣе времени, чѣмъ самое опредѣленіе $\left(\frac{a}{p}\right)$ по способу, который мы теперь покажемъ.

Слѣдуя Лежандру, мы изображаемъ символомъ $\left(\frac{a}{p}\right)$, при p простомъ, нечетномъ, недѣлящемъ a, единицу съ тѣмъ изъ двухъ знаковъ, съ которымъ она удовлетворяетъ сравненію

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \pm 1 \ (\textit{мод. } p).$$

Согласится же теперь съ Якоби изображать произведеніе такихъ символовъ $\left(\frac{a}{p_1}\right)$, $\left(\frac{a}{p_2}\right)$, $\left(\frac{a}{p_3}\right)$, ... символомъ $\left(\frac{a}{p_1 p_2 p_3 .....}\right)$. Допустивши такое знакоположеніе, мы въ величинѣ символа $\left(\frac{a}{N}\right)$

www.rcin.org.pl

при N нечетномъ, простомъ съ a, будемъ имѣть произведеніе символомъ $\left(\frac{a}{\alpha}\right)$, $\left(\frac{a}{\beta}\right)$, $\left(\frac{a}{\gamma}\right)$,....., гдѣ α, β, γ,..... суть простые множители составляющіе N. Въ случаѣ N простаго этотъ символъ будетъ тождественъ символу Лежандра, и имъ опредѣлится возможность или невозможность сравненія $x^2 \equiv a \,(мод. N)$.

Докажемъ же теперь, что символъ $\left(\frac{a}{N}\right)$ будетъ удовлетворять всѣмъ тѣмъ уравненіямъ, которыя служили намъ для опредѣленія величины символа $\left(\frac{a}{p}\right)$ при p простомъ.

Не трудно убѣдиться, что $\left(\frac{a'.a''....}{N}\right)$ равно $\left(\frac{a'}{N}\right)\left(\frac{a''}{N}\right)$..... Въ самомъ дѣлѣ, если

$$N = \alpha\,\beta\,\gamma\,.....,$$

гдѣ α, β, γ,..... простыя числа, то

$$\left(\frac{a'a''....}{\alpha}\right) = \left(\frac{a'}{\alpha}\right)\left(\frac{a''}{\alpha}\right)....,$$
$$\left(\frac{a'a''....}{\beta}\right) = \left(\frac{a'}{\beta}\right)\left(\frac{a''}{\gamma}\right)...,$$
$$\left(\frac{a'a''....}{\gamma}\right) = \left(\frac{a'}{\gamma}\right)\left(\frac{a''}{\gamma}\right)....,$$
$$.....$$

Перемножая эти уравненія, находимъ

$$\left(\frac{a'a''..}{\alpha}\right)\left(\frac{a'a''...}{\gamma}\right)\left(\frac{a'a''...}{\gamma}\right)...=\left(\frac{a'}{\alpha}\right)\left(\frac{a'}{\beta}\right)\left(\frac{a'}{\gamma}\right).....\left(\frac{a''}{\alpha}\right)\left(\frac{a''}{\beta}\right)\left(\frac{a''}{\gamma}\right)...$$

что по принятому нами знакоположенію представится такъ

$$\left(\frac{a'\,a''....}{\alpha\beta\gamma....}\right) = \left(\frac{a'}{\alpha\beta\gamma....}\right)\left(\frac{a''}{\alpha\beta\gamma....}\right).....$$

Замѣчая же, что здѣсь $\alpha\beta\gamma.....$ равно N, найдемъ

$$\left(\frac{a'a''...}{N}\right) = \left(\frac{a'}{N}\right)\left(\frac{a''}{N}\right).....,$$

что и хотѣли доказать. На основаніи этого мы заключаемъ, что

$$\left(\frac{a'^2}{N}\right) = 1,$$

и слѣд.

$$\left(\frac{a'^2a''}{N}\right) = \left(\frac{a''}{N}\right).$$

www.rcin.org.pl

На этомъ основаніи мы можемъ въ символѣ $\left(\frac{a}{N}\right)$ выкидывать изъ состава a точные квадраты.

Также не трудно доказать, что при a сравнимомъ съ a' по модулю N значеніе $\left(\frac{a}{N}\right)$ равно $\left(\frac{a'}{N}\right)$. Въ самомъ дѣлѣ, если a и a' сравнимы по модулю N, и $N = \alpha\beta\gamma$ ....., то a и a' сравнимы по модулямъ α, β, γ, ..., и, слѣд.,

$$\left(\frac{a}{\alpha}\right)=\left(\frac{a'}{\alpha}\right),\ \left(\frac{a}{\beta}\right)=\left(\frac{a'}{\beta}\right),\ \left(\frac{a}{\gamma}\right)=\left(\frac{a'}{\gamma}\right).$$

Перемножая эти уравненія между собою, найдемъ

$$\left(\frac{a}{\alpha}\right)\left(\frac{a}{\beta}\right)\left(\frac{a}{\gamma}\right)\ldots=\left(\frac{a'}{\alpha}\right)\left(\frac{a'}{\beta}\right)\left(\frac{a'}{\gamma}\right)\ldots, \text{ или } \left(\frac{a}{\alpha\beta\gamma\ldots}\right)=\left(\frac{a'}{\alpha\beta\gamma\ldots}\right).$$

Но $\alpha\beta\gamma\ldots = N$, слѣдовательно

$$\left(\frac{a}{N}\right)=\left(\frac{a'}{N}\right).$$

На основаніи этого мы можемъ въ символѣ $\frac{a}{N}$ число a замѣнить остаткомъ отъ дѣленія a на N, или обсолютно малымъ вычетомъ a по модулю N.

Значенія $\left(\frac{a}{N}\right)$ при $a = 1$ и $a = -1$ опредѣлятся также, какъ значенія $\left(\frac{a}{p}\right)$ при p простомъ уравненіями

$$\left(\frac{1}{N}\right)=1, \left(\frac{-1}{N}\right)=(-1)^{\frac{N-1}{2}}.$$

Въ самомъ дѣлѣ, если $N = \alpha\beta\gamma$ ....., гдѣ α, β, γ..... простыя числа, то

$$\left(\frac{1}{N}\right)=\left(\frac{1}{\alpha}\right)\left(\frac{1}{\beta}\right)\left(\frac{1}{\gamma}\right)\ldots=1,$$

$$\left(\frac{-1}{N}\right)=\left(\frac{-1}{\alpha}\right)\left(\frac{-1}{\beta}\right)\left(\frac{-1}{\gamma}\right)\ldots=(-1)^{\frac{\alpha-1}{2}+\frac{\beta-1}{2}+\frac{\gamma-1}{2}+\ldots}.$$

Но $\frac{N-1}{2}=\frac{\alpha\beta\gamma\ldots-1}{2}$, что можетъ быть представлено такъ

$$\frac{\left(2^{\frac{\alpha-1}{2}}+1\right)\left(2^{\frac{\beta-1}{2}}+1\right)\left(2^{\frac{\gamma-1}{2}}+1\right)\ldots-1}{2}$$

www.rcin.org.pl

а это за исключеніемъ членовъ, имѣющихъ множителемъ 2, приводится къ

$$\frac{\alpha-1}{2}+\frac{\beta-1}{2}+\frac{\gamma-1}{2}+\ldots\ldots$$

Въ слѣдствіе этого предыдущее выраженіе $\left(\frac{-1}{N}\right)$ приводится къ такому

$$\left(\frac{-1}{N}\right)=(-1)^{\frac{N-1}{2}}.$$

На основаніи этого и уравненія $\left(\frac{aa'}{N}\right)=\left(\frac{a}{N}\right)\left(\frac{a'}{N}\right)$ значеніе $\left(\frac{-a}{N}\right)$ выразится такъ

$$\left(\frac{-a}{N}\right)=\left(\frac{a}{N}\right)(-1)^{\frac{N-1}{2}}.$$

Переходимъ теперь къ уравненію, связывающему значенія $\left(\frac{a}{N}\right)$, $\left(\frac{N}{a}\right)$. Это уравненіе подобно тому, которое мы нашли для символа $\left(\frac{a}{p}\right)$ при a, p простыхъ, и назвали закономъ взаимности двухъ простыхъ чиселъ. Пусть будетъ $N=\alpha\,\beta\,\gamma\ldots.$, $a=\alpha'\,\beta'\,\gamma'\ldots\ldots$, гдѣ α', β', γ',..... подобно $\alpha, \beta, \gamma,\ldots\ldots$ простыя числа. По закону взаимности простыхъ чиселъ находимъ

$$\left(\frac{\alpha'}{\alpha}\right)=\left(\frac{\alpha}{\alpha'}\right)(-1)^{\frac{\alpha-1}{2}\cdot\frac{\alpha'-1}{2}},\quad \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)=\left(\frac{\beta}{\alpha'}\right)(-1)^{\frac{\beta-1}{2}\frac{\alpha'-1}{2}}$$

$$\left(\frac{\alpha'}{\gamma}\right)=\left(\frac{\gamma}{\alpha'}\right)(-1)^{\frac{\gamma-1}{2}\cdot\frac{\alpha'-1}{2}}\ldots\ldots,$$

Перемножая же эти уравненія между собою, получаемъ

$$\left(\frac{\alpha'}{\alpha}\right)\left(\frac{\alpha'}{\beta}\right)\left(\frac{\alpha'}{\gamma}\right)\ldots\ldots=$$

$$\left(\frac{\alpha}{\alpha'}\right)\left(\frac{\beta}{\alpha'}\right)\left(\frac{\gamma}{\alpha'}\right)\ldots\ldots(-1)^{\frac{\alpha'-1}{2}\left(\frac{\alpha-1}{2}+\frac{\beta-1}{2}+\frac{\gamma-1}{2}+\ldots\ldots\right)}.$$

или

$$\left(\frac{\alpha'}{\alpha\beta\gamma\ldots\ldots}\right)=\left(\frac{\alpha\beta\gamma\ldots\ldots}{\alpha'}\right)(-1)^{\frac{\alpha'-1}{2}\left(\frac{\alpha-1}{2}+\frac{\beta-1}{2}+\frac{\gamma-1}{2}+\ldots\right)}.$$

Но произведеніе $\alpha\,\beta\,\gamma\ldots\ldots$ равно N; значеніе $\frac{\alpha-1}{2}+\frac{\beta-1}{2}+$

www.rcin.org.pl

$\frac{\gamma-1}{2}+\ldots$, какъ замѣтили, разнится съ $\frac{N-1}{2}$ числомъ четнымъ; вслѣдствіе этого предыдущее уравненіе приводится къ такому

$$\left(\frac{\alpha'}{N}\right)=\left(\frac{N}{\alpha'}\right)(-1)^{\frac{\alpha'-1}{2}\cdot\frac{N-1}{2}}.$$

Подобнымъ образомъ находимъ

$$\left(\frac{\beta'}{N}\right)=\left(\frac{N}{\beta'}\right)(-1)^{\frac{\beta'-1}{2}\cdot\frac{N-1}{2}},$$

$$\left(\frac{\gamma'}{N}\right)=\left(\frac{N}{\gamma'}\right)(-1)^{\frac{\gamma'-1}{2}\cdot\frac{N-1}{2}},$$

$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

Перемножая всѣ эти уравненія между собою, получаемъ

$$\left(\frac{\alpha'}{N}\right)\left(\frac{\beta'}{N}\right)\left(\frac{\gamma'}{N}\right)\ldots=\left(\frac{N}{\alpha}\right)\left(\frac{N}{\beta'}\right)\left(\frac{N}{\gamma'}\right)\ldots(-1)^{\frac{N-1}{2}\left(\frac{\alpha'-1}{2}+\frac{\beta'-1}{2}+\frac{\gamma'-1}{2}+\ldots\right)}$$

что подобно предыдущему приводится къ

$$\left(\frac{a}{N}\right)=\left(\frac{N}{a}\right)(-1)^{\frac{N-1}{2}\cdot\frac{a-1}{2}};$$

ибо $\alpha'\ \beta'\ \gamma'\ldots\ldots=a$.

Намъ остается теперь показать уравненіе, опредѣляющее значеніе $\left(\frac{a}{N}\right)$ при $a=2$. Это уравненіе, на основаніи выведенныхъ нами, можетъ быть опредѣлено очень просто независимо отъ уравненія, выражающаго величину $\left(\frac{2}{p}\right)$ при p простомъ.

Для этого мы замѣчаемъ, что уравненіе

$$\left(\frac{a}{N}\right)=\left(\frac{N}{a}\right)(-1)^{\frac{N-1}{2}\cdot\frac{a-1}{2}}$$

при $a=2n-1$, $N=2n+1$ даетъ

$$\left(\frac{2n-1}{2n+1}\right)=\left(\frac{2n+1}{2n-1}\right)(-1)^{n(n-1)};$$

откуда слѣдуетъ

$$\left(\frac{2n-1}{2n+1}\right)=\left(\frac{2n+1}{2n-1}\right).$$

www.rcin.org.pl

Но по доказанному нами

$$\left(\frac{2n-1}{2n+1}\right)=\left(\frac{2n-1-2n-1}{2n+1}\right)=\left(\frac{-2}{2n+1}\right)=\left(\frac{2}{2n+1}\right)(-1)^n,$$

$$\left(\frac{2n+1}{2n-1}\right)=\left(\frac{2n+1-2n+1}{2n-1}\right)=\left(\frac{2}{2n-1}\right).$$

Въ слѣдствіе этого предыдущее уравненіе даетъ

$$\left(\frac{2}{2n+1}\right):\left(\frac{2}{2n-1}\right)=(-1)^n,$$

Дѣлая здѣсь $n = 2, 3, \ldots\ldots \frac{N-1}{2}$ и перемножая уравненія, при этомъ получаемыя, находимъ

$$\left(\frac{2}{N}\right)=\left(\frac{2}{3}\right)(-1)^{2+3+\ldots+\frac{N-1}{2}}.$$

Но $\left(\frac{2}{3}\right)$ равно—1; вслѣдствіе этого предыдущее уравненіе даетъ

$$\left(\frac{2}{N}\right)=(-1)^{1+2+3+\ldots+\frac{N-1}{2}},$$

что приводится къ такому уравненію

$$\left(\frac{2}{N}\right)=(-1)^{\frac{N^2-1}{8}}.$$

На основаніи выведенныхъ нами уравненій, мы можемъ съ выгодою ввести символъ $\left(\frac{a}{N}\right)$, съ N составнымъ, для опредѣленія значеній $\left(\frac{a}{p}\right)$ при p простомъ. Для этого мы будемъ поступать при опредѣленіи $\left(\frac{a}{p}\right)$ такимъ образомъ:

Если a больше p, то символъ $\left(\frac{a}{p}\right)$ замѣняемъ символомъ $\left(\frac{r}{p}\right)$, гдѣ r остатокъ отъ дѣленія a на p (вмѣсто остатка отъ дѣленія a на p мы можемъ взять за r обсолютно малый вычетъ a по модулю p); если r число четное, то разлагаемъ его на произведеніе степени 2 и числа нечетнаго; чрезъ это значеніе $\left(\frac{r}{p}\right)$ представится произведеніемъ символовъ $\left(\frac{2}{p}\right)$ и $\left(\frac{r'}{p}\right)$. Символы $\left(\frac{2}{p}\right)$, будучи въ четномъ числѣ, дадутъ произведеніе

www.rcin.org.pl

равное 1; въ противномъ случаѣ мы его найдемъ по уравненію $\left(\frac{2}{N}\right)=(-1)^{\frac{N^2-1}{8}}$. Обращаемся къ символу $\left(\frac{r'}{p}\right)$, гдѣ $r'<p$ и r' число нечетное. По выведенному нами уравненію

$$\left(\frac{a}{N}\right)=\left(\frac{N}{a}\right)(-1)^{\frac{N-1}{2}\cdot\frac{a-1}{2}}$$

найдемъ

$$\left(\frac{r'}{p}\right)=\left(\frac{p}{r'}\right)(-1)^{\frac{r'-1}{2}\cdot\frac{p-1}{2}}.$$

Потомъ поступаемъ съ $\left(\frac{p}{r'}\right)$, какъ поступали съ $\left(\frac{a}{p}\right)$, уменьшая такимъ образомъ послѣдовательно числа, входящія въ этотъ символъ, дойдемъ до символовъ, которыхъ значенія найдутся на основаніи уравненій

$$\left(\frac{1}{N}\right)=1,\left(\frac{-1}{N}\right)=(-1)^{\frac{N-1}{2}},\left(\frac{2}{N}\right)=(-1)^{\frac{N^2-1}{8}}.$$

При этомъ мы будемъ выкидывать въ символѣ $\left(\frac{a}{N}\right)$ множителей a и N, составляющихъ точные квадраты, когда такіе множители легко обнаруживаются.

Для примѣра возьмемъ символъ

$$\left(\frac{884257967}{2147483247}\right).$$

Здѣсь верхнее число меньше нижняго и притомъ нечетное, поэтому на основаніи уравненія

$$\left(\frac{a}{N}\right)=\left(\frac{N}{a}\right)(-1)^{\frac{N-1}{2}\cdot\frac{a-1}{2}}$$

выводимъ

$$\left(\frac{884257967}{2147483647}\right)=-\left(\frac{2147483647}{884257967}\right).$$

Потомъ дѣля 2147483647 на 884257967 и находя въ остаткѣ 378967713, заключаемъ, что

$$\left(\frac{2147483647}{884257967}\right)=\left(\frac{378967713}{884257967}\right).$$

Но опять на основаніи того же уравненія

*

www.rcin.org.pl

$$\left(\frac{a}{N}\right)=\left(\frac{N}{a}\right)(-1)^{\frac{N-1}{2}\cdot\frac{a-1}{2}}$$

находимъ

$$\left(\frac{378967713}{884257967}\right)=\left(\frac{884257967}{378967713}\right).$$

А такъ какъ остатокъ отъ дѣленія 884257967 на 378967713 есть 126322541, то

$$\left(\frac{884257967}{378967713}\right)=\left(\frac{126322541}{378967713}\right).$$

Продолжая такимъ образомъ, выводимъ

$$\left(\frac{126322541}{378967713}\right)=\left(\frac{378967713}{126322541}\right)=\left(\frac{90}{126322541}\right);$$

$$\left(\frac{90}{126322541}\right)=\left(\frac{3}{126322541}\right)^2\left(\frac{10}{126322541}\right)=\left(\frac{10}{126322541}\right);$$

$$\left(\frac{10}{126322541}\right)=\left(\frac{2}{126322541}\right)\left(\frac{5}{126322541}\right).$$

Но величина $\left(\frac{2}{126322541}\right)$ по уравненію $\left(\frac{2}{N}\right)=(-1)^{\frac{N^2-1}{8}}$ есть 1; слѣд.,

$$\left(\frac{10}{126322541}\right)=\left(\frac{5}{126322541}\right)=\left(\frac{126322541}{5}\right)=\left(\frac{1}{5}\right)=1.$$

Итакъ, величина $\left(\frac{884257967}{2147483647}\right)$ есть — 1.

Если бы мы стали опредѣлять значеніе этого символа по способу Лежандра, изложенному нами въ IV главѣ, мы должны бы были, приступая къ этому опредѣленію, разложить число 884257967 на простые множители, что представляетъ большія трудности.

Принятое нами знакоположеніе для означенія произведенія символовъ $\left(\frac{a}{p_1}\right)$, $\left(\frac{a}{p_2}\right)$, $\left(\frac{a}{p_3}\right)$, ... и вслѣдствіе того данное нами значеніе символу $\left(\frac{a}{N}\right)$ при N составномъ, можетъ быть также съ пользою употреблено въ теоріи дѣлителей квадратичной формы $x^2\pm ay^2$. Такъ, если форма x^2-iay^2, гдѣ $i=\pm 1$ имѣетъ дѣлителемъ число N, и N есть произведеніе простыхъ чиселъ $\alpha\beta\gamma$....; то $\left(\frac{ia}{\alpha}\right)=1$, $\left(\frac{ia}{\beta}\right)=1$, $\left(\frac{ia}{\gamma}\right)=1$,..... откуда слѣд-

www.rcin.org.pl

дуетъ, что $\left(\frac{ia}{\alpha}\right)\left(\frac{ia}{\beta}\right)\left(\frac{ia}{\gamma}\right)\ldots = 1$, и, слѣд., по нашему знакоположенію

$$\left(\frac{ia}{N}\right) = 1.$$

Откуда выходитъ

$$\left(\frac{i}{N}\right)\left(\frac{a}{N}\right) = 1.$$

Умножая это уравненіе на $\left(\frac{i}{N}\right)$ и замѣчая что $\left(\frac{i}{N}\right)^2 = 1$, находимъ

$$\left(\frac{a}{N}\right) = \left(\frac{i}{N}\right).$$

Предполагая же a числомъ нечетнымъ, по доказанному нами имѣемъ

$$\left(\frac{N}{a}\right) = \left(\frac{a}{N}\right)(-1)^{\frac{a-1}{2}\cdot\frac{N-1}{2}}.$$

Это уравненіе вмѣстѣ съ предыдущимъ даетъ

$$\left(\frac{N}{a}\right) = \left(\frac{i}{N}\right)(-1)^{\frac{a-1}{2}\cdot\frac{N-1}{2}}.$$

Отсюда для $i = 1$, $a = 4n + 1$ выводимъ $\left(\frac{N}{a}\right) = 1$; для $i = 1$, $a = 4n + 3$ выводимъ $\left(\frac{N}{a}\right) = (-1)^{\frac{N-1}{2}}$; для $i = -1, a = 4n+1$ выводимъ $\left(\frac{N}{a}\right) = (-1)^{\frac{N-1}{2}}$; для $i = -1$, $a = 4n + 3$ выводимъ $\left(\frac{N}{a}\right) = 1$.

Вотъ уравненія, которымъ должны удовлетворять дѣлители формы $x^2 \pm ay^2$; въ нихъ, какъ частный случай, заключаются уравненія, которыя въ VII-й главѣ мы нашли для опредѣленія дѣлителей $x^2 \pm ay^2$ при a простомъ.

II.

Объ опредѣленіи первообразныхъ корней.

Въ VI-й главѣ мы показали два способа опредѣлять первообразные корни простыхъ чиселъ. Оба эти способа для чиселъ

www.rcin.org.pl

большихъ приводятся къ огромнымъ выкладкамъ. Теперь мы докажемъ нѣсколько теоремъ, на основаніи которыхъ можно для многихъ чиселъ по виду ихъ узнать ихъ первообразный корень.

I. **Теорема**. *Первообразный корень числа* $2^{2^n}+1$ *есть* 3.

Доказательство. Если $p = 2^{2^n}+1$, то въ составъ $p-1$ входитъ только простое число 2, а потому (см. 48 теорему) число a будетъ первообразный корень $2^{2^n}+1$, если сравненіе $x^2 \equiv a \pmod{2^{2^n}+1}$ не имѣетъ рѣшенія. Докажемъ же теперь, что это сравненіе не имѣетъ рѣшенія при $a = 3$. Для этого мы замѣчаемъ, что $\left(\frac{3}{2^{2^n}+1}\right)$ по закону взаимности чиселъ, равно $\left(\frac{2^{2^n}+1}{3}\right)$, а это равно $\left(\frac{-1}{3}\right)$: ибо возводя члены сравненія $4 \equiv 1 \pmod 3$ въ степень n находимъ $4^n \equiv 1 \pmod 3$; откуда ясно, что -1 по модулю 3 сравнимо съ 4^n+1, или $2^{2^n}+1$. Но $\left(\frac{-1}{3}\right) = -1$. Слѣд., $\left(\frac{3}{2^{2^n}+1}\right) = -1$; а потому сравненіе $x^2 \equiv 3 \pmod{2^{2^n}+1}$ не имѣетъ рѣшенія, и 3 есть первообразный корень числа $2^{2^n}+1$.

На основаніи этой теоремы мы заключаемъ, что 3 есть первообразный корень 5, 17, 257, 65537.

II. **Теорема**. *Первообразный корень числа* $2(4n+1)+1$ *при* $4n+1$ *простомъ есть* 2, *а числа* $2(4n+1)+1$ *при* $4n+3$ *простомъ есть* $2(4n+3)-1$.

Доказательство. Если $p = 2(4n+1)+1$ и $4n+1$ число простое, большее 1, то въ составъ $p-1$ входятъ два простыя числа: 2, $4n+1$; поэтому (см. 48 теор.) число a будетъ первообразный корень числа $2(4n+1)+1$, если сравненія

$$x^2 \equiv a,\ x^{4n+1} \equiv a \pmod{2(4n+1)+1}.$$

не имѣютъ рѣшенія. Докажемъ же теперь, что эти сравненія не имѣютъ рѣшенія при $a = 2$. Невозможность перваго очевидна; оно приводится къ

$$x^2 \equiv 2 \pmod{8n+3}.$$

www.rcin.org.pl

а, по 32-й теоремѣ, $\left(\frac{2}{8n+3}\right)$ есть -1.

Что-же касается до втораго, оно будетъ

$$x^{4n+1} \equiv 2 \ (\mathit{мод.}\ 8n+3);$$

откуда, возводя обѣ части сравненія въ квадратъ, находимъ

$$x^{8n+2} \equiv 4 \ (\mathit{мод.}\ 8n+3).$$

Этому сравненію не удовлетворяютъ числа кратныя $8n+3$, а при x, недѣлящимся на $8n+3$, по теоремѣ Фермата будетъ

$$x^{8n+2} \equiv 1 \ (\mathit{мод.}\ 8n+3)$$

Въ слѣдствіе чего предыдущее сравненіе приводится къ такому

$$1 \equiv 4 \ (\mathit{мод.}\ 8n+3),$$

или

$$3 \equiv 0 \ (\mathit{мод.}\ 8n+3).$$

Эта сравненіе могло бы имѣть мѣсто только при $n = 0$, но случай $n = 0$, и, слѣд., $4n+1 = 1$ мы исключаемъ. Итакъ, оба сравненія

$$x^2 \equiv a, \ x^{4n+1} \equiv a \ (\mathit{мод.}\ 2\,(4n+1)+1)$$

при $a = 2$, $n > 0$ не имѣютъ рѣшенія, и, слѣд., первообразный корень $2(4n+1)+1$ въ сдѣланныхъ нами предположеніяхъ есть 2.

Переходимъ теперь къ $p = 2\,(4n+3)+1$. Въ этомъ случаѣ $p-1$ будетъ заключать простыя числа 2 и $4n+3$, и a будетъ первообразный корень $2(4n+3)+1$, если сравненія

$$x^2 \equiv a, \ x^{4n+3} \equiv a \ (\mathit{мод.}\ 2\,(4n+3)+1)$$

не имѣютъ рѣшенія. Докажемъ же, что это случается для $a = 2(4n+3)-1$. Первое сравненіе приводится къ

$$x^2 \equiv 8n+5 \ (\mathit{мод.}\ 8n+7),$$

и оно не имѣетъ рѣшеній: ибо

$$\left(\frac{8n+5}{8n+7}\right) = \left(\frac{8n+5-8n-7}{8n+7}\right) = \left(\frac{-2}{8n+7}\right) = -1.$$

Второе будетъ

www.rcin.org.pl

$$x^{4n+1} \equiv 8n+5 \ (\textit{мод.}\ 8n+7),$$

или

$$x^{4n+3} \equiv -2 \ (\textit{мод.}\ 8n+7).$$

Возводя обѣ части этого сравненія въ квадратъ и замѣчая, что по теоремѣ Фермата $x^{8n+6} \equiv 1$ (*мод.* 8^n+7), находимъ

$$1 \equiv 4 \ (\textit{мод.}\ 8n+7)$$

что невозможно. Итакъ, оба сравненія

$$x^2 \equiv a,\ x^{4n+3} \equiv a \ (\textit{мод.}\ 2\ (4n+3)+1)$$

при $a = 2\ (4n+3) - 1$ не имѣютъ рѣшенія, и слѣд. $2(4n+3) - 1$ есть первообразный корень, числа $2(4n+3)+1$.

На основаніи этой теоремы мы заключаемъ, что 2 есть первообразный корень 11, 59, 83, 107, 123, а 7 имѣетъ первообразнымъ корнемъ 5; 23 имѣетъ первообразнымъ корнемъ 21; 47 имѣетъ первообразнымъ корнемъ 45 и т. д.

III. **Теорема.** *Первообразный корень* $4N+1$, *при* N *простомъ и большемъ* 2, *есть* 2.

Доказательство. Если $p=4N+1$, и, N простое, большее 2, то $p-1$ заключаетъ два простыхъ числа: 2 и N; поэтому a будетъ первообразнымъ корнемъ $4N+1$, если сравненіе

$$x^2 \equiv a,\ x^N \equiv a \ (\textit{мод.}\ 4N+1)$$

не имѣютъ рѣшенія. Докажемъ же, что это случается при $a = 2$. При $a = 2$ первое сравненіе будетъ

$$x^2 \equiv 2 \ (\textit{мод.}\ 4N+1).$$

Но N нечетное число; слѣд., вида $2n+1$, а потому $4N+1 = 8n+5$, въ этомъ же случаѣ, по 32-й теоремѣ,

$$\left(\frac{2}{4N+1}\right) = -1.$$

и, слѣд., сравненіе

$$x^2 \equiv 2 \ (\textit{мод.}\ 4N+1)$$

не имѣетъ рѣшенія. Чтоже касается до втораго, оно приводится къ

$$x^N \equiv 2 \ (\textit{мод.}\ 4N+1).$$

www.rcin.org.pl

Возведя обѣ части этого сравненія въ четвертую степень и замѣтивъ, что по теоремѣ Фермата $x^{4N} \equiv 1$ (*мод.* $4N + 1$), находимъ

$$1 \equiv 16 \text{ (мод. } 4N + 1),$$

или

$$3\,5 \equiv 0 \text{ (мод. } 4N + 1).$$

Но это сравненіе невозможно: ибо оно предполагаетъ 3 или 5 дѣлящимся на простое число $4N + 1$, гдѣ $N > 2$. Слѣд., оба сравненія

$$x^2 \equiv a,\ x^N \equiv a \text{ (мод. } 4N + 1)$$

при $a = 2$ не имѣютъ рѣшенія, а потому 2 есть первообразный корень числа $4N + 1$.

Такъ числа 13, 29, 53, 149, 173, 269, 293, 317,.... будутъ имѣть первообразнымъ корнемъ 2.

IV. **Теорема**. *Число* $4.2^m N + 1$, *при* N *простомъ превосходящемъ* $\frac{9^{2^m}}{4.2^m}$, $m > 0$, *будетъ имѣть первообразнымъ корнемъ* 3.

Доказательство. Если $p = 4.2^m.N + 1$ и N простое, то $p - 1$ заключаетъ только два простыхъ числа: 2 и N. Въ этомъ случаѣ a будетъ первообразнымъ корнемъ числа p, если сравненія

$$x^2 \equiv a,\ x^N \equiv a \text{ (мод. } 4.2^m N + 1)$$

не имѣютъ рѣшенія. Посмотримъ же, могутъ ли они имѣть рѣшеніе при $a = 3$, когда N, по положенію, число простое, болѣе $\frac{9^{2^m}}{4.2^m}$ и, слѣд., болѣе 3 и на 3 не дѣлится. Въ этомъ случаѣ N будетъ или вида $3n + 1$ или $3n - 1$. Слѣд., будетъ

$$N \equiv \pm 1 \text{ (мод. } 3).$$

Но изъ сравненія $2 \equiv -1$ (*мод.* 3), возводя его въ степень $m + 2$, выводимъ

$$2^{m+2} \equiv \pm 1 \text{ (мод. } 3).$$

Откуда слѣдуетъ, что

$$2^{m+2} N \equiv \pm 1 \text{ (мод. } 3)$$

а потому $4.2^m N + 1$ будетъ сравнимо по модулю 3 или съ 0, или съ 2. Первое не можетъ имѣть мѣста: ибо оно предпо-

GABINET MATEMATYCZNY Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

www.rcin.org.pl

лагаетъ дѣлимость простаго числа $4.2^m N + 1$ на 3; во второмъ же случаѣ $\left(\frac{4.2^m N+1}{3}\right)$ равно $\left(\frac{2}{3}\right) = -1$. Но, по закону взаимности двухъ простыхъ чиселъ, имѣемъ

$$\left(\frac{4.2^m N+1}{3}\right) = \left(\frac{3}{4.2^m N+1}\right). \text{ Слѣд., } \left(\frac{3}{4.2^m N+1}\right) = -1,$$

что обнаруживаетъ невозможность сравненія

$$x^2 \equiv 3 \ (\textit{мод.}\ 4.2^m N + 1).$$

Намъ остается доказать, что сравненіе

$$x^N \equiv 3 \ (\textit{мод.}\ 4.2^m N + 1)$$

въ сдѣланныхъ нами предположеніяхъ не имѣетъ рѣшенія. Для этого мы возводимъ обѣ части его въ степень 4.2^m и замѣчая, что теоремѣ Фермата $x^{4.2^m N} \equiv 1 \ (\textit{мод.}\ 4.2^m N + 1)$, получаемъ

$$1 \equiv 3^{4.2^m} \ (\textit{мод.}\ 4.2^m N + 1);$$

откуда слѣдуетъ

$$(3^{2.2^m} + 1)\ (3^{2.2^m} - 1) \equiv 0 \ (\textit{мод.}\ 4.2^m N + 1),$$

что предполагаетъ дѣлимость одного изъ чиселъ $3^{2.2^m} + 1$ $3^{2.2^m} - 1$ на $4.2^m N + 1$, а это невозможно: ибо N по положенію болѣе $\frac{9^{2^m}}{4.2^m}$, и, слѣд., $4.2^m N + 1$ превосходитъ $9^{2^m} + 1$, или $3^{2.2^m} + 1$.

Итакъ, въ сдѣланныхъ нами предположеніяхъ оба сравненія

$$x^2 \equiv a, \ x^N \equiv a \ (\textit{мод.}\ 4.2^m N + 1)$$

при $a = 3$ не имѣютъ рѣшенія; слѣд., число $4.2^m N + 1$ имѣетъ первообразнымъ корнемъ 3.

Такъ, числа 89, 233, 569, 809, 857 вида $8N + 1$ и 5009 вида $16N + 1$ имѣютъ первообразнымъ корнемъ 3.

---

www.rcin.org.pl

III

Объ опредѣленіи числа простыхъ чиселъ, не превосходящихъ данной величины.

Мы видѣли (§ 2), какъ могутъ быть опредѣлены всѣ простыя числа отъ 1 до даннаго числа. Такимъ образомъ можно опредѣлять, сколько простыхъ чиселъ, меньшихъ даннаго предѣла. Но такое опредѣленіе числа простыхъ чиселъ, меньшихъ даннаго предѣла, представляетъ большія трудности, когда за предѣлъ принимаемъ большое число. Мы займемся теперь опредѣленіемъ этого числа по приближенію, и покажемъ на основаніи этого рѣшеніе нѣкоторыхъ вопросовъ.

Во второмъ томѣ Теоріи чиселъ Лежандръ предлагаетъ формулу для приближеннаго опредѣленія числа простыхъ чиселъ, меньшихъ даннаго числа. Свою формулу Лежандръ повѣряетъ таблицею простыхъ чиселъ отъ 10000 до 1000000, и потомъ прилагаетъ ее къ рѣшенію нѣкоторыхъ вопросовъ Теоріи чиселъ. Не смотря на видимое согласіе формулы Лежандра съ таблицею простыхъ чиселъ, мы не можемъ не изъявить сомнѣнія на счетъ строгости ея, и въ слѣдствіе того не можемъ признать вѣрными выводы, на ней основанные. Къ такому заключенію приводитъ насъ одна теорема относительно свойствъ функціи, опредѣляющей число простыхъ чиселъ, меньшихъ даннаго числа, теорема, изъ которой могутъ быть выведены многія любопытныя предложенія.

Мы займемся теперь изложеніемъ этой теоремы, а потомъ покажемъ нѣкоторыя изъ ея приложеній.

Теорема, которая будетъ предметомъ нашихъ изслѣдованій, заключается въ слѣдующемъ:

1. **Теорема**. *Если* $\varphi(x)$ *означаетъ число простыхъ чиселъ меньшихъ* x, *и какое либо число цѣлое,* ρ *количество* > 0, *то въ суммѣ*

$$\sum_{x=2}^{x=\infty} \left[\varphi(x+1) - \varphi(x) - \frac{1}{\log x} \right] \frac{\log^n x}{x^{1+\rho}}$$

www.rcin.org.pl

мы будемъ имѣть такую функцію, которая съ приближеніемъ ρ *къ* 0, *приближается къ конечному предѣлу.*

Доказательство. Мы докажемъ сначала, что такое свойство принадлежитъ функціямъ, получаемымъ черезъ дифференцированіе нѣсколько разъ выраженій

$$\Sigma \frac{1}{m^{1+\rho}} - \frac{1}{\rho}, \log\rho - \Sigma \log\left(1 - \frac{1}{\mu^{1+\rho}}\right),$$

$$\Sigma \log\left(1 - \frac{1}{\mu^{1+\rho}}\right) + \Sigma \frac{1}{\mu^{1+\rho}}$$

по ρ, предполагая здѣсь и вездѣ впослѣдствіи суммированіе по m распространеннымъ на всѣ числа отъ $m=2$ до $m=\infty$, суммированіе же по μ распространеннымъ на одни простыя числа отъ $\mu = 2$ до $\mu = \infty$.

Начнемъ съ перваго. Не трудно убѣдиться, что

$$\int_0^\infty \frac{e^{-x}}{e^x - 1} x^\rho dx = \Sigma \frac{1}{m^{1+\rho}} \cdot \int_0^\infty e^{-x} x^\rho dx,$$

$$\int_0^\infty e^{-x} x^{-1+\rho} dx = \frac{1}{\rho} \int_0^\infty e^{-x} x^\rho dx$$

а потому

$$\Sigma \frac{1}{m^{1+\rho}} - \frac{1}{\rho} = \frac{\int_0^\infty \left(\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{x}\right) e^{-x} x^\rho dx}{\int_0^\infty e^{-x} x^\rho dx}$$

Изъ этого уравненія видно, что производная n порядка отъ $\Sigma \frac{1}{m^{1+\rho}} - \frac{1}{\rho}$ по ρ будетъ выражаться дробью, у которой знаменателемъ будетъ $\left[\int_0^\infty e^{-x} x^\rho dx\right]^{n+1}$, а числителемъ цѣлая функція интегралovъ

$$\int_0^\infty \left(\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{x}\right) e^{-x} x^\rho dx, \int_0^\infty \frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{x}\Big) e^{-x} x^\rho \log x dx$$

$$\int_0^\infty \left(\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{x}\right) e^x x^\rho \log^2 x dx, \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

$$\ldots\ldots\ldots\int_0^\infty \left(\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{x}\right) e^{-x} x^\rho \log^n x dx, \int_0^\infty e^{-x} x^\rho dx,$$

$$\int_0^\infty e^{-x} x \log x dx, \int_0^\infty e^{-x} x^\rho \log^2 x dx, \ldots \int_0^\infty e^{-x} x^\rho \log^n x dx.$$

www.rcin.org.pl

Но такая дробь, будетъ ли $n = 0$, или > 0, приближается къ конечному предѣлу съ приближеніемъ ρ къ 0: ибо предѣлъ интеграла $c\int_0^\infty e^{-x}x^\rho dx$ при $\rho = 0$ есть 1; интегралы же

$$\int_0^\infty \left(\frac{1}{e^x-1} - \frac{1}{x}\right)e^{-x}x^\rho dx,\ \int_0^\infty \left(\frac{1}{e^x-1} - \frac{1}{x}\right)e^{-x}x^\rho \log x dx,$$

$$\int_0^\infty \left(\frac{1}{e^x-1} - \frac{1}{x}\right)e^{-x}x^\rho \log^2 x dx, \ldots\ldots \int_0^\infty \left(\frac{1}{e^x-1} - \frac{1}{x}\right)e^{-x}x^\rho \log^n x dx,$$

$$\int_0^\infty e^{-x}x^\rho \log x dx, \int_0^\infty e^{-x}x^\rho \log^2 x dx, \ldots \int_0^\infty e^{-x}x^\rho \log^n x dx$$

при $\rho = 0$, очевидно, сохраняютъ конечную величину.

И такъ, съ приближеніемъ ρ къ 0 всѣ производныя отъ $\Sigma\frac{1}{m^{1+\rho}} - \frac{1}{\rho}$, также какъ и сама $\Sigma\frac{1}{m^{1+\rho}} - \frac{1}{\rho}$, будутъ имѣть предѣломъ величину конечную.

Обращаемся теперь къ функціи

$$\log\rho - \Sigma\log\left(1 - \frac{1}{\mu^{1+\rho}}\right).$$

Извѣстно, что

$$\left[\left(1-\frac{1}{2^{1+\rho}}\right)\left(1-\frac{1}{3^{1+\rho}}\right)\left(1-\frac{1}{5^{1+\rho}}\right)\ldots\ldots\right]^{-1}$$

$$= 1 + \frac{1}{2^{1+\rho}} + \frac{1}{3^{1+\rho}} + \frac{1}{4^{1+\rho}} + \ldots\ldots;$$

откуда выходитъ

$$-\log\left(1-\frac{1}{2^{1+\rho}}\right) - \log\left(1-\frac{1}{3^{1+\rho}}\right) - \log\left(1-\frac{1}{5^{1+\rho}}\right)\cdots$$

$$= \log\left(1 + \frac{1}{2^{1+\rho}} + \frac{1}{3^{1+\rho}} + \frac{1}{4^{1+\rho}}\cdots\right),$$

что по нашему знакоположенію напишется такъ

$$-\Sigma\log\left(1-\frac{1}{\mu^{1+\rho}}\right) = \log\left(1 - \Sigma\frac{1}{m^{1+\rho}}\right);$$

слѣдовательно

$$\log\rho - \Sigma\log\left(1-\frac{1}{\mu^{1+\rho}}\right) = \log\left(1 + \Sigma\frac{1}{m^{1+\rho}}\right)\rho;$$

а потому

$$\log\rho - \Sigma\log\left(1-\frac{1}{\mu^{1+\rho}}\right) = \log\left[1 + \rho + \left(\Sigma\frac{1}{m^{1+\rho}} - \frac{1}{\rho}\right)\rho\right].$$

www.rcin.org.pl

Изъ этого уравненія видно, что производныя

$$\log\rho - \Sigma\log\left(1 - \frac{1}{\mu^{1+\rho}}\right)$$

по ρ выразятся конечнымъ числомъ дробей, у которыхъ знаменателями будутъ цѣлыя, положительныя степени

$$1 + \rho + \left(\Sigma\frac{1}{m^{1+\rho}} - \frac{1}{\rho}\right)\rho,$$

а числители будутъ цѣлыя функціи количества ρ, выраженія $\Sigma\frac{1}{m^{1+\rho}} - \frac{1}{\rho}$ и производныхъ его по ρ. Но такія дроби съ приближеніемъ ρ къ 0 приближаются къ конечному предѣлу: ибо выраженіе $1 + \rho + \left(\Sigma\frac{1}{m^{1+\rho}} - \frac{1}{\rho}\right)\rho$, составляющее знаменателей этихъ дробей, съ приближеніемъ ρ къ 0 приближается къ 1 (потому что $\Sigma\frac{1}{m^{1+\rho}} - \frac{1}{\rho}$, какъ доказали, при этомъ остается конечною величиною); функція же $\Sigma\frac{1}{m^{1+\rho}} - \frac{1}{\rho}$ и производныя ея, входящія въ составъ числителей этихъ дробей, по доказанному нами, съ приближеніемъ ρ къ 0 приближаются къ конечному предѣлу.

Намъ остается теперь доказать это же относительно производныхъ

$$\Sigma\log\left(1 - \frac{1}{\mu^{1+\rho}}\right) + \Sigma\frac{1}{\mu^{1+\rho}}.$$

Для этого мы замѣчаемъ, что первая производная этой функціи есть

$$\Sigma\frac{1}{\mu^{2+2\rho}}\cdot\frac{\log\mu}{1 - \frac{1}{\mu^{1+\rho}}}.$$

По виду же этой функціи не трудно замѣтить, что ея высшія производныя выразятся конечнымъ числомъ членовъ вида

$$\Sigma\frac{1}{\mu^{2+2\rho}}\cdot\frac{\log^p\mu}{1 - \frac{1}{\mu^{1+\rho}}}\cdot\frac{1}{\mu^s\left(1 - \frac{1}{\eta^{1+\rho}}\right)^r},$$

гдѣ p, q, r, s, не < 0. Но каждый изъ такихъ членовъ для $\rho = 0$

www.rcin.org.pl

и $\rho > 0$ имѣетъ конечную величину: ибо для $\rho = 0$ и $\rho > 0$ функція, состоящая подъ знакомъ Σ, относительно $\frac{1}{\mu}$ будетъ безконечно-малое порядка не ниже втораго.

Убѣдившись такимъ образомъ, что производныя отъ выраженій

$$\Sigma \frac{1}{m^{1+\rho}} - \frac{1}{\rho}, \quad \log \rho - \Sigma \log\left(1 - \frac{1}{\mu^{1+\rho}}\right),$$

$$\Sigma \log\left(1 - \frac{1}{\mu^{1+\rho}}\right) + \Sigma \frac{1}{\mu^{1+\rho}},$$

съ приближеніемъ ρ къ 0 приближаются къ конечному предѣлу, мы заключаемъ тоже и о выраженіи

$$\frac{d^n\left[\Sigma \log\left(1 - \frac{1}{\mu^{1+\rho}}\right) + \Sigma \frac{1}{\mu^{1+\rho}}\right]}{d\rho^n} + \frac{d^n\left[\log \rho - \Sigma \log\left(1 - \frac{1}{\mu^{1+\rho}}\right)\right]}{d\rho^n}$$

$$+ \frac{d^{n-1}\left(\Sigma \frac{1}{m^{1+\rho}} - \frac{1}{\rho}\right)}{d\rho^{n-1}},$$

которое по выполненіи дифференцированія и сокращеніи приводится къ слѣдующему

$$\pm\left(\Sigma \frac{\log^n \mu}{\mu^{1+\rho}} - \Sigma \frac{\log^{n-1} m}{m^{1+\rho}}\right),$$

въ чемъ и заключается предложенная нами теорема: ибо, какъ не трудно замѣтить, по нашему знакоположенію выраженіе

$$\Sigma \frac{\log^n \mu}{\mu^{1+\rho}} - \Sigma \frac{\log^{n-1} m}{n^{1+\rho}}$$

тождественно выраженію

$$\sum_{x=2}^{x=\infty} \left[\varphi(x+1) - \varphi(x) - \frac{1}{\log x}\right] \frac{\log^n x}{x^{1+\rho}},$$

Въ самомъ дѣлѣ, послѣднее выраженіе есть разность двухъ

$$\sum_{x=2}^{x=\infty} \left[\varphi(x+1) - \varphi(x)\right] \frac{\log^n x}{x^{1+\rho}}, \quad \sum_{x=2}^{x=\infty} \frac{\log^{n-1} x}{x^{1+\rho}},$$

www.rcin.org.pl

изъ которыхъ первое приводится къ $\Sigma \frac{\log^n \mu}{\mu^{1+\rho}}$ (суммѣ значеній $\frac{\log^n x}{x^{1+\rho}}$, соотвѣтствующихъ простымъ числамъ): ибо $\varphi\,(x+1)$ и $\varphi\,(x)$, означая число простыхъ чиселъ, меньшихъ $x+1$ и x, въ разности $\varphi\,(x+1)-\varphi\,(x)$ даютъ 1, когда x число простое, и 0, если x число составное; второе же перемѣною x на m обращается въ $\Sigma \frac{\log^{n-1} m}{m^{1+\rho}}$.

Такъ убѣждаемся въ справедливости предложенной нами теоремы.

Изъ доказанной нами теоремы можно вывести многія любопытныя свойства функціи, опредѣляющей число простыхъ чиселъ, меньшихъ даннаго предѣла. Для этого мы замѣчаемъ, что разность $\frac{1}{\log x} - \int_x^{x+1} \frac{dx}{\log x}$, при x большомъ, есть безконечно малое относительно $\frac{1}{x}$ порядка перваго; а потому выраженіе

$$\left(\frac{1}{\log x} - \int_x^{x+1} \frac{dx}{\log x}\right) \frac{\log^n x}{x^{1+\rho}}$$

при x большомъ будетъ относительно $\frac{1}{x}$ порядка $2+\rho$, и, слѣд., при ρ не < 0, сумма

$$\sum_{x=2}^{x=\infty} \left(\frac{1}{\log x} - \int_x^{x+1} \frac{dx}{\log x}\right) \frac{\log^n x}{x^{1+\rho}}$$

будетъ имѣть значеніе конечное. Складывая же эту сумму съ выраженіемъ

$$\sum_{x=2}^{x=\infty} \left[\varphi(x+1) - \varphi(x) - \frac{1}{\log x}\right] \frac{\log^n x}{x^{1+\rho}},$$

о которомъ сейчасъ доказали теорему 1-ю, на основаніи ея заключаемъ, что значеніе

$$\sum_{x=2}^{x=\infty} \left[\varphi(x+1) - \varphi(x) - \int_x^{x+1} \frac{dx}{\log x}\right] \frac{\log^n x}{x^{1+\rho}}\, dx$$

съ приближеніемъ ρ къ 0 приближается къ конечному предѣлу. А отсюда не трудно вывести слѣдующую теорему:

www.rcin.org.pl

II. *Теорема. Отъ* $x = 2$ *до* $x = \infty$ *функція* $\varphi(x)$, *означающая число простыхъ чиселъ меньшихъ* x, *удовлетворяетъ безконечное число разъ и неравенству* $\varphi(x) > \int_2^x \frac{dx}{\log x} - \frac{ax}{\log^n x}$ *и неравенству* $\varphi(x) < \int_2^x \frac{dx}{\log x} + \frac{ax}{\log^n x}$, *какъ бы* α, *оставаясь количествомъ положительнымъ, ни было мало, а* n *ни было велико.*

Доказательство. Мы ограничимся здѣсь доказательствомъ втораго неравенства, первое докажется подобнымъ образомъ. Для доказательства, что неравенству

$$\varphi(x) < \int_2^x \frac{dx}{\log x} + \frac{ax}{\log^n x} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (1)$$

удовлетворяетъ безконечное множество чиселъ, допустимъ противное, и посмотримъ, къ чему приведетъ насъ это допущеніе. Допустивъ, что неравенству (1) удовлетворяетъ конечное число чиселъ, положимъ, что a есть цѣлое число, превосходящее и количество e^n и наибольшее число, удовлетворяющее неравенству (1). Въ этомъ предположеніи для $x > a$ будетъ

$$\varphi(x) > \int_2^x \frac{dx}{\log x} + \frac{ax}{\log^n x}, \quad \log x > n,$$

и, слѣд.,

$$\varphi(x) - \int_2^x \frac{dx}{\log x} > \frac{ax}{\log^n x}, \quad \frac{n}{\log x} < 1 \quad \ldots\ldots (2)$$

Но въ этомъ случаѣ, какъ сейчасъ увидимъ, въ противность доказаннаго нами значеніе выраженія

$$\sum_{x=2}^{x=\infty} \left[\varphi(x+1) - \varphi(x) - \int_x^{x+1} \frac{dx}{\log x} \right] \frac{\log^n x}{x^{1+\rho}}$$

будетъ приближаться къ $+\infty$ съ приближеніемъ ρ къ 0. Въ самомъ дѣлѣ, это выраженіе мы можемъ разсматривать, какъ предѣлъ

$$\sum_{x=2}^{x=s} \left[\varphi(x+1) - \varphi(x) - \int_x^{x+1} \frac{dx}{\log x} \right] \frac{\log^n x}{x^{1+\rho}}$$

при $s = \infty$. Предполагая же $s > a$, это выраженіе мы можемъ разсматривать какъ сумму

www.rcin.org.pl

$$C+\sum_{x=a+1}^{x=s}\left[\varphi(x+1)-\varphi(x)-\int_x^{x+1}\frac{dx}{\log x}\right]\frac{\log^n x}{x^{1+\rho}}, \quad \ldots\ldots\ldots \quad (3)$$

называя черезъ C сумму

$$\sum_{x=2}^{x=a}\left[\varphi(x+1)-\varphi(x)-\int_x^{x+1}\frac{dx}{\log x}\right]\frac{\log^n x}{x^{1+\rho}};$$

которая, очевидно, сохраняетъ конечное значеніе при $\rho = 0$ и $\rho > 0$.

Далѣе, по формулѣ

$$\sum_{a+1}^{s} u_x(v_{x+1}-v_x)=u_s v_{s+1}-u_a v_{a+1}-\sum_{a+1}^{s} v_x(u_x-u_{x-1}),$$

полагая

$$v_x=\varphi(x)-\int_2^x\frac{dx}{\log x},\quad u_x=\frac{\log^n x}{x^{1+\rho}},$$

выраженіе (3) преобразуемъ въ такое

$$C-\left[\varphi(a+1)-\int_x^{n+1}\frac{dx}{\log x}\right]\frac{\log^n a}{a^{1+\rho}}+\left[\varphi(s+1)-\int_2^{s+1}\frac{dx}{\log x}\right]\frac{\log^n s}{s^{1+\rho}}-$$

$$-\sum_{x=a+1}^{x=s}\left[\varphi(x)-\int_2^x\frac{dx}{\log x}\right]\left[\frac{\log^n x}{x^{1+\rho}}-\frac{\log^n(x-1)}{(x-1)^{1+\rho}}\right],$$

а это, называя черезъ θ количество > 0 и < 1, можемъ написать такъ

$$C-\left[\varphi(a+1)-\int_2^{a+1}\frac{dx}{\log x}\right]\frac{\log^n a}{a^{1+\rho}}+\left[\varphi(s+1)-\int_2^{s+1}\frac{dx}{\log x}\right]\frac{\log^n s}{s^{1+\rho}}+$$

$$+\sum_{x=a+1}^{x=s}\left[\varphi(x)-\int_2^x\frac{dx}{\log x}\right]\left[1+\rho-\frac{n}{\log(x-\theta)}\right]\frac{\log^n(x-\theta)}{(x-\theta)^{2+\rho}}.$$

Полагая же два первые члена этого выраженія равными F, и замѣчая по (2), что третій членъ > 0, мы убѣждаемся, что все это выраженіе болѣе

$$F+\sum_{x=a+1}^{x=s}\left[\varphi(x)-\int_2^x\frac{dx}{\log x}\right]\left[1+\rho-\frac{n}{\log(x-\theta)}\right]\frac{\log^n(x-\theta)}{(x-\theta)^{2+\rho}}.$$

Изъ тѣхъ же неравенствъ (2) видно, что здѣсь подъ знакомъ суммы, въ предѣлахъ суммированія, функція сохраняетъ

www.rcin.org.pl

знакъ $+$. Притомъ въ предѣлахъ суммированія будетъ во 1-хъ) $1+\rho-\frac{n}{\log(x-\theta)}$, болѣе $1-\frac{n}{\log a}$: ибо $\rho > 0$, x не $> a+1$, $\theta < 1$; во 2) $\varphi(x) - \int_2^x \frac{dx}{\log^n x}$ болѣе $\frac{a(x-\theta)}{\log^n(x-\theta)}$: ибо $\varphi(x) - \int_2^x \frac{dx}{\log x}$ не меньше $\frac{ax}{\log^n x}$ по первому изъ неравенствъ (2), а по второму производная $\frac{\alpha x}{\log^n x}$, которая есть $\frac{\alpha}{\log^n x}\left(1-\frac{n}{\log x}\right)$, болѣе 0, вслѣдствіе чего $\frac{\alpha x}{\log^n x} > \frac{(x-\theta)}{\log^n(x-\theta)}$.

А потому предыдущее выраженіе болѣе

$$F+\sum_{x=a+1}^{x=s}\frac{\alpha(x-\theta)}{\log^n(x-\theta)}\left(1-\frac{a}{\log^n}\right)\frac{\log^n(x-\theta)}{(x-\theta)^{1+\rho}}.$$

Но это, по сокращеніи, приводится къ слѣдующему

$$F+a\left(1-\frac{n}{\log a}\right)\sum_{x=a+1}^{x=1}\frac{1}{(x-\theta)^{1+\rho}},$$

что, очевидно, болѣе

$$F+a\left(1-\frac{n}{\log\alpha}\right)\sum_{x=a+1}^{x=s}\frac{1}{x^{1+\rho}}.$$

А это для $s=\infty$ будетъ

$$F+\alpha\left(1-\frac{n}{\log\alpha}\right)\sum_{x=a+1}^{x=\infty}\frac{1}{x^{1+\rho}},$$

и съ помощію опредѣленныхъ интеграловъ напишется такъ

$$F+\alpha\left(1-\frac{n}{\log x}\right)\frac{\int_0^\infty \frac{e^{-ax}}{e^x-1}x^0dx}{\int_0^\infty e^{-x}x^\rho dx}.$$

Но это выраженіе, очевидно, съ уменьшеніемъ ρ приближается къ $+\infty$: ибо $\int_0^\infty \frac{e^{-ax}}{e^x-1}dx = +\infty$, $\int_0^\infty e^{-x}dx = 1$, а α по положенію и $1-\frac{n}{\log x}$ вслѣдствіе (2) суть количества положительныя.

Убѣдившись такимъ образомъ, что въ сдѣланномъ нами предположеніи не только сумма

$$\sum_{x=2}^{x=\infty}\left[\varphi(x+1)-\varphi(x)-\int_x^{x+1}\frac{dx}{\log x}\right]\frac{\log^n x}{x^{1+\rho}},$$

www.rcin.org.pl

но и количество меньшее его съ приближеніемъ ρ къ 0 приближается къ $+\infty$, мы заключаемъ о несправедливости его, что и слѣдовало доказать.

На основаніи предыдущей теоремы легко доказать слѣдующую.

III. **Теорема.** *Выраженіе* $\frac{x}{\varphi(x)} - \log x$ *при* $x = \infty$ *не можетъ имѣть предѣломъ количество отличное отъ* -1.

Доказательство. Пусть будетъ L предѣлъ значенія $\frac{x}{\varphi(x)} - \log x$ при $x = \infty$. Въ этомъ предположеніи мы всегда найдемъ число N столь большое, что при $x > N$ значеніе $\frac{x}{\varphi(x)} - \log x$ не будетъ выходить изъ предѣловъ $L - \varepsilon$ и $L + \varepsilon$, какъ бы ε ни было мало. Слѣд., для такихъ величинъ x, при $\varepsilon > 0$, будетъ

$$\frac{x}{\varphi(x)} - \log x > L - \varepsilon, \frac{x}{\varphi(x)} - \log x < L + \varepsilon \ldots\ldots\ldots (4)$$

Но по предыдущей теоремѣ, неравенства

$$\varphi(x) > \int_2^x \frac{dx}{\log x} - \frac{\alpha x}{\log^n x}, \quad \varphi(x) < \int_2^x \frac{dx}{\log x} + \frac{\alpha x}{\log^n x}$$

удовлетворяются при безконечномъ множествѣ величинъ x и, слѣд., при нѣкоторыхъ числахъ $x > N$, для которыхъ имѣютъ мѣсто неравенства (4). Но эти неравенства въ соединеніи съ послѣдними даютъ

$$\frac{x}{\int_2^x \frac{dx}{\log x} - \frac{\alpha x}{\log^n x}} - \log x > L - \varepsilon, \quad \frac{x}{\int_2^x \frac{dx}{\log x} + \frac{\alpha x}{\log^n x}} - \log x < L + \varepsilon;$$

откуда выходитъ

$$L + 1 < \frac{x - (\log x - 1)\left(\int_2^x \frac{dx}{\log x} - \frac{\alpha x}{\log^n x}\right)}{\int_2^x \frac{dx}{\log x} - \frac{\alpha x}{\log^n x}} + \varepsilon,$$

$$L + 1 > \frac{x - (\log x - 1)\left(\int_2^x \frac{dx}{\log x} + \frac{\alpha x}{\log^n x}\right)}{\int_2^x \frac{dx}{\log x} + \frac{\alpha x}{\log^n x}} - \varepsilon.$$

www.rcin.org.pl

Изъ этихъ неравенствъ видно, что численная величина $L+1$ не превосходитъ численной величины одного изъ выраженій

$$\frac{x-(\log x-1)\left(\int_2^x \frac{dx}{\log x} \mp \frac{ax}{\log^n x}\right)}{\int_2^x \frac{dx}{\log x} \mp \frac{ax}{\log^n x}} \pm \varepsilon.$$

Но количество ε можетъ быть сдѣлано, какъ замѣтили, по произволу мало, предполагая N чрезвычайно большимъ; тоже случается, при увеличиваніи x, съ выраженіемъ

$$\frac{x-(\log x-1)\left(\int_2^x \frac{dx}{\log x} \mp \frac{ax}{\log^n x}\right)}{\int_2^x \frac{dx}{\log x} \mp \frac{ax}{\log^n x}};$$

ибо въ предѣлѣ этихъ выраженій для $x=\infty$, по извѣстнымъ пріемамъ дифференціальнаго исчисленія, мы открываемъ 0. Убѣдясь такимъ образомъ, что выраженіе

$$\frac{x-(\log x-1)\left(\int_2^x \frac{dx}{\log x} \mp \frac{ax}{\log^n x}\right)}{\int_2^x \frac{dx}{\log x} \mp \frac{ax}{\log^n x}} \pm \varepsilon,$$

опредѣляющее высшій предѣлъ численной величины $L+1$, можетъ быть сдѣлано по произволу малымъ, мы по способу предѣловъ заключаемъ, что $L+1=0$, а потому $L=-1$, что и слѣдовало доказать.

Доказанное нами относительно предѣла значеній $\frac{x}{\varphi(x)} - \log x$ при $x=\infty$ противорѣчитъ формулѣ, предложенной Лежандромъ для приближеннаго опредѣленія числа простыхъ чиселъ меньшихъ даннаго. По его мнѣнію, при x большомъ значеніе $\varphi(x)$ можетъ быть опредѣлено съ достаточною точностію уравненіемъ

$$\varphi(x) = \frac{x}{\log x - 1{,}08366}.$$

Но отсюда для предѣла $\frac{x}{\varphi(x)} - \log x$ при $x=\infty$ находимъ $-1{,}08366$, вмѣсто -1.

На основаніи теоремы II можно показать высшій предѣлъ

www.rcin.org.pl

точности, съ которою $\varphi(x)$, опредѣляющая число простыхъ чиселъ меньшихъ x, можетъ быть представлена какою либо данною функціею fx. При этомъ разность $fx - \varphi(x)$ мы будемъ сравнивать съ выраженіями

$$\frac{x}{\log x}, \frac{x}{\log^2 x}, \frac{x}{\log^3 x}, \ldots.$$

и для сокращенія будемъ называть A количествомъ порядка $\frac{x}{\log^n x}$, если отношеніе A къ $\frac{x}{\log^m x}$ при $x = \infty$ будетъ ∞ для $m > n$ и 0 для $m < n$. Условившись въ этомъ, мы докажемъ слѣдующую теорему:

IV. **Теорема**. *Если выраженіе*

$$\frac{\log^n x}{x}\left(fx - \int_2^x \frac{dx}{\log x}\right),$$

при $x = \infty$ имѣетъ предѣломъ количество конечное или безконечность, то fx не можетъ представить $\varphi(x)$ вѣрно до количествъ порядка $\frac{x}{\log^n x}$ включительно.

Доказательство. Пусть будетъ L предѣлъ, къ которому значеніе

$$\frac{\log^n x}{x}\left(f(x) - \int_2^x \frac{dx}{\log x}\right)$$

приближается съ приближеніемъ x къ ∞. Количество L, не будучи 0 по положенію, можетъ быть или количествомъ положительнымъ, или отрицательнымъ. Мы его предположимъ количествомъ положительнымъ; но сужденія наши безъ затрудненія приложатся и къ случаю $L < 0$.

Если значеніе

$$\frac{\log^n x}{x}\left(f(x) - \int_2^x \frac{dx}{\log x}\right)$$

съ приближеніемъ x къ ∞ имѣетъ предѣломъ L, большее 0, то мы найдемъ число N столь большое, что для $x > N$ значеніе $\frac{\log^n x}{x}\left(f(x) - \int_2^x \frac{dx}{\log x}\right)$ останется постоянно болѣе нѣкотораго положительнаго количества l. Слѣд., предполагая $x > N$, мы будемъ имѣть

www.rcin.org.pl

$$\frac{\log^n x}{x}\left(f(x)-\int_2^x \frac{dx}{\log x}\right) > l \ldots\ldots\ldots (5)$$

Но по II теоремѣ, какъ бы $\alpha = \frac{l}{2}$ ни было мало, для безконечнаго множества чиселъ будетъ имѣть мѣсто такое неравенство

$$\varphi(x) < \int_2^x \frac{dx}{\log x} + \frac{\alpha x}{\log^n x}, \ldots\ldots\ldots\ldots (6)$$

которое даетъ

$$f(x) - \int_2^x \frac{dx}{\log x} < f(x) - \varphi(x) + \frac{\alpha x}{\log^n x},$$

что по умноженіи на $\frac{\log^n x}{x}$ и по положенію $\alpha = \frac{l}{2}$ будетъ

$$\frac{\log^n x}{x}\left[f(x) - \int_2^x \frac{dx}{\log x}\right] < \frac{\log^n x}{x}\left[f(x) - \varphi\ x)\right] + \frac{l}{2},$$

а отсюда, вслѣдствіе неравенства (5) выходитъ

$$\frac{\log^n x}{x}\left[f(x) - \varphi(x)\right] > \frac{l}{2}.$$

Но это это неравенство, существуя вмѣстѣ съ неравенствами (5) и (6) для безконечнаго множества чиселъ, по причинѣ $\frac{l}{2} > 0$, обнаруживаетъ, что предѣлъ

$$\frac{\log^n x}{x}\left[f(x) - \varphi(x)\right]$$

при $x = \infty$ не есть нуль. Если же этотъ предѣлъ отличенъ отъ 0, то разность $fx - \varphi x$ по сдѣланному нами опредѣленію есть количество порядка $\frac{x}{\log^n x}$ или низшаго; и, слѣд., $f(x)$ разнится съ $\varphi(x)$ или количествомъ порядка $\frac{x}{\log^n x}$ или порядка низшаго, что и слѣдовало доказать.

На основаніи этой теоремы мы узнаемъ, что формула Лежандра $\frac{x}{\log x - 1{,}08366}$, для которой

$$\frac{\log^2 x}{x}\left(\frac{x}{\log^2 x - 1{,}08366} - \int_2^x \frac{dx}{\log x}\right),$$

при $x = \infty$ имѣетъ предѣломъ величину 0,08366, не можетъ

www.rcin.org.pl

выражать $\varphi(x)$, число простыхъ чиселъ, меньшихъ x, вѣрно до количествъ порядка $\frac{x}{\log^2 x}$ включительно.

Также не трудно показать на основаніи этой теоремы величины постоянныхъ A и B, при которыхъ функція $\frac{x}{Ax+B}$ могла бы выражать $\varphi(x)$ вѣрно до количествъ порядка $\frac{x}{\log^2 x}$ включительно. По предыдущей теоремѣ такія величины A и B должны удовлетворять уравненію

$$lim. \left[\frac{\log^2 x}{x}\left(\frac{x}{A\log x+B}-\int_2^x \frac{dx}{\log x}\right)\right]_{x=\infty}=0.$$

Но разложеніемъ $\frac{x}{A\log x+B}$ въ рядъ находимъ

$$\frac{x}{A\log x+B}=\frac{1}{A}\cdot\frac{x}{\log x}-\frac{B}{A^2}\cdot\frac{x}{\log^2 x}+\frac{B^2}{A^3}\cdot\frac{x}{\log^3 x}-\ldots.$$

Интегрируя же $\int_2^x \frac{dx}{\log y}$ по частямъ, имѣемъ

$$\int_2^x \frac{x}{\log x}=\frac{x}{\log x}+\frac{x}{\log^2 x}+2\int_2^x \frac{dx}{\log^3 x}+C.$$

Вслѣдствіе чего предыдущее уравненіе измѣняется въ слѣдующее

$$lim. \left\{\frac{\log^2 x}{x}\left(\begin{matrix}\frac{1}{A}\cdot\frac{x}{\log x}-\frac{B}{A^2}\cdot\frac{x}{\log^2 x}+\frac{B^2}{A^3}\cdot\frac{x}{\log^3 x}-\ldots \\ \ldots-\frac{x}{\log x}-\frac{x}{\log^2 x}-2\int_2^x\frac{dx}{\log^3 x}-C\end{matrix}\right)\right\}_{x=\infty}=0,$$

что приводится къ такому уравненію

$$lim. \left\{\begin{matrix}\left(\frac{1}{A}-1\right)\log x-\left(\frac{B}{A^2}+1\right)+\frac{B^2}{A}\frac{1}{\log x}-\ldots \\ \ldots-2\frac{\log^2 x}{x}\int_2^x\frac{dx}{\log^3 x}-C\frac{\log^2 x}{x}\end{matrix}\right\}_{x=\infty}=0.$$

Замѣчая же, что здѣсь всѣ члены, начиная съ третьяго, приближаются къ 0 съ увеличеніемъ x, мы убѣждаемся, что это уравненіе можетъ быть удовлетворено только предположеніемъ $\frac{1}{A}-1=0$, $\frac{B}{A^2}+1=0$. Откуда $A=1$, $B=-1$.

www.rcin.org.pl

Итакъ, изъ функцій вида $\frac{x}{A\log x+B}$ одна функція $\frac{x}{\log x-1}$ могла бы выразить $\varphi(x)$ вѣрно до количествъ порядка $\frac{x}{\log^2 x}$ включительно.

Что же касается до выбора функціи, наближе выражающей $\varphi(x)$, число простыхъ чиселъ, меньшихъ даннаго числа, то относительно ея можно доказать такую теорему.

V. **Теорема.** *Если функція* $\varphi(x)$, *опредѣляющая число простыхъ чиселъ меньшихъ* x, *можетъ быть выражена вѣрно до количествъ порядка* $\frac{x}{\log^n x}$ *включительно алгебраически въ* x, $\log x$, e^x, *то такое выраженіе ея есть*

$$\frac{x}{\log x}+\frac{1.x}{\log^2 x}+\frac{1\,2.x}{\log^3 x}+\ldots+\frac{1.2.3\ldots(n-1)x}{\log^n x}.$$

Доказательство. Пусть будетъ $f(x)$ та функція, которая, заключая алгебраически x, $\log x$, e^x, выражаетъ $\varphi(x)$ вѣрно до количествъ порядка $\frac{x}{\log^n x}$ включительно; выраженіе

$$\frac{\log^n x}{x}\left[f(x)-\frac{x}{\log x}-\frac{1.x}{\log^2 x}-\frac{1.2.x}{\log^3 x}-\ldots.-\frac{1.2.3\ldots(n-1)x}{\log^n x}\right]$$

съ увеличеніемъ x должно приближаться къ какому либо предѣлу конечному или безконечно великому: ибо въ противномъ случаѣ первая производная этого выраженія съ увеличеніемъ x до ∞ мѣняла бы свой знакъ безконечное число разъ; а это, какъ легко замѣтить, не можетъ случиться съ функціею алгебраическою отъ x, $\log x$, e^x (*).

(*) Что алгебраическая функція отъ x, $\log x$, перестаетъ мѣнять свой знакъ при x, превосходящемъ нѣкоторый предѣлъ, въ этомъ не трудно убѣдиться. Для функціи цѣлой это ясно; знакъ такой функціи при довольно большомъ x будетъ зависѣть отъ одного члена вида $kx^{m'}.\log^{m''}x.e^{m'''x}$, который не мѣняетъ знака при $x<1$. Для всякой же другой алгебраической функціи x, $\log x$, e^x, которая пусть будетъ y, это докажется такимъ образомъ. Функція y вообще будетъ корнемъ уравненія $u_0\gamma^m+u_1\gamma^{m-1}+\ldots+u_{m-1}\gamma+u_m=0$, и если v будетъ функція, получаемая черезъ исключеніе y изъ предыдущаго уравненія и первой производной его по x, то функціи u_0, u_m, v, какъ цѣлыя, перестанутъ мѣнять свой знакъ и обращаться въ 0 при x превосходящемъ нѣкоторый предѣлъ, а при этомъ и y будетъ сохранять свой знакъ: ибо при величинахъ x, необращающихъ

www.rcin.org.pl

Итакъ, для $\varphi(x)$ необходимо будетъ

$$lim. \left\{ \frac{\log^n x}{x} \left(f(x) - \frac{x}{\log x} - \frac{1.x}{\log^2 x} - \frac{1.2x}{\log^3 x} - \ldots \right. \right. \\ \left. \left. \ldots\ldots\ldots\ldots - \frac{1.2.3.\ldots.(n-1)x}{\log^n x} \right) \right\}_{x=\infty} = L \ldots (7)$$

Но съ другой стороны не трудно убѣдиться, что

$$lim \left[\frac{\log^n x}{x} \left(\frac{x}{\log x} + \frac{1.x}{\log^2 x} + \frac{1.2x}{\log^3 x} + \ldots \right. \right. \\ \left. \left. \ldots + \frac{1.2\ldots(n-1)x}{\log^n x} - \int_2^x \frac{dx}{\log x} \right) \right]_{x=\infty} = 0,$$

а это уравненіе, сложенное съ предыдущимъ, даетъ

$$lim. \left[\frac{\log^n x}{x} \left(f(x) - \int_2^x \frac{dx}{\log x} \right) \right]_{x=\infty} = L.$$

Но такъ какъ, по положенію, fx выражаетъ $\varphi(x)$ вѣрно до количества порядка $\frac{x}{\log^n x}$ включительно; а по предыдущей теоремѣ это не можетъ имѣть мѣсто, если предѣлъ значенія

$$\frac{\log^n x}{x} \left[f(x) - \int_2^x \frac{dx}{\log x} \right];$$

при $x = \infty$ не есть 0. Слѣд., $L = 0$, и уравненіе (7) даетъ

$$lim. \left\{ \frac{\log^n x}{x} \left[f(x) - \frac{x}{\log x} - \frac{1.x}{\log^2 x} - \frac{1.2.x}{\log^3 x} - \ldots \right. \right. \\ \left. \left. \ldots - \frac{1.2.3\ldots.(n-1)x}{\log^n x} \right] \right\}_{x=\infty} = 0,$$

а это показываетъ, что функція

$$\frac{x}{\log x} + \frac{1.x}{\log^2 x} + \frac{1.2x}{\log^3 x} + \ldots + \frac{1.2.3\ldots(n-1)x}{\log^n x}$$

не разнится съ fx количествами порядка $\frac{x}{\log^n x}$ и низшими, и, слѣд., что она подобно fx можетъ выражать $\varphi(x)$ вѣрно до ко-

---

v въ нуль, не можетъ имѣть уравненіе равныхъ корней; а при неравенствѣ корней знакъ одного изъ нихъ можетъ перемѣниться только съ перемѣною знака u_0 или u_m. Это свойство можетъ быть также доказано и для многихъ другихъ функцій, и на всѣ эти функціи будетъ распространяться теорема V и заключенія, изъ нея вытекающія.

www.rcin.org.pl

личествъ порядка $\frac{x}{\log^n x}$ включительно, что и требовалось доказать.

На основаніи доказанной нами теоремы мы заключаемъ, что если $\varphi(x)$, функція, опредѣляющая число простыхъ чиселъ меньшихъ x, можетъ быть выражена алгебраически въ x, $\log x$, e^x вѣрно до количествъ порядковъ $\frac{x}{\log x}$, $\frac{x}{\log^2 x}$, $\frac{x}{\log^3 x}$, ..., включительно; то такое выраженіе ея есть

$$\frac{x}{\log x}, \frac{x}{\log x} + \frac{1.x}{\log^2 x}, \frac{x}{\log x} + \frac{1.x}{\log^2 x} + \frac{1.2.x}{\log^3 x} \ldots.$$

А такъ какъ эти функціи суть ни что иное, какъ значеніе интеграла $\int_2^x \frac{dx}{\log x}$ вѣрное до количествъ порядка $\frac{x}{\log x}$, $\frac{x}{\log^2 x}$, $\frac{x}{\log^3 x}$,....., то во всѣхъ этихъ предположеніяхъ интегралъ $\int_2^x \frac{dx}{\log x}$ будетъ выражать $\varphi(x)$ вѣрно до количествъ такого порядка, до какого она способна выразиться алгебраически въ x, $\log x$, e^x. Что интегралъ $\int_2^x \frac{dx}{\log x}$ при x большомъ выражаетъ довольно близко число простыхъ чиселъ, меньшихъ x, въ этомъ мы легко убѣждаемся помощію таблицъ простыхъ чиселъ. Но эти таблицы, доселѣ составленныя, слишкомъ малы, чтобы видѣть изъ нихъ превосходство формулы $\int_2^x \frac{dx}{\log x}$ предъ формулою Лежандра $\frac{x}{\log x - 1{,}08366}$ или подобными ей. Въ предѣлахъ этихъ таблицъ функціи $\int_2^x \frac{dx}{\log x}$, $\frac{x}{\log x - 1{,}08366}$ мало разнятся; но разность ихъ $\frac{x}{\log x - 1{,}08366} - \int_2^x \frac{dx}{\log x}$, имѣя *minimum* при $x = e^{\left(\frac{1{,}08366}{0{,}08366}\right)^2} = 1247646$, послѣ него постоянно возрастаетъ до ∞ и при $x > 10000000$ получаетъ уже довольно большую величину. При этихъ-то величинахъ x можно будетъ обнаружить преимущество формулы $\int_2^x \frac{dx}{\log x}$ передъ $\frac{x}{\log x - 1{,}08366}$. Но для этого потребна таблица простыхъ чиселъ гораздо обширнѣе тѣхъ, которыя мы до сихъ поръ имѣемъ.

Принявши для приближеннаго опредѣленія $\varphi(x)$ интегралъ

www.rcin.org.pl

$\int_2^x \frac{dx}{\log x}$, мы должны будемъ измѣнить всѣ формулы Лежандра, выведенныя имъ въ предположеніи $\varphi(x) = \frac{x}{\log x - 1{,}08366}$, и формулы наши будутъ не сложнѣе его. Въ слѣдствіе же доказанныхъ нами теоремъ онѣ должны быть ближе къ истинѣ.

Для примѣра мы найдемъ здѣсь приближенныя формулы для опредѣленія значеній

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \ldots\ldots + \frac{1}{X},$$

$$\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{5}\right)\ldots\ldots\left(1-\frac{1}{X}\right)$$

при X большомъ.

Для опредѣленія перваго мы замѣчаемъ, что по нашему знакоположенію будетъ

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \ldots\ldots + \frac{1}{X} = \sum_{x=2}^{x=X} \frac{\varphi(x+1) - \varphi(x)}{x},$$

ибо $\varphi(x)$, означая число простыхъ чиселъ меньшихъ x, въ разности $\varphi(x+1) - \varphi(x)$ даетъ 0, когда x число составное, и 1, когда оно простое.

Предполагая X числомъ большимъ, назовемъ λ какое нибудь число менѣе X, но еще довольно значительное, дабы въ предѣлахъ $x = \lambda$ и $x = X$, мы могли съ достаточною точностію замѣнить $\varphi(x)$ интегралом $\int_2^x \frac{dx}{\log x}$. Въ этомъ предположеніи предыдущее уравненіе напишется такъ

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \ldots\ldots + \frac{1}{X} = \sum_{x=2}^{x=\lambda-1} \frac{\varphi(x+1) - \varphi(x)}{x} + \sum_{x=\lambda}^{x=X} \frac{\varphi(x+1) - \varphi(x)}{x}.$$

Замѣняя же здѣсь во второй суммѣ $\varphi(x)$ интегралом $\int_2^x \frac{dx}{\log x}$, найдемъ

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \ldots + \frac{1}{X} = \sum_{x=2}^{x=\lambda-1} \frac{\varphi(x+1) - \varphi(x)}{x} + \sum_{x=\lambda}^{x=X} \frac{\int_x^{x+1} \frac{dx}{\log x}}{x}.$$

www.rcin.org.pl

Но вѣрно до количества порядка $\frac{1}{x}$ интегралъ $\int_x^{x+1} \frac{dx}{\log x}$ можетъ быть замѣненъ выраженіемъ $\frac{1}{\log x}$, и съ такою же точностію сумма $\sum_{x=\lambda}^{x=X} \frac{1}{x \log x}$ можетъ быть замѣна интеграломъ $\int_\lambda^X \frac{dx}{x \log x}$.

Но такою перемѣною предыдущее уравненіе приводится къ слѣдующему

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots\ldots+\frac{1}{X}=\sum_{x=2}^{x=\lambda-1}\frac{\varphi(x+1)-\varphi x}{x}+\int_\lambda^x \frac{dx}{x \log x},$$

что по выполненіи интегрированія даетъ

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\ldots\ldots+\frac{1}{X}=\sum_{x=2}^{x=\lambda-1}\frac{\varphi(x+1)-\varphi(x)}{x}-1\log\lambda+1\log X,$$

или

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\ldots.+\frac{1}{X}=C+1\log X,\ldots\ldots\ldots(8)$$

полагая C равнымъ количеству $\sum_{x=2}^{x=\lambda-1}\frac{\varphi(x+1)-\varphi(x)}{x}-1\log\lambda$, не зависящему отъ X.

Вотъ уравненіе, которое по опредѣленіи постояннаго C, можетъ намъ служить для приближеннаго вычисленія суммы

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\ldots\ldots+\frac{1}{X},$$

когда X велико.

Наше выраженіе этой суммы проще выраженія ея у Лежандра, которое такого вида

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\ldots.+\frac{1}{X}=\log(\log X-0{,}08366)+C.$$

Теперь переходимъ къ опредѣленію произведенія

www.rcin.org.pl

$$\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{5}\right)\ldots\left(1-\frac{1}{X}\right)=P,$$

Полагая это произведеніе равнымъ P, и взявъ логарифмы отъ обѣихъ частей уравненія

$$\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{5}\right)\ldots\left(1-\frac{1}{X}\right)=P,$$

находимъ

$$\log P=\log\left(1-\frac{1}{2}\right)+\log\left(1-\frac{1}{3}\right)+\log\left(1-\frac{1}{5}\right)+\ldots\ldots$$
$$\ldots+\log\left(1-\frac{1}{X}\right),$$

что иначе напишется такъ

$$\log P=-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\ldots+\frac{1}{X}\right)+\frac{1}{2}+\log\left(1-\frac{1}{2}\right)+$$
$$\frac{1}{3}+\log\left(1-\frac{1}{3}\right)+\frac{1}{5}+\log\left(1-\frac{1}{5}\right)+\ldots+\frac{1}{X}+\log\left(1-\frac{1}{X}\right),$$

А здѣсь вѣрно до количествъ порядка $\frac{1}{X}$ можемъ замѣнить конечный рядъ

$$\frac{1}{2}+\log\left(1-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{3}+\log\left(1-\frac{1}{3}\right)+\frac{1}{5}+\log\left(1-\frac{1}{5}\right)+\ldots$$
$$\ldots+\frac{1}{X}+\log\left(1-\frac{1}{X}\right)$$

рядомъ безконечнымъ

$$\frac{1}{2}+\log\left(1-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{3}+\log\left(1-\frac{1}{3}\right)+\frac{1}{5}+\log\left(1-\frac{1}{5}\right)+\ldots;$$

ибо разность этихъ рядовъ меньше

$$\frac{1}{X+1}+\log\left(1-\frac{1}{X+1}\right)+\frac{1}{X+2}+\log\left(1-\frac{1}{X+2}\right)+\ldots,$$

а это меньше интеграла $\int_X^\infty\left[\frac{1}{x}+\log\left(1-\frac{1}{X}\right)\right]dx$, который равенъ $1-(X-1)\log\left(1-\frac{1}{X}\right)$, и котораго величина при X большомъ есть безконечно малое относительно $\frac{1}{X}$ перваго порядка.

www.rcin.org.pl

Итакъ до количества порядка $\frac{1}{X}$ въ предыдущемъ выраженіи $\log P$ мы можемъ замѣнить конечную сумму

$$\frac{1}{2}+\log\left(1-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{3}+\log\left(1-\frac{1}{3}\right)+\frac{1}{5}+\log\left(1-\frac{1}{5}\right)+\ldots.+\frac{1}{X}+\log\left(1-\frac{1}{X}\right)$$

безконечнымъ рядомъ

$$\frac{1}{2}+\log\left(1-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{3}+\log\left(1-\frac{1}{3}\right)+\frac{1}{5}+\log\left(1-\frac{1}{5}\right)+\ldots,$$

и называя для сокращенія величину послѣдняго черезъ C', мы предыдущее выраженіе $\log P$ представимъ такъ

$$\log P=-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\ldots.+\frac{1}{X}\right)+C'.$$

Внеся же сюда значеніе

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\ldots.+\frac{1}{X}$$

изъ (8), найдемъ

$$\log P=-C-\operatorname{llog} X+C',$$

откуда выходитъ

$$P=e^{\frac{C'-C}{\log X}},$$

гдѣ полагая для сокращенія $e^{C'-C}=C_0$ и замѣняя P его величиною $\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{5}\right)\ldots.\left(1-\frac{1}{X}\right)$, имѣемъ

$$\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{5}\right)\ldots.\left(1-\frac{1}{X}\right)=\frac{C_0}{\log X}.$$

Вмѣсто этой формулы Лежандръ нашелъ такую

$$\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{5}\right)\ldots.\left(1-\frac{1}{X}\right)=\frac{C_0}{\log X-0{,}08366}.$$

PANSTW. INSTYTUT MAT. BIBLIOTEKA

www.rcin.org.pl

ТАБЛИЦА ПРОСТЫХЪ ЧИСЕЛЪ,

НЕ ПРЕВОСХОДЯЩИХЪ 6000.

2	**283**	**661**	**1087**	**1523**	**1993**	**2437**
3	293	673	1091	1531	1997	2441
5	307	677	1093	1543	1999	2447
7	311	683	1097	1549	2003	2459
11	313	691	1103	1553	2011	2467
13	317	701	1109	1559	2017	2473
17	331	709	1117	1567	2027	2477
19	337	719	1123	1571	2029	2503
23	347	727	1129	1579	2039	2521
29	349	733	1151	1583	2053	2531
31	**353**	**739**	**1153**	**1597**	**2063**	**2539**
37	359	743	1163	1601	2069	2543
41	367	751	1171	1607	2081	2549
43	373	757	1181	1609	2083	2551
47	379	761	1187	1613	2087	2557
53	383	769	1193	1619	2089	2579
59	389	773	1201	1621	2099	2591
61	397	787	1213	1627	2111	2593
67	401	797	1217	1637	2113	2609
71	409	809	1223	1657	2129	2617
73	**419**	**811**	**1229**	**1663**	**2131**	**2621**
79	421	821	1231	1667	2137	2633
83	431	823	1237	1669	2141	2647
89	433	827	1249	1693	2143	2657
97	439	729	1259	1697	2153	2659
101	443	839	1277	1699	2161	2663
103	449	853	1279	1709	2179	2671
107	457	857	1283	1721	2203	2677
109	461	859	1289	1723	2207	2683
113	463	863	1291	1733	2213	2687
127	**467**	**877**	**1297**	**1741**	**2221**	**2689**
131	479	881	1301	1747	2237	2693
137	487	883	1303	1753	2239	2699
139	491	887	1307	1759	2243	2707
149	499	907	1319	1777	2251	2711
151	503	911	1321	1783	2267	2713
157	509	919	1327	1787	2269	2719
163	521	929	1361	1789	2273	2729
167	523	937	1367	1801	2281	2731
173	541	941	1373	1811	2287	2741
179	**547**	**947**	**1381**	**1823**	**2293**	**2749**
181	557	953	1399	1831	2297	2753
191	563	967	1409	1847	2309	2767
193	569	971	1423	1861	2311	2777
197	571	977	1427	1867	2333	2789
199	577	983	1429	1871	2339	2791
211	587	991	1433	1873	2341	2797
223	593	997	1439	1877	2347	2801
227	599	1009	1447	1879	2351	2803
229	601	1013	1451	1889	2357	2819
233	**607**	**1019**	**1453**	**1901**	**2371**	**2833**
239	613	1021	1459	1907	2377	2837
241	617	1031	1471	1913	2381	2843
251	619	1033	1481	1931	2383	2851
257	631	1039	1483	1933	2389	2857
263	641	1049	1487	1951	2393	2861
269	643	1051	1489	1959	2399	2879
271	647	1061	1493	1973	2411	2887
277	653	1063	1499	1979	2417	2897
281	659	1069	1511	1987	2423	2903

www.rcin.org.pl

2909	**3433**	**3911**	**4421**	**4943**	**5449**	**5953**
2917	3449	3917	4423	4951	5471	5981
2927	3457	3919	4441	4957	5477	5987
2939	3461	3923	4447	4967	5479	
2953	3463	3929	4451	4969	5483	
2957	3467	3931	4457	4973	5501	
2963	3469	3943	4463	4987	5503	
2969	3491	3947	4481	4993	5507	
2971	3499	3967	4483	4999	5519	
2999	3511	3989	4493	5003	5521	
3001	**3517**	**4001**	**4507**	**5009**	**5527**	
3011	3527	4003	4513	5011	5531	
3019	3529	4007	4517	5021	5557	
3023	3533	4013	4519	5023	5563	
3037	3539	4019	4523	5039	5569	
3041	3541	4021	4547	5051	5573	
3049	3547	4027	4549	5059	5581	
3061	3557	4049	4561	5077	5591	
3067	3559	4051	4567	5081	5623	
3079	3571	4057	4583	5087	5639	
3083	**3581**	**4073**	**4591**	**5099**	**5641**	
3089	3583	4079	4597	5101	5647	
3109	3593	4091	4603	5107	5651	
3119	3607	4093	4621	5113	5653	
3121	3613	4099	4637	5119	5657	
3137	3617	4111	4639	5147	5659	
3163	3623	4127	4643	5153	5669	
3167	3631	4129	4649	5167	5683	
3169	3637	4133	4651	5171	5689	
3181	3643	4139	4657	5179	5693	
3187	**3659**	**4153**	**4663**	**5189**	**5701**	
3191	3671	4157	4673	5197	5711	
3203	3673	4159	4679	5209	5717	
3209	3677	4177	4691	5227	5737	
3217	3691	4201	4703	5231	5741	
3221	3697	4211	4721	5233	5743	
3229	3701	4217	4723	5237	5749	
3251	3709	4219	4729	5261	5779	
3253	3719	4229	4733	5273	5783	
3257	3727	4231	4751	5279	5791	
3259	**3733**	**4241**	**4759**	**5281**	**5801**	
3271	3739	4243	4783	5297	5807	
3299	3761	4253	4787	5303	5813	
3301	3767	4259	4789	5309	5821	
3307	3769	4261	4793	5323	5827	
3313	3779	4271	4799	5333	5839	
3319	3793	4273	4801	5347	5843	
3323	3797	4283	4813	5351	5849	
3329	3803	4289	4817	5381	5851	
3331	3821	4297	4831	5387	5857	
3343	**3823**	**4327**	**4861**	**5393**	**5861**	
3347	4833	4337	4871	5399	5867	
3359	3847	4339	4877	5407	5869	
3361	3851	4349	4889	5413	5879	
3371	3853	4357	4903	5417	5881	
3373	3863	4363	4909	5419	5897	
3389	3877	4373	4919	5431	5903	
3391	3881	4391	4931	5437	5923	
3407	3889	4397	4933	5441	5927	
3413	3907	4409	4937	5443	5939	

www.rcin.org.pl

ТАБЛИЦЫ

ПЕРВООБРАЗНЫХЪ КОРНЕЙ И УКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОСТЫХЪ МОДУЛЕЙ, не ПРЕВОСХОДЯЩИХЪ 200.

Простое число 2. Первообр. корень 2. *Основаніе 2.*

I.

N.	1	2
	0	1

N.

I.	0	1
	1	2

Простое число 5. Первообразные корни: 2, 3. *Основаніе 2.*

I.

N.	1	2	3	4
	0	1	3	2

N.

I.	0	1	2	3
	1	2	4	3

Простое число 7. Первообразные корни: 3, 5. *Основаніе 3.*

I.

N.	1	2	3	4	5	6
	0	2	1	4	5	3

N.

I.	0	1	2	3	4	5
	1	3	2	6	4	5

Простое число 11. Первообразные корни: 2, 6, 7, 8. *Основаніе 6.*

I.

N.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	1	8	2	4	9	7	3	6	5

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	2	4	8	5	10	9	7	3	6

Простое число 13. Первообразные корни: 2, 6, 7, 11. *Основаніе 6.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	0 11	5	8	10	9	1	7	3	4

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4	1 6 11	10	8	9	2	12	7	3	5

Простое число 17. Первообразные корни: 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14. *Основаніе 10.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	0 13	10 15	11 12	4 3	7 2	5 8	9	14	6

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	1 3	10 13	15 11	14 8	4 12	6	9	5	16	7

Простое число 19. Первообразные корни: 2, 3, 10, 13, 14, 15. *Основаніе 10.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	0 6	17 3	5 13	16 11	2 7	4 14	12 8	15 9	10

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1 9	10 14	5 7	12 13	6 16	3 8	11 4	15 2	17	18

www.rcin.org.pl

Простое число 23. Первообразные корни: 5, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21.
Основаніе 10.

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		0	8	20	16	15	6	21	2	18
1	1	3	14	12	7	13	10	17	2	5
2	9	19	11							

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	10	8	11	18	19	6	14	2	20
1	16	22	13	15	12	5	4	17	9	21
2	3	7								

Простое число 29. Первообразные корни: 2, 3, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 26, 27.
Основаніе 10.

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	11	27	22	18	10	20	5	26
1	1	23	21	2	3	17	16	7	9	15
2	12	19	6	24	4	8	13	25	14	

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	10	13	14	24	8	22	17	25	18
1	6	2	20	26	28	19	16	15	5	21
2	7	12	4	11	23	27	9	3		

Простое число 31. Первообразные корни: 3, 11, 12, 13, 17, 21, 22, 24. *Основаніе 17.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	12	13	24	20	25	4	6	26
1	2	29	7	23	16	3	18	1	8	22
2	14	17	11	21	19	10	5	9	28	27
3	15									

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	17	10	15	7	26	8	12	18	27
1	25	22	2	3	20	30	14	21	16	24
2	5	23	19	13	4	6	9	29	28	11

Простое число 37. Первообразные корни: 2, 5, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 32, 35
Основаніе 5.

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	11	34	22	1	9	28	33	32
1	12	6	20	13	3	35	8	5	7	25
2	23	26	17	21	31	2	24	30	14	15
3	10	27	19	4	16	29	18			

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	5	25	14	33	17	11	18	16	6
1	30	2	10	13	28	29	31	22	36	32
2	12	23	4	20	26	19	21	31	7	35
3	27	24	9	8	3	15				

Простое число 41. Первообразные корни: 6, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 34, 35. *Основаніе 6.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	26	15	12	22	1	39	38	30
1	8	3	27	31	25	37	24	33	16	9
2	34	14	29	36	13	4	17	5	11	7
3	23	28	10	18	19	21	2	32	35	6
4	20									

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	6	36	11	25	27	39	29	10	19
1	32	28	4	24	21	3	18	26	33	34
2	40	35	5	30	16	14	2	12	31	22
3	9	13	37	17	20	38	23	15	8	7

Простое число 43. Первообразные корни: 3, 5, 12, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 30, 33, 34.
Основаніе 28.

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	39	17	36	5	14	7	33	34
1	2	6	11	40	4	22	30	16	31	29
2	41	24	3	20	8	10	37	9	1	25
3	19	32	27	23	13	12	28	35	26	15
4	38	18	21							

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	28	10	22	14	5	11	7	24	27
1	25	12	35	34	6	39	17	3	41	30
2	23	42	15	33	21	29	38	32	36	19
3	16	18	31	8	9	37	4	26	40	2
4	13	20								

www.rcin.org.pl

Простое число 47. Первообразные корни: 5, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45. *Основаніе 10.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	30	18	14	17	2	38	44	36
1	1	27	32	3	22	35	28	42	20	29
2	31	10	11	39	16	34	33	8	6	43
3	19	5	12	45	26	9	4	24	13	21
4	15	25	40	37	41	7	23			

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	10	6	13	36	31	28	45	27	35
1	21	22	32	38	4	40	24	5	3	30
2	18	39	14	46	37	41	34	11	16	19
3	2	20	12	26	25	15	9	43	7	23
4	42	44	17	29	8	33				

Простое число 53. Первообразные корни: 2, 3, 5, 8, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 45, 48, 50, 51. *Основаніе 26.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		0	25	9	50	31	34	38	23	18
1	4	46	7	28	11	40	48	42	43	41
2	29	47	19	39	32	10	1	27	36	6
3	13	45	21	3	15	17	16	22	14	37
4	2	33	20	30	44	49	12	8	5	24
5	35	51	26							

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	26	40	33	10	48	29	12	47	3
1	25	14	46	30	38	34	36	35	9	22
2	42	32	37	8	49	2	52	27	13	20
3	43	5	24	41	6	50	28	39	7	23
4	15	19	17	18	44	31	11	21	16	45
5	4	51								

Простое число 59. Первообразные корни: 2, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 50, 52, 54, 55, 57. *Основаніе 10.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		0	25	32	50	34	57	44	17	6
1	1	45	24	23	11	8	42	14	31	22
2	26	18	12	27	49	10	48	38	36	4
3	33	7	9	19	39	20	56	41	47	55
4	51	2	43	13	37	40	52	53	16	30
5	35	46	15	28	5	21	3	54	29	

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	10	41	56	29	54	9	31	15	32
1	25	14	22	43	17	52	48	8	21	33
2	35	55	19	13	12	2	20	23	53	58
3	49	18	3	30	5	50	28	44	27	34
4	45	37	16	42	7	11	51	38	26	24
5	4	40	46	47	57	39	36	6		

Простое число 61. Первообразные корни: 2, 6, 7, 10, 17, 18, 26, 30, 31, 35, 43, 44, 51, 54, 55, 59. *Основаніе 10.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	47	42	34	14	29	23	21	24
1	1	45	16	20	10	56	8	49	11	22
2	48	5	32	39	3	28	7	6	57	25
3	43	13	55	27	36	37	58	33	9	2
4	35	18	52	41	19	38	26	40	50	46
5	15	31	54	51	53	59	44	4	12	17
6	30									

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	10	39	24	57	21	27	26	16	38
1	14	18	58	31	5	50	12	59	41	44
2	13	8	19	7	9	29	46	33	25	6
3	60	51	22	37	4	40	34	35	45	23
4	47	43	3	30	56	11	49	2	20	17
5	48	53	42	54	52	32	15	28	36	55

www.rcin.org.pl

Простое число 67. Первообразные корни: 2, 7, 11, 12, 13, 18, 20, 28, 31, 32, 34, 41, 44, 46, 48, 50, 51, 57, 61, 63. *Основаніе 12.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	29	9	58	39	38	7	21	18
1	2	61	1	23	36	48	50	8	17	26
2	31	16	24	20	30	12	52	27	65	22
3	11	43	13	4	37	46	10	44	55	32
4	60	19	45	63	53	57	49	64	59	14
5	41	17	15	3	56	34	28	35	51	54
6	40	5	6	25	42	62	33			

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	12	10	53	33	61	62	7	17	3
1	36	30	25	32	49	52	21	51	9	41
2	23	8	29	13	22	63	19	27	56	2
3	24	20	39	66	55	57	14	34	6	5
4	60	50	64	31	37	42	35	38	15	46
5	16	58	26	44	59	38	54	45	4	48
6	40	11	65	43	47	28				

Простое число 71. Первообразные корни: 7, 11, 13, 21, 22, 28, 31, 33, 35, 42, 44, 47, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69. *Основаніе 62.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	58	18	46	14	6	33	34	36
1	2	43	64	27	21	32	15	7	24	38
2	60	51	31	5	52	28	22	54	9	4
3	20	13	10	61	65	47	12	30	26	45
4	48	55	39	44	19	50	63	17	40	66
5	16	25	3	59	42	57	67	56	62	29
6	8	37	1	69	68	41	49	11	53	23
7	35									

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	62	10	52	29	23	6	17	60	28
1	32	67	36	31	5	26	50	47	3	44
2	30	14	16	69	18	51	38	13	25	59
3	37	22	15	7	8	70	9	61	19	42
4	48	65	54	11	43	39	4	35	40	66
5	45	21	24	68	27	41	57	55	2	53
6	20	33	58	46	12	34	49	56	64	63

Простое число 73. Первообразные корни: 5, 11, 13, 14, 15, 20, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 53, 58, 59, 60, 62, 68. *Основаніе 5.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	8	6	16	1	14	33	24	12
1	9	55	22	59	41	7	32	21	20	62
2	17	39	63	46	30	2	67	18	49	35
3	15	11	40	61	29	34	28	64	70	65
4	25	4	47	51	71	13	54	31	38	66
5	10	27	3	53	26	56	57	68	43	5
6	23	58	19	45	48	60	69	50	37	52
7	42	44	36							

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	5	25	52	41	59	3	15	2	10
1	50	31	9	45	6	30	4	20	27	62
2	18	17	12	60	8	40	54	51	36	34
3	24	47	16	7	35	29	72	68	48	21
4	32	14	70	58	71	63	23	42	64	28
5	67	43	69	53	46	11	55	56	61	13
6	65	33	19	22	37	39	49	26	57	66
7	38	44								

Простое число 79. Первообразные корни: 3, 6, 7, 28, 29, 30, 34, 35, 37, 39, 43, 47, 48, 53, 54, 59, 60, 63, 66, 68, 70, 74, 75, 77. *Основаніе 29.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	50	71	22	34	43	19	72	64
1	6	70	15	74	69	27	44	9	36	10
2	56	12	42	52	65	68	46	57	41	1
3	77	76	16	63	59	53	8	23	60	67
4	28	21	62	47	14	20	24	55	37	38
5	40	2	18	7	29	26	13	3	51	17
6	49	75	48	5	66	30	35	54	31	45
7	25	33	58	4	73	61	32	11	39	

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	29	51	57	73	63	10	53	36	17
1	19	77	21	56	44	12	32	59	52	7
2	45	41	4	37	46	70	55	15	40	54
3	65	68	76	71	5	66	18	48	49	78
4	50	28	22	6	16	69	26	43	62	60
5	2	58	23	35	67	47	20	27	72	34
6	38	75	42	33	9	24	64	39	25	14
7	11	3	8	74	13	61	31	30		

www.rcin.org.pl

Простое число 83. Первообразные корни: 2, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 32, 34, 35, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 76, 79, 80. *Основаніе 50.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	3	52	6	81	55	24	9	22
1	2	72	58	67	27	51	12	4	25	59
2	5	76	75	16	61	8	70	74	30	36
3	54	32	15	42	7	23	28	60	62	37
4	8	38	79	49	78	21	19	69	64	48
5	1	56	73	13	77	71	33	29	39	20
6	57	34	35	46	18	66	45	53	10	68
7	26	17	31	43	63	50	65	14	40	47
8	11	44	41							

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	50	10	2	17	20	4	34	40	8
1	68	80	16	53	77	32	23	71	64	46
2	59	45	9	35	7	18	70	14	36	57
3	28	72	31	56	61	62	29	39	41	58
4	78	82	33	73	81	66	63	79	49	43
5	75	15	3	67	30	6	51	60	12	19
6	37	24	38	74	48	76	65	13	69	47
7	26	55	11	52	27	22	21	54	44	42
8	25	5								

Простое число 89. Первообразные корни: 3, 6, 7, 13, 14, 15, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 41, 43, 46, 48, 51, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 70, 74, 75, 76, 82, 83, 86. *Основаніе 30.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	72	87	56	18	71	7	40	86
1	2	4	55	65	79	17	24	82	70	53
2	74	6	76	31	39	36	49	85	63	29
3	1	57	8	3	66	25	54	77	37	64
4	58	67	78	59	60	16	15	34	23	14
5	20	81	33	10	69	22	47	52	13	45
6	73	19	41	5	80	83	75	32	50	30
7	9	26	38	68	61	35	21	11	48	46
8	42	84	51	27	62	12	43	28	44	

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	30	10	33	11	63	21	7	32	70
1	53	77	85	58	49	46	45	15	5	61
2	50	76	55	48	16	35	71	83	87	29
3	69	23	67	52	47	75	25	38	72	24
4	8	62	80	86	88	59	79	56	78	26
5	68	82	57	19	36	12	4	31	40	43
6	44	74	84	28	39	13	34	41	73	54
7	18	6	2	60	20	66	22	37	42	14
8	64	51	17	65	81	27	9	3		

Простое число 97. Первообразные корни: 5, 7, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 26, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 56, 57, 58, 59, 60, 68, 71, 74, 76, 80, 82, 83, 84, 87, 90, 92. *Основаніе 10.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	86	2	76	11	88	53	66	4
1	1	82	78	83	43	13	56	19	90	27
2	87	55	72	79	68	22	73	6	33	47
3	3	26	46	84	9	64	80	41	17	85
4	77	71	45	44	62	15	69	60	58	10
5	12	21	63	14	92	93	23	29	37	65
6	89	32	16	57	36	94	74	51	95	81
7	54	25	70	20	31	24	7	39	75	42
8	67	8	61	91	35	30	34	49	52	18
9	5	40	59	28	50	38	48			

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	10	3	30	9	90	27	76	81	34
1	49	5	50	15	53	45	62	38	89	17
2	78	51	25	56	75	71	31	19	93	57
3	85	74	61	28	86	84	64	58	95	77
4	91	37	79	14	43	42	32	29	96	87
5	94	67	88	7	70	21	16	63	48	92
6	47	82	44	52	35	59	8	80	24	46
7	72	41	22	26	66	78	4	40	12	23
8	36	69	11	13	33	39	2	20	6	60
9	18	83	54	55	65	68				

www.rcin.org.pl

Простое число 101. Первообразные корни: 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15, 18, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 83, 86, 89, 90, 93, 94, 98, 99. *Основаніе 2.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	1	69	2	24	70	9	3	38
1	25	13	71	66	10	93	4	30	39	96
2	26	78	14	86	72	48	67	7	11	91
3	94	84	5	82	31	33	40	56	97	35
4	27	45	79	42	15	62	87	58	73	18
5	49	99	68	23	8	37	12	65	92	29
6	95	77	85	47	6	90	83	81	32	55
7	34	44	41	61	57	17	98	22	36	64
8	28	76	46	89	80	54	43	60	16	21
9	63	75	88	53	59	20	74	52	19	51
10	50									

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	2	4	8	16	32	64	27	54	7
1	14	28	56	11	22	44	88	75	49	98
2	95	89	77	53	5	10	20	40	80	59
3	17	34	68	35	70	39	78	55	9	18
4	36	72	43	86	71	41	82	63	25	50
5	100	99	97	93	85	69	37	74	47	94
6	87	73	45	90	79	57	13	26	52	3
7	6	12	24	48	96	91	81	61	21	42
8	84	67	33	66	31	62	23	46	92	83
9	65	29	58	15	30	60	19	38	76	51

Простое число 103. Первообразные корни: 5, 6, 11, 12, 20, 21, 35, 40, 43, 44, 45, 48, 51, 53, 54, 62, 65, 67, 70, 71, 74, 75, 77, 78, 84, 85, 86, 87, 88, 96, 99, 101. *Основаніе 6.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		102	46	57	92	59	1	32	36	12
1	3	29	47	66	78	14	82	50	58	28
2	49	89	75	90	93	16	10	69	22	76
3	60	99	26	86	96	91	2	81	74	21
4	95	94	33	55	19	71	34	17	37	64
5	62	5	56	11	13	88	68	85	20	70
6	4	84	43	44	72	23	30	53	40	45
7	35	77	48	9	25	73	18	61	67	42
8	39	24	38	100	79	7	101	31	65	27
9	15	98	80	54	63	87	83	52	8	41
10	6	97	51							

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	6	36	10	60	51	100	85	98	73
1	26	53	9	54	15	90	25	47	76	44
2	58	39	28	65	81	74	32	89	19	11
3	66	87	7	42	46	70	8	48	82	80
4	68	99	79	62	63	69	2	12	72	20
5	17	102	97	67	93	43	52	3	18	5
6	30	77	50	94	49	88	13	78	56	27
7	59	45	64	75	38	22	29	71	14	84
8	92	37	16	96	61	57	33	95	55	21
9	23	35	4	24	41	40	34	101	91	31
10	83	86								

www.rcin.org.pl

Простое число 107. Первообразные корни: 2, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 31, 32, 38, 43, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 80, 82, 84, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 103, 104. *Основаніе 65.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	95	78	84	13	67	57	73	50
1	2	76	56	58	46	91	62	105	39	96
2	97	29	65	60	45	26	47	22	35	72
3	80	21	51	48	94	70	28	6	85	30
4	86	90	18	93	54	63	49	16	34	8
5	15	77	36	64	11	89	24	68	61	87
6	69	102	10	1	40	71	37	33	83	32
7	59	81	17	41	101	104	74	27	19	88
8	75	100	79	98	7	12	82	44	43	92
9	52	9	38	99	5	3	23	55	103	20
10	4	14	66	31	25	42	53			

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	63	10	95	100	94	37	84	49	91
1	62	54	85	5	101	50	47	72	42	78
2	99	31	27	96	56	104	25	77	36	21
3	39	103	69	67	48	28	52	66	92	18
4	64	73	105	88	87	24	14	26	33	46
5	9	32	90	106	44	97	12	7	13	70
6	23	58	16	45	53	22	102	6	57	60
7	35	65	29	8	76	80	11	51	3	82
8	30	71	86	68	4	38	40	59	79	55
9	41	15	89	43	34	2	19	20	83	93
10	81	74	61	98	75	17				

Простое число 109. Первообразные корни: 6, 10, 11, 13, 14, 18, 24, 30, 37, 39, 40, 42, 44, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 65, 67, 69, 70, 72, 79, 85, 91, 95, 96, 98, 99, 103. *Основаніе 10.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	93	28	78	16	13	88	63	56
1	1	107	106	7	73	44	48	21	41	3
2	94	8	92	105	91	32	100	84	58	10
3	29	74	33	27	6	104	26	65	96	35
4	79	45	101	66	77	72	90	5	76	68
5	17	49	85	97	69	15	43	31	103	71
6	14	22	59	36	18	23	12	47	99	25
7	89	42	11	80	50	60	81	87	20	83
8	64	4	30	46	86	37	51	38	62	40
9	57	95	75	102	98	19	61	52	53	55
10	2	9	34	67	70	24	82	39	54	

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	10	100	19	81	47	34	13	21	101
1	29	72	66	6	60	55	5	50	64	95
2	78	17	61	65	105	69	36	33	3	30
3	82	57	25	32	102	39	63	85	87	107
4	89	18	71	56	15	41	83	67	16	51
5	74	86	97	98	108	99	9	90	28	62
6	75	96	88	8	80	37	43	103	49	54
7	104	59	45	14	31	92	48	44	4	40
8	73	76	106	79	27	52	84	77	7	70
9	46	24	22	2	20	91	38	53	94	68
10	26	42	93	58	35	23	12	11		

www.rcin.org.pl

Простое число 113. Первообразные корни: 3, 5, 6, 10, 12, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 33, 34, 37, 38, 39, 43, 45, 46, 47, 54, 55, 58, 59, 66, 67, 68, 70, 74, 75, 76, 79, 80, 84, 86, 89, 90, 92, 93, 94, 96, 100, 103, 107, 108, 110. *Основаніе 10.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	52	79	104	61	19	72	44	46
1	1	22	71	58	12	28	96	59	98	93
2	53	39	74	103	11	10	110	13	64	87
3	80	30	36	101	111	21	38	29	33	25
4	105	34	91	17	14	107	43	97	63	32
5	62	26	50	76	65	83	4	60	27	9
6	20	106	82	6	88	7	41	99	51	70
7	73	35	90	49	81	89	85	94	77	55
8	45	92	86	24	31	8	69	54	66	67
9	47	18	95	109	37	42	3	40	84	68
10	2	15	78	57	102	100	16	75	5	48
11	23	108	56							

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	10	100	96	56	108	63	65	85	59
1	25	24	14	27	44	101	106	43	91	6
2	60	35	11	110	83	39	51	58	15	37
3	31	84	49	38	41	71	32	94	36	21
4	97	66	95	46	8	80	9	90	109	73
5	52	68	2	20	87	79	112	103	13	17
6	57	5	50	48	28	54	88	89	99	86
7	69	12	7	70	22	107	53	78	102	3
8	30	74	62	55	98	76	82	29	64	75
9	72	42	81	19	77	92	16	47	18	67
10	105	33	104	23	4	40	61	45	111	93
11	26	34								

Простое число 127. Первообразные корни: 3, 6, 7, 12, 14, 23, 29, 39, 43, 45, 46, 48, 53, 55, 56, 57, 58, 65, 67, 78, 83, 85, 86, 91, 92, 93, 96, 97, 101, 106, 109, 110, 112, 114, 116, 118. *Основаніе 109.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	18	23	36	111	41	125	54	46
1	3	52	59	20	17	8	72	118	64	42
2	21	22	70	11	77	96	38	69	35	79
3	26	50	90	75	10	110	82	112	60	43
4	39	76	40	121	88	31	29	120	95	124
5	114	15	56	67	87	37	53	65	97	91
6	44	30	68	45	108	5	93	107	28	34
7	2	116	100	24	4	119	78	51	61	32
8	57	92	94	25	58	103	13	102	106	123
9	49	19	47	73	12	27	113	89	16	98
10	6	101	33	14	74	7	85	84	105	1
11	55	9	71	80	83	122	115	66	109	117
12	62	104	48	99	86	81	63			

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	109	70	10	74	65	100	105	15	111
1	34	23	94	86	103	51	98	14	2	91
2	13	20	21	3	73	83	30	95	68	46
3	61	45	79	102	69	28	4	55	26	40
4	42	6	19	39	60	63	9	92	122	90
5	31	77	11	56	8	110	52	80	84	12
6	38	78	120	126	18	57	117	53	62	27
7	22	112	16	93	104	33	41	24	76	29
8	113	125	36	114	107	106	124	54	44	97
9	32	59	81	66	82	48	25	58	99	123
10	72	101	87	85	121	107	88	67	64	118
11	35	5	37	96	50	116	31	119	17	75
12	47	43	115	89	49	7				

www.rcin.org.pl

Простое число 131. Первообразные корни: 2, 6, 8, 10, 14, 17, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 37, 40, 50, 54, 56, 57, 66, 67, 72, 76, 82, 83, 85, 87, 88, 90, 93, 95, 96, 97, 98, 103, 104, 106, 110, 111, 115, 116, 118, 119, 120, 122, 124, 126, 127, 128. *Основаніе 10.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	83	126	36	48	79	38	119	122
1	1	98	32	64	121	44	72	59	75	45
2	84	34	51	89	115	96	17	118	74	73
3	127	67	25	94	12	86	28	23	128	60
4	37	58	117	22	4	40	42	5	68	76
5	49	55	100	78	71	16	27	41	26	46
6	80	104	20	30	108	112	47	43	95	85
7	39	15	111	91	106	92	81	6	13	35
8	120	114	11	3	70	107	105	69	87	52
9	123	102	125	63	88	93	21	77	29	90
10	2	62	8	9	53	82	31	50	24	116
11	99	19	110	10	124	7	109	56	129	97
12	33	66	57	54	103	14	113	101	61	18
13	65									

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	10	100	83	44	47	77	115	102	103
1	113	82	31	78	125	71	55	26	129	111
2	62	96	43	37	108	32	58	56	36	98
3	63	106	12	120	21	76	4	40	7	70
4	45	57	46	67	15	19	59	66	5	50
5	107	22	89	104	123	51	117	122	41	17
6	39	128	101	93	13	130	121	31	48	87
7	81	54	16	29	28	18	49	97	53	6
8	60	76	105	2	20	69	35	88	94	23
9	99	73	75	95	33	68	25	119	11	110
10	52	127	91	124	61	86	74	85	64	116
11	112	72	65	126	81	24	109	42	27	8
12	80	14	9	90	114	92	3	30	38	118

Простое число 137. Первообразные корни: 3, 5, 6, 12, 13, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 62, 66, 67, 70, 71, 75, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 102, 104, 106, 108, 110, 111, 113, 114, 116, 117, 124, 125, 131, 132, 134 *Основаніе 12.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	130	13	124	23	7	2	118	26
1	17	90	1	53	132	36	112	86	20	54
2	11	15	84	129	131	46	47	39	126	95
3	30	133	106	103	80	25	14	102	48	66
4	5	51	9	37	78	49	123	111	125	4
5	40	99	41	71	33	113	120	67	89	128
6	24	110	127	28	100	76	97	87	74	6
7	19	29	8	32	96	59	42	92	60	21
8	135	52	45	101	3	109	31	108	72	57
9	43	55	117	10	105	77	119	73	134	116
10	34	82	93	12	35	38	65	98	27	58
11	107	115	114	63	61	16	83	79	122	88
12	18	44	104	64	121	69	22	85	94	50
13	70	75	91	56	81	62	68			

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	12	7	84	49	40	69	6	72	42
1	93	20	103	3	36	21	115	10	120	70
2	18	79	126	5	60	35	9	108	63	71
3	30	86	73	54	100	104	15	43	105	27
4	50	52	76	90	121	82	25	26	38	45
5	129	41	81	13	19	91	133	89	109	75
6	78	114	135	113	123	106	39	57	136	125
7	130	53	88	97	68	131	65	95	44	117
8	34	134	101	116	22	127	17	67	119	58
9	11	132	77	102	128	29	74	66	107	51
10	64	83	37	33	122	94	32	110	88	85
11	61	47	16	55	112	111	99	92	8	96
12	56	124	118	46	4	48	28	62	59	23
13	2	24	14	31	98	80				

www.rcin.org.pl

Простое число 139. Первообразные корни: 2, 3, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 32, 40, 50, 53, 56, 58, 61, 68, 70, 72, 73, 85, 88, 90, 92, 93, 98, 101, 102, 104, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 119, 123, 126, 128, 130, 132, 134, 135. *Основаніе 92.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	119	49	100	22	30	16	81	98
1	3	74	11	26	135	71	62	37	79	83
2	122	65	55	39	130	44	7	9	116	8
3	52	40	43	123	18	38	60	136	64	75
4	103	82	46	23	36	120	20	70	111	32
5	25	86	126	73	128	96	97	132	127	15
6	33	125	21	114	24	48	104	110	137	88
7	19	68	41	35	117	93	45	90	56	102
8	84	58	63	28	27	59	4	57	17	94
9	101	42	1	89	51	105	92	115	13	34
10	6	133	67	129	107	87	54	112	109	121
11	77	47	78	76	113	61	108	124	134	53
12	14	10	106	131	2	66	95	80	5	72
13	29	12	85	99	91	31	118	50	69	

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1	92	124	10	86	128	100	26	29	27
1	121	12	131	98	120	59	7	88	34	70
2	46	62	5	43	64	50	13	84	83	130
3	6	135	49	60	99	73	44	17	35	23
4	31	72	91	32	25	76	42	111	65	3
5	137	94	30	119	106	22	78	87	81	85
6	36	115	16	82	38	21	125	102	71	138
7	47	15	129	53	11	39	113	110	112	18
8	127	8	41	19	80	132	51	105	69	93
9	77	134	96	75	89	126	55	56	9	133
10	4	90	79	40	66	95	122	104	116	108
11	67	48	107	114	63	97	28	74	136	2
12	45	109	20	33	117	61	52	58	54	103
13	24	123	47	101	118	14	37	68		

Простое число 149. Первообразные корни: 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 23, 27, 32, 34, 38, 40, 41, 43, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 65, 66, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 101, 106, 108, 109, 111, 115, 117, 122, 126, 128, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 146, 147. *Основаніе 10.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	117	115	86	32	84	38	55	82
1	1	25	53	133	7	147	24	4	51	60
2	118	5	142	15	22	64	102	49	124	128
3	116	52	141	140	121	70	20	136	29	100
4	87	61	122	77	111	114	132	14	139	76
5	33	119	71	34	18	57	93	27	97	9
6	85	6	21	120	110	17	109	104	90	130
7	39	143	137	72	105	31	146	63	69	113
8	56	16	30	35	91	36	46	95	80	11
9	83	23	101	19	131	92	108	145	45	107
10	2	65	88	58	40	37	3	48	135	13
11	26	103	62	94	144	47	66	67	126	42
12	54	50	123	28	138	96	89	68	79	44
13	134	125	78	98	73	81	59	127	99	75
14	8	129	112	10	106	12	41	43	74	

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1	10	100	106	17	21	61	14	140	59
1	143	89	145	109	47	23	81	65	54	93
2	36	62	24	91	16	11	110	57	123	38
3	82	75	5	50	53	83	85	105	7	70
4	104	146	119	147	129	98	86	115	107	27
5	121	18	31	12	120	8	80	55	103	136
6	19	41	112	77	25	101	116	117	127	78
7	35	52	73	134	148	139	49	43	132	128
8	88	135	9	90	6	60	4	40	102	126
9	68	84	95	56	113	87	125	58	133	138
10	39	92	26	111	67	74	144	99	96	66
11	64	44	142	79	45	3	30	2	20	51
12	63	34	42	122	28	131	118	137	29	141
13	69	94	46	13	130	108	37	72	124	48
14	33	32	22	71	114	97	76	15		

www.rcin.org.pl

Простое число 151. Первообразные корни: 6, 7, 12, 13, 14, 15, 30, 35, 48, 51, 52, 54, 56, 61, 63, 71, 77, 82, 89, 93, 96, 102, 104, 106, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 117, 120, 126, 129, 130, 133, 134, 140, 141, 146. *Основаніе 114.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	70	141	140	82	61	37	60	132
1	2	34	121	101	107	73	130	88	52	90
2	72	28	104	115	51	14	21	123	27	54
3	143	58	50	25	8	119	122	76	10	92
4	142	111	98	38	24	64	35	86	121	74
5	84	79	91	69	43	116	97	81	124	30
6	63	59	128	19	120	33	95	93	78	106
7	39	137	42	87	146	5	80	71	12	117
8	62	114	31	3	18	20	108	45	94	53
9	134	138	105	49	6	22	41	118	144	16
10	4	9	149	46	11	110	139	99	113	23
11	36	67	17	85	1	47	44	83	100	125
12	133	68	129	102	48	96	89	126	40	29
13	103	147	15	127	13	55	148	32	26	56
14	109	77	47	135	112	136	7	65	66	145
15	75									

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	114	10	83	100	75	94	146	34	101
1	38	104	78	134	25	132	99	112	84	63
2	85	26	95	109	44	33	138	28	21	129
3	59	82	137	65	11	46	110	7	43	70
4	128	96	72	54	116	87	103	115	124	93
5	32	24	18	89	29	135	139	142	31	61
6	8	6	80	60	45	147	148	111	121	53
7	2	77	20	15	49	150	37	141	68	51
8	76	57	5	117	50	113	47	73	17	126
9	19	52	39	67	88	66	125	56	42	107
10	118	13	123	130	22	92	69	14	86	140
11	105	41	144	108	81	23	55	79	97	35
12	64	48	36	27	58	119	127	133	62	122
13	16	12	9	120	90	143	145	71	81	106
14	4	3	40	30	98	149	74	131	136	102

Простое число 157. Первообразные корни: 5, 6, 15, 18, 20, 21, 24, 26, 34, 38, 43, 53, 55, 60, 61, 62, 63, 66, 69, 70, 72, 73, 74, 77, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 91, 94, 95, 96, 97, 102, 104, 114, 119, 123, 131, 133, 136, 137, 139, 142, 151, 152. *Основаніе 139.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	147	122	138	11	113	57	129	88
1	2	152	104	130	48	133	120	128	79	116
2	149	23	143	81	95	22	121	54	39	15
3	124	58	111	118	119	68	80	28	107	96
4	140	75	14	151	134	99	72	76	86	114
5	13	94	112	25	45	7	30	82	6	27
6	115	155	49	145	102	141	109	12	110	47
7	59	64	61	83	19	144	98	53	87	9
8	131	20	66	97	5	139	142	137	125	32
9	90	31	63	24	67	127	77	37	105	84
10	4	108	85	123	103	34	16	91	36	8
11	154	150	21	56	73	92	153	62	18	29
12	106	148	146	41	40	33	136	46	93	117
13	132	43	100	17	3	65	101	71	38	1
14	50	42	55	126	52	26	74	80	10	51
15	135	35	89	60	44	69	78			

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	139	10	134	100	84	58	55	109	79
1	148	5	67	50	42	29	106	133	118	74
2	81	112	25	21	93	53	145	59	37	119
3	56	91	89	125	105	151	108	97	138	28
4	124	123	141	131	154	54	127	69	14	62
5	140	149	144	77	27	142	113	7	31	70
6	153	72	117	92	71	135	82	94	35	155
7	36	137	46	114	146	41	47	96	156	18
8	147	23	57	73	99	102	48	78	9	152
9	90	107	115	128	51	24	39	83	76	45
10	132	136	64	104	12	98	120	38	101	66
11	68	32	52	6	49	60	19	129	33	34
12	16	26	3	103	30	88	143	95	17	8
13	13	80	130	15	44	150	126	87	4	85
14	40	65	86	22	75	63	122	2	121	20
15	111	43	11	116	110	61				

www.rcin.org.pl

Простое число 163. Первообразные корни: 2, 3, 7, 11, 12, 18, 19, 20, 29, 32, 42, 44, 45, 50, 52, 63, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 75, 76, 79, 80, 82, 89, 92, 94, 101, 103, 106, 107, 108, 109, 112, 114, 116, 117, 120, 122, 124, 128, 129, 130, 137, 139, 147, 148, 149, 153, 154, 159. *Основаніе 70.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	.	0	71	43	142	93	114	161	51	86
1	2	97	23	57	70	136	122	159	157	127
2	73	42	6	153	94	24	128	129	141	145
3	45	39	31	140	68	92	66	75	36	100
4	144	20	113	106	77	17	62	44	3	160
5	95	40	37	18	38	28	50	8	54	27
6	116	30	110	85	102	150	49	155	139	34
7	1	52	137	7	146	67	107	96	9	103
8	53	10	91	134	22	90	15	26	148	65
9	88	56	133	82	115	58	74	130	69	21
10	4	29	111	35	108	135	89	131	109	119
11	99	118	121	14	79	84	125	143	98	158
12	25	32	101	63	19	117	156	147	11	149
13	59	112	120	126	64	60	48	47	105	13
14	72	87	123	134	46	76	78	41	55	151
15	138	104	16	83	5	132	80	33	12	61
16	124	152	81							

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	70	10	48	100	154	22	73	57	78
1	81	128	158	139	113	86	152	45	53	124
2	41	99	84	12	25	120	87	59	55	101
3	61	32	121	157	69	103	38	52	54	31
4	51	147	21	3	47	30	144	137	136	66
5	56	8	71	80	58	148	91	13	95	130
6	135	159	46	123	134	89	36	75	34	98
7	14	2	140	20	96	37	145	44	146	114
8	156	162	93	153	115	63	9	141	90	106
9	85	82	35	5	24	50	77	11	118	110
10	39	122	64	79	151	138	43	76	104	108
11	62	102	131	42	6	94	60	125	111	109
12	132	112	16	142	160	116	133	19	26	27
13	97	107	155	92	83	105	15	72	150	68
14	33	28	4	117	40	29	74	127	88	129
15	65	149	161	23	143	67	126	18	119	17
16	49	7								

Простое число 167. Первообразные корни: 5, 10, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 30, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 55, 59, 60, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 82, 83, 86, 90, 91, 92, 95, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 113, 117, 118, 119, 120, 123, 125, 129, 131, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 148, 149, 151, 153, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165. *Основаніе 10.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	86	144	6	81	64	96	92	122
1	1	110	150	43	16	59	12	143	42	50
2	87	74	30	51	70	162	129	100	102	32
3	145	152	98	88	63	11	128	127	136	21
4	7	55	160	75	116	37	137	68	156	26
5	82	121	49	31	20	25	22	128	118	23
6	65	34	72	52	18	124	8	85	149	29
7	97	159	48	71	47	140	56	40	107	119
8	93	78	141	163	80	58	161	10	36	24
9	123	139	57	130	154	131	76	14	112	66
10	2	91	41	101	135	155	117	148	106	36
11	111	105	108	193	114	132	38	165	109	73
12	151	54	120	33	158	77	138	90	104	53
13	44	45	94	146	5	15	69	62	115	19
14	17	46	79	153	134	113	157	4	133	125
15	60	95	142	99	126	67	27	84	39	9
16	13	147	164	89	61	3	83			

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	10	100	165	147	134	4	40	66	159
1	87	35	16	160	97	135	14	140	64	139
2	54	39	56	59	89	55	49	156	57	69
3	22	53	29	123	61	109	88	45	116	158
4	77	102	18	13	130	131	141	74	72	52
5	19	23	63	129	121	41	76	92	85	15
6	150	164	137	34	6	60	99	155	47	136
7	24	73	62	119	21	43	96	125	81	142
8	84	5	50	166	157	67	2	20	33	163
9	127	101	8	80	132	151	7	70	32	153
10	27	103	28	113	128	111	108	78	112	118
11	11	110	98	145	114	138	44	106	58	79
12	122	51	9	90	65	149	154	37	36	26
13	93	95	115	148	144	104	38	46	126	91
14	75	82	152	17	3	30	133	61	107	68
15	12	120	31	143	94	105	48	146	124	71
16	42	86	21	83	162	117				

www.rcin.org.pl

Простое число 173. Первообразные корни: 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 30, 32, 39, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 53, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 79, 82, 86, 87, 91, 94, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 120, 123, 125, 127, 128, 129, 131, 134, 141, 143, 145, 146, 147, 153, 154, 155, 156, 161, 162, 165, 166, 168, 170, 171. *Основаніе 91.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	13	7	26	163	20	31	39	14
1	4	127	33	142	44	170	52	89	27	85
2	17	38	140	88	46	154	155	21	57	152
3	11	122	65	134	102	22	40	42	98	149
4	30	74	51	60	153	5	101	144	59	61
5	167	96	168	123	34	118	70	72	165	19
6	24	169	135	45	78	133	147	50	115	95
7	35	23	53	94	55	161	111	158	162	71
8	43	28	87	104	64	80	73	159	166	150
9	18	1	114	129	157	76	72	25	75	141
10	8	139	109	121	9	29	136	61	47	164
11	131	49	83	110	105	79	6	156	32	120
12	37	82	10	81	148	145	58	15	91	67
13	146	137	160	116	63	12	128	126	108	16
14	48	151	36	97	66	143	107	69	68	132
15	2	54	124	103	171	113	3	138	84	130
16	56	119	41	90	100	125	117	106	77	112
17	93	99	86							

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	91	150	156	10	45	116	3	100	104
1	122	30	135	2	9	127	139	20	90	59
2	6	27	35	71	60	97	4	18	81	105
3	40	7	118	12	54	70	142	120	21	8
4	36	162	37	80	14	63	24	108	140	111
5	67	42	16	72	151	74	160	28	126	48
6	43	107	49	134	84	32	144	129	148	147
7	56	79	96	86	41	98	95	168	64	115
8	85	123	121	112	158	19	172	82	23	17
9	163	128	57	170	73	69	51	143	38	171
10	164	46	34	153	83	114	167	146	138	102
11	113	76	169	155	92	68	133	166	55	161
12	119	103	31	53	152	165	137	11	136	93
13	159	110	149	65	33	62	106	131	157	101
14	22	99	13	145	47	125	130	66	124	39
15	89	141	29	44	25	26	117	94	77	87
16	132	75	78	5	109	58	88	50	52	61
17	15	154								

Простое число 179. Первообразные корни: 2, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 69, 71, 72, 73, 78, 79, 84, 86, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 122, 123, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 140, 143, 148, 150, 152, 154, 157, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 170, 174, 175, 176. *Основаніе 10.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	73	52	146	106	125	23	41	104
1	1	27	20	134	96	158	114	14	177	26
2	74	75	100	65	93	34	29	156	169	70
3	53	76	9	79	87	129	72	19	99	8
4	147	101	148	144	173	32	138	136	166	46
5	107	66	102	111	51	133	64	78	143	110
6	126	94	149	127	82	62	152	48	160	117
7	24	35	145	95	92	86	172	50	81	91
8	42	30	174	150	43	120	39	122	68	16
9	105	157	33	128	31	132	61	85	119	131
10	2	170	139	83	175	3	6	56	124	113
11	28	71	137	63	151	171	38	60	5	37
12	21	54	167	153	44	140	22	13	155	118
13	135	77	47	49	121	84	55	59	12	58
14	97	10	108	161	40	176	168	98	165	142
15	159	80	67	118	123	4	154	11	164	163
16	115	88	103	25	69	7	45	109	116	90
17	15	130	112	36	17	57	141	162	89	

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	10	100	105	155	118	106	165	39	32
1	141	157	138	127	17	170	89	174	129	37
2	12	120	126	7	70	163	19	11	110	26
3	81	94	45	92	25	71	173	119	116	86
4	144	8	80	84	124	166	49	132	67	133
5	77	54	3	30	121	136	107	175	139	137
6	117	96	65	113	56	23	51	152	88	164
7	29	111	36	2	20	21	31	131	57	33
8	151	78	64	103	135	97	75	34	161	178
9	169	79	74	24	61	73	14	140	147	38
10	22	41	52	162	9	90	5	50	142	167
11	59	53	172	109	16	160	168	69	153	98
12	85	134	87	154	108	6	60	63	93	35
13	171	99	95	55	13	130	47	112	46	102
14	125	176	149	58	43	72	4	40	42	62
15	83	114	66	123	156	128	27	91	15	150
16	68	143	177	159	158	148	48	122	146	28
17	101	115	76	44	82	104	145	18		

www.rcin.org.pl

Простое число 181. Первообразные корни: 2, 10, 18, 21, 23, 24, 28, 41, 47, 50, 53, 54, 57, 58, 63, 66, 69, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 90, 91, 96, 97, 98, 103, 104, 104, 105, 112, 115, 118, 123, 124, 127, 128, 131, 134, 140, 153, 157, 158, 160, 163, 171, 179. *Основаніе 10.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	133	68	86	48	21	15	39	136
1	1	146	154	32	148	116	165	55	89	135
2	134	83	99	29	107	96	172	24	101	84
3	69	27	115	34	8	63	42	38	88	100
4	87	59	36	140	52	4	162	109	60	30
5	49	123	118	121	157	14	54	23	37	108
6	22	65	160	151	78	80	167	66	141	97
7	16	57	175	20	171	164	41	161	53	166
8	40	92	12	73	169	103	93	152	5	25
9	137	47	115	95	62	3	13	79	163	192
10	2	130	79	143	71	131	74	81	110	85
11	147	106	7	51	156	77	170	168	61	70
12	155	112	18	127	113	144	104	67	31	28
13	33	139	120	150	19	72	94	142	50	126
14	149	177	10	178	128	132	153	98	124	35
15	117	159	174	11	114	75	6	17	119	9
16	173	44	45	179	145	82	26	58	122	64
17	56	91	46	129	105	111	138	176	158	43
18	90									

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	10	100	95	45	88	156	112	34	159
1	142	153	82	96	55	7	70	157	122	134
2	73	6	60	57	27	89	166	31	129	23
3	49	128	13	130	33	149	42	58	37	8
4	80	76	36	179	161	162	172	91	5	50
5	138	113	44	78	56	17	170	71	167	41
6	48	118	94	35	169	61	67	127	3	30
7	119	104	135	83	106	155	102	115	94	97
8	65	107	165	21	29	109	4	40	38	18
9	180	171	81	86	136	93	25	69	147	22
10	39	28	99	85	126	174	111	24	59	47
11	108	175	121	124	154	92	15	150	52	158
12	132	53	168	51	148	32	139	123	144	173
13	101	105	145	2	20	19	9	90	176	131
14	43	68	137	103	125	164	11	110	14	140
15	133	63	87	146	12	120	114	54	178	151
16	62	77	46	98	75	26	79	66	117	84
17	116	74	16	160	152	72	177	141	143	163

Простое число 191. Первообразные корни: 19, 21, 22, 28, 29, 33, 35, 42, 44, 47, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 71, 73, 74, 76, 83, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 99, 101, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 123, 124, 126, 127, 131, 132, 137, 140, 141, 143, 145, 146, 148, 151, 157, 164, 165, 167, 168, 171, 173, 174, 176, 178, 179, 181, 182, 183, 187, 188, 189. *Основаніе 157.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	102	148	14	90	60	133	116	106
1	2	115	162	156	45	48	28	184	18	93
2	104	91	27	112	74	180	68	64	147	29
3	150	125	130	73	96	33	120	65	5	114
4	16	145	3	174	129	6	24	39	176	76
5	92	142	170	77	166	15	59	51	131	182
6	62	63	37	49	42	56	175	44	8	70
7	135	69	32	189	167	138	107	58	26	66
8	118	22	57	173	105	84	86	177	41	149
9	108	99	126	83	141	183	88	46	178	31
10	4	13	54	136	82	181	179	10	78	152
11	117	23	161	121	153	12	43	72	94	127
12	164	40	165	103	139	80	151	137	144	132
13	158	157	87	36	146	154	110	71	172	75
14	47	187	171	81	134	119	101	34	79	98
15	50	111	19	100	160	25	128	1	168	35
16	30	55	124	52	159	163	85	169	17	122
17	186	9	188	113	89	123	143	140	61	67
18	20	97	11	21	38	155	185	109	53	7
19	95									

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0	157	10	42	100	38	45	189	68	171
1	107	182	115	101	4	55	40	168	18	152
2	180	183	81	111	46	155	78	22	16	29
3	160	99	72	35	147	159	133	62	184	47
4	121	88	64	116	67	14	97	140	15	63
5	150	57	163	188	102	161	65	82	77	56
6	6	178	60	61	27	37	79	179	26	71
7	69	137	117	33	24	139	49	53	108	148
8	125	143	104	93	85	166	86	132	96	174
9	5	21	50	19	118	190	34	181	149	91
10	153	146	2	123	20	84	9	76	90	187
11	136	151	23	173	39	11	8	110	80	145
12	36	113	169	175	162	31	92	119	156	44
13	32	58	129	7	144	70	103	127	75	124
14	177	94	51	176	128	41	134	28	3	89
15	30	126	109	114	135	185	13	131	130	164
16	154	112	12	165	120	122	54	74	158	167
17	52	142	138	83	43	66	48	87	98	106
18	25	105	59	95	17	186	170	141	172	73

www.rcin.org.pl

Простое число 193. Первообразные корни: 5, 10, 15, 17, 19, 22, 26, 30, 34, 37, 38, 40, 41, 444, 45, 47, 51, 52, 53, 57, 58, 61, 66, 70, 73, 77, 78, 79, 80, 82, 90, 91, 102, 103, 111, 113, 114, 115, 1116, 120, 123, 127, 132, 135, 136, 140, 141, 142, 146, 148, 149, 152, 153, 155, 156, 159, 163, 167, 171, 174, 176, 178, 183, 188. *Основаніе 10.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	182	156	172	11	146	184	162	120
1	1	93	136	15	174	167	152	149	110	59
2	183	148	83	54	126	22	5	84	164	9
3	157	134	142	57	139	3	100	55	49	171
4	173	125	138	72	73	131	44	127	116	176
5	12	113	187	79	74	104	154	23	191	92
6	147	133	124	112	132	26	47	6	129	18
7	185	27	90	41	45	178	39	85	161	109
8	163	48	115	190	128	160	62	165	63	81
9	121	7	34	98	117	70	106	10	166	21
10	2	130	103	25	177	159	69	158	64	32
11	94	19	144	67	13	65	181	135	82	141
12	137	186	123	89	114	33	102	143	122	36
13	16	28	37	51	188	95	119	58	8	170
14	175	91	17	108	80	20	31	140	35	169
15	168	42	29	77	75	145	151	4	99	43
16	153	46	38	61	105	68	180	101	118	30
17	150	179	52	87	155	14	53	56	71	78
18	111	40	189	97	24	66	88	50	107	76
19	60	86	96							

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	10	100	35	157	26	67	91	138	29
1	97	5	50	114	175	13	130	142	69	111
2	145	99	25	57	184	103	65	71	131	152
3	169	146	109	125	92	148	129	132	162	76
4	181	73	151	159	46	74	161	66	81	38
5	187	133	172	176	23	37	177	33	137	19
6	190	163	86	88	108	115	185	113	165	106
7	95	178	43	44	54	54	189	153	179	53
8	144	89	118	22	27	77	191	173	186	123
9	72	141	59	11	110	135	192	183	93	158
10	36	167	126	102	55	164	96	188	143	79
11	18	180	63	51	124	82	48	94	168	136
12	9	90	128	122	62	41	24	47	84	68
13	101	45	64	61	31	117	12	120	42	34
14	147	119	32	127	112	155	6	60	21	17
15	170	156	16	160	56	174	3	30	107	105
16	85	78	8	80	28	87	98	15	150	149
17	139	39	4	40	14	140	49	104	75	171
18	166	116	2	20	7	70	121	52	134	182
19	83	58								

Простое число 197. Первообразные корни: 2, 3, 5, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 27, 30, 31, 32, 3 35, 38, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 56, 57, 58, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 82, 86, 89, 91, 94, 9 95, 98, 99, 102, 103, 106, 108, 111, 115, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 130, 131, 139, 140, 1 141, 145, 147, 149, 151, 152, 153, 159, 162, 165, 166, 167, 170, 176, 179, 180, 184, 185, 186, 189, 192, 194, 195. *Основаніе 73.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	61	65	122	137	126	86	183	130
1	2	5	187	153	147	6	48	95	191	182
2	63	151	66	68	52	78	18	195	12	40
3	67	173	109	70	156	27	56	148	47	22
4	124	46	16	54	127	71	129	106	113	172
5	139	160	79	80	60	142	73	51	101	96
6	128	180	38	20	170	94	131	57	21	133
7	88	179	117	1	13	143	108	91	83	59
8	185	64	107	14	77	36	115	105	188	23
9	132	43	190	42	167	123	174	102	37	135
10	4	76	25	69	140	92	141	34	121	90
11	7	17	134	175	112	9	162	87	157	181
12	189	10	45	111	99	19	81	186	35	119
13	155	33	192	72	118	136	82	30	194	3
14	149	171	44	158	178	177	62	41	74	15
15	8	31	169	29	152	114	144	26	120	145
16	50	154	125	58	168	11	75	165	138	110
17	97	116	176	150	166	164	53	161	84	93
18	193	146	104	49	55	89	103	100	32	85
19	184	28	39	24	163	159	98			

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	73	10	139	100	11	15	110	150	115
1	121	165	28	74	83	149	42	111	26	125
2	63	68	39	89	193	102	157	35	191	153
3	137	151	188	131	107	128	85	98	62	192
4	29	147	93	91	142	122	41	38	16	183
5	160	57	24	176	43	184	36	67	163	79
6	54	2	146	20	81	3	22	30	23	103
7	33	45	133	56	148	166	101	84	25	52
8	53	126	136	78	176	189	7	117	70	185
9	109	77	105	179	65	17	59	170	196	124
10	187	58	97	186	182	87	47	82	76	32
11	169	123	114	48	155	86	171	72	134	129
12	158	108	4	95	40	162	6	44	60	46
13	9	66	90	69	112	99	135	5	168	50
14	104	106	55	75	156	159	181	14	37	140
15	173	21	154	13	161	130	34	118	143	195
16	51	177	116	194	175	167	174	94	164	152
17	64	141	49	31	96	113	172	145	144	71
18	61	119	19	8	190	80	127	12	88	120
19	92	18	132	180	138	27				

www.rcin.org.pl

Простое число 199. Первообразные корни: 3, 6, 15, 22, 30, 34, 38, 39, 41, 44, 48, 54, 68, 69, 71, 73, 75, 77, 84, 87, 95, 97, 99, 105, 108, 110, 113, 118, 119, 120, 127, 129, 133, 134, 142, 143, 146, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 163, 164, 166, 167, 168, 170, 173, 176, 179, 183, 185, 186, 189, 190, 192, 195, 197. *Основаніе 127.*

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	194	155	190	6	151	32	186	112
1	2	89	147	128	28	161	182	57	108	11
2	196	187	185	74	143	12	124	69	24	158
3	157	76	178	146	53	38	104	121	7	85
4	192	145	183	176	181	118	70	98	139	64
5	8	14	120	136	65	195	10	166	154	129
6	153	126	72	144	174	134	142	39	49	31
7	34	71	100	41	117	167	3	23	81	50
8	188	26	141	51	179	63	172	115	177	92
9	114	160	66	33	94	17	135	109	60	103
10	4	159	10	36	116	193	132	165	61	15
11	191	78	16	73	162	80	150	42	125	89
12	149	180	122	102	68	18	140	1	170	133
13	130	148	138	43	35	75	45	171	27	54
14	30	55	67	119	96	164	37	21	113	107
15	163	40	197	169	19	82	77	84	46	93
16	184	106	22	5	137	152	47	79	175	58
17	59	123	168	25	111	44	173	86	88	97
18	110	9	156	83	62	127	29	48	90	101
19	13	87	131	52	105	91	56	95	99	

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	127	10	76	100	163	5	38	50	181
1	102	19	25	190	51	109	112	95	125	154
2	56	147	162	77	28	173	81	138	14	186
3	140	69	12	93	70	134	103	146	35	67
4	151	73	117	133	175	136	158	166	187	68
5	79	83	193	34	139	141	196	17	169	170
6	98	108	184	85	49	54	92	142	124	27
7	46	71	62	113	23	135	31	156	111	167
8	115	78	155	183	157	39	177	191	178	119
9	188	195	89	159	94	197	144	179	47	198
10	72	189	123	99	36	194	161	149	18	97
11	180	174	9	148	90	87	104	74	45	143
12	52	37	122	171	26	118	61	185	13	59
13	130	192	106	129	65	96	53	164	132	48
14	126	82	66	24	63	41	33	12	131	120
15	116	6	165	60	58	3	182	30	29	101
16	91	15	114	150	145	107	57	75	172	153
17	128	137	86	176	64	168	43	88	32	84
18	121	44	16	42	160	22	8	21	80	11
19	4	110	40	105	2	55	20	152		

www.rcin.org.pl

ЛИНЕЙНЫЕ ДѢЛИТЕЛИ

КВАДРАТИЧНОЙ ФОРМЫ $x^2 + ay^2$ ДЛЯ ВСѢХЪ ВЕЛИЧИНЪ a ОТЪ 1 ДО 101.

$x^2 + y^2$;	$4z + 1$.
$x^2 + 2y^2$;	$8z + 1, 3$.
$x^2 + 3y^2$;	$12z + 1, 7$.
$x^2 + 5y^2$;	$20z + 1, 3, 7, 9$.
$x^2 + 6y^2$;	$24z + 1, 5, 7, 11$.
$x^2 + 7y^2$;	$28z + 1, 9, 11, 15, 23, 25$.
$x^2 + 10y^2$;	$40z + 1, 7, 9, 11, 13, 19, 23, 37$.
$x^2 + 11y^2$;	$44z + 1, 3, 5, 9, 15, 23, 25, 27, 31, 37$.
$x^2 + 13y^2$;	$52z + 1, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 25, 29, 31, 47, 49$.
$x^2 + 14y^2$;	$56z + 1, 3, 5, 9, 13, 15, 19, 23, 25, 27, 39, 45$.
$x^2 + 15y^2$;	$60z + 1, 17, 19, 23, 31, 47, 49, 53$.
$x^2 + 17y^2$;	$68z + 1, 3, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 39, 49, 53, 63$.
$x^2 + 19y^2$;	$76z + 1, 5, 7, 9, 11, 17, 23, 25, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 55, 61, 63, 73$.
$x^2 + 21y^2$;	$84z + 1, 5, 11, 17, 19, 23, 25, 31, 37, 41, 55, 71$.
$x^2 + 22y^2$;	$88z + 1, 9, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 35, 43, 47, 49, 51, 61, 71, 81, 83, 85$.
$x^2 + 23y^2$;	$92z + 1, 3, 9, 13, 25, 27, 29, 31, 35, 39, 41, 47, 49, 55, 59, 71, 73, 75, 77, 81, 85, 87$.
$x^2 + 26y^2$;	$104z + 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 21, 25, 27, 31, 35, 37, 43, 45, 47, 49, 51, 63, 71, 75, 81, 85, 93$.
$x^2 + 29y^2$;	$116z + 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 19, 25, 27, 31, 33, 39, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 65, 75, 79, 81, 93, 95, 99, 109$.
$x^2 + 30y^2$;	$120z + 1, 11, 13, 17, 23, 29, 31, 37, 43, 47, 49, 59, 67, 79, 101, 113$.
$x^2 + 31y^2$;	$124z + 1, 5, 7, 9, 19, 25, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 59, 63, 67, 69, 71, 81, 87, 95, 97, 101, 103, 107, 109, 111, 113, 121$.
$x^2 + 33y^2$;	$132z + 1, 7, 17, 19, 23, 25, 29, 37, 41, 43, 47, 49, 59, 65, 71, 79, 97, 101, 119, 127$.
$x^2 + 34y^2$;	$136z + 1, 5, 7, 9, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 49, 59, 61, 63, 67, 71, 79, 81, 83, 89, 95, 109, 115, 121, 123, 125, 133$.
$x^2 + 35y^2$;	$140z + 1, 3, 9, 11, 13, 17, 27, 29, 33, 39, 47, 51, 71, 73, 79, 81, 83, 87, 97, 99, 103, 109, 117, 121$.
$x^2 + 37y^2$;	$148z + 1, 9, 15, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 49, 51, 53, 55, 59, 65, 73, 77, 79, 81, 85, 87, 91, 101, 103, 119, 121, 131, 135, 137, 141, 143, 145$.
$x^2 + 38y^2$;	$152z + 1, 3, 7, 9, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 37, 39, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 63, 67, 69, 73, 75, 81, 87, 91, 107, 109, 111, 117, 119, 121, 137, 141, 147$.
$x^2 + 39y^2$;	$156z + 1, 5, 11, 25, 41, 43, 47, 49, 55, 59, 61, 71, 79, 83, 89, 103, 119, 121, 125, 127, 133, 137, 139, 149$.
$x^2 + 41y^2$;	$164z + 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 25, 27, 33, 35, 37, 45, 47, 49, 55, 57, 61, 63, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 95, 99, 105, 111, 113, 121, 125, 133, 135, 141, 147, 151$.

www.rcin.org.pl

$x^2 + 42y^2$; $168z + 1$, 13, 17, 23, 25, 29, 31, 41, 43, 53, 55, 59, 61, 67, 71, 83, 89, 95, 103, 121, 131, 149, 159, 163.

$x^2 + 43y^2$; $172z + 1$, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 31, 35, 41, 47, 49, 53, 57, 59, 67, 79, 81, 83, 87, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 109, 111, 117, 121, 127, 133, 135, 139, 143, 145, 153, 165, 167, 169.

$x^2 + 46y^2$; $184z + 1$, 5, 9, 11, 19, 21, 25, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 61, 67, 71, 73, 81, 83, 87, 91, 95, 99, 105, 107, 109, 119, 121, 125, 127, 149, 151, 155, 157, 169, 171, 177, 181.

$x^2 + 47y^2$; $188z + 1$, 3, 7, 9, 17, 21, 25, 27, 37, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 71, 75, 79, 81, 83, 89, 95, 97, 101, 103, 111, 115, 119, 121, 131, 143, 145, 147, 149, 153, 155, 167, 157, 159, 165, 169, 173, 175, 177, 183.

$x^2 + 51y^2$; $204z + 1$, 6, 11, 13, 19, 23, 25, 29, 41, 43, 49, 55, 65, 67, 71, 95, 103, 107, 113, 115, 121, 125, 127, 131, 143, 145, 151, 157, 167, 169, 173, 197.

$x^2 + 53x^2$; $212z + 1$, 3, 9, 13, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 49, 51, 55, 57, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 93, 97, 103, 105, 111, 113, 117, 121, 127, 139, 147, 149, 151, 153, 165, 167, 169, 171, 179, 191, 197, 201, 205, 207.

$x^2 + 55x^2$; $220z + 1$, 7, 9, 13, 17, 31, 43, 49, 57, 57, 59, 63, 69, 71, 73, 81, 83, 87, 89, 91, 107, 111, 117, 119, 123, 127, 141, 153, 159, 167, 169, 173, 179, 181, 183, 191, 193, 197, 199, 201, 217.

$x^2 + 57y^2$; $228z + 1$, 11, 23, 25, 29, 31, 35, 41, 47, 49, 53, 61, 65, 67, 73, 79, 83, 85, 89, 91, 103, 113, 119, 121, 127, 131, 151, 157, 169, 173, 185, 191, 211, 215, 221, 223.

$x^2 + 58y^2$; $232z + 1$, 9, 15, 21, 25, 31, 33, 35, 37, 39, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 77, 79, 81, 83, 85, 91, 95, 101, 107, 115, 119, 121, 123, 127, 129, 133, 135, 139, 143, 157, 159, 161, 169, 179, 187, 189, 191, 205, 209, 213, 215, 219, 221, 225, 227, 229.

$x^2 + 59y^2$; $236z + 1$, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 35, 41, 45, 49, 51, 53, 57, 63, 71, 75, 79, 81, 85, 87, 95, 105, 107, 119, 121, 123, 125, 127, 133, 135, 137, 139, 143, 145, 147, 153, 159, 163, 167, 169, 171, 175, 181, 189, 193, 197, 199, 203, 205, 213, 223, 225.

$x^2 + 61y^2$; $244z + 1$, 5, 7, 9, 11, 13, 23, 25, 31, 35, 41, 43, 45, 49, 51, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 71, 73, 77, 79, 81, 87, 91, 97, 99, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 125, 137, 139, 141, 143, 149, 151, 155, 159, 161, 169, 175, 191, 197, 205, 207, 211, 217, 223, 225, 227, 229, 241.

$x^2 + 62y^2$; $248z + 1$, 3, 7, 9, 11, 13, 21, 25, 27, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 53, 61, 63, 71, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 91, 95, 97, 99, 103, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 129, 139, 141, 143, 147, 159, 169, 175, 179, 181, 183, 189, 191, 193, 197, 203, 213, 225, 229, 231, 233, 243.

$x^2 + 65y^2$; $260z + 1$, 3, 9, 11, 19, 23, 27, 29, 31, 33, 37, 43, 49, 57, 59, 61, 69, 71, 73, 81, 87, 93, 97, 99, 101, 103, 107, 111, 119, 121, 127, 129, 137, 147, 151, 171, 177, 181, 183, 193, 197, 207, 209, 213, 219, 239, 243, 253.

$x^2 + 66y^2$; $264z + 1$, 5, 7, 13, 17, 23, 25, 35, 41, 47, 49, 53, 61, 65, 67, 77, 79, 83, 85, 91, 91, 107, 109, 115, 119, 125, 127, 131, 151, 161, 163, 169, 175, 191, 205, 221, 227, 233, 235, 245.

$x^2 + 67y^2$; $268z + 1$, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 33, 35, 37, 39, 47, 49, 55 59, 65, 71, 73, 77, 81, 83, 89, 91, 93, 103, 107, 121, 123, 127, 129, 131, 135, 139, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 163, 167, 169, 171, 173, 181, 183, 189, 193, 199, 205, 207, 211, 215, 217, 223, 225, 227, 237, 241, 255, 257, 261, 263, 265.

$x^2 + 69y^2$; $267z + 1$, 5, 7, 13, 17, 19, 25, 35, 43, 47, 49, 53, 59, 65, 67, 71, 73, 79, 85, 89, 91, 95, 103, 113, 119, 121, 125, 131, 133, 137, 149, 167, 169, 175, 179, 193, 199, 215, 221, 235, 239, 245, 247, 265.

$x^2 + 70y^2$; $280z + 1$, 9, 17, 19, 33, 37, 39, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 69, 71, 73, 79, 81, 87, 93, 97, 101, 103, 107, 121, 123, 131, 139, 143, 151, 153, 163, 167, 169, 171, 181, 191, 197, 223, 229, 233, 249, 251, 253, 257, 267, 269, 277.

www.rcin.org.pl

$x^2 + 71y^2$; $284z$ + 1, 3, 5, 9, 15, 19, 25, 27, 29, 37, 43, 45, 49, 57, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 95, 101, 103, 107, 109, 111, 119, 121, 125, 129, 131, 135, 143, 145, 147, 151, 157, 161, 167, 169, 171, 179, 185, 187, 191, 199, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 229, 231, 233, 237, 243, 245, 249, 251, 253, 261, 263, 267, 271, 273, 277.

$x^2 + 73y^2$; $292z$ + 1, 7, 9, 11, 15, 25, 31, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 115, 121, 131, 135, 137, 139, 145, 149, 151, 159, 163, 165, 167, 169, 173, 175, 179, 181, 191, 199, 201, 213, 217, 221, 225, 237, 239, 247, 257, 259, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 279, 287, 289.

$x^2 + 74y^2$; $296z$ + 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 41, 45, 49, 55, 61, 65, 67, 69, 79, 75, 79, 81, 87, 89, 93, 99, 103, 107, 109, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 133, 135, 137, 139, 143, 145, 147, 155, 165, 167, 169, 183, 191, 195, 199, 201, 205, 207, 211, 219, 225, 233, 237, 239, 243, 245, 249, 253, 261, 275, 277, 279, 289.

$x^2 + 77y^2$; $308z$ + 1, 3, 9, 13, 17, 25, 27, 31, 37, 39, 41, 43, 47, 51, 53, 59, 61, 73, 75, 79, 81, 93, 95, 101, 103, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 127, 129, 137, 141, 143, 145, 151, 153, 169, 173, 177, 183, 199, 211, 219, 221, 223, 225, 239, 241, 243, 251, 263, 279, 285, 289, 293, 297, 303.

$x^2 + 78y^2$; $312z$ + 1, 19, 25, 29, 35, 37, 41, 47, 49, 53, 55, 67, 71, 77, 79, 85, 89, 101, 103, 107, 109, 115, 119, 121, 127, 131, 137, 155, 161, 163, 167, 173, 179, 187, 199, 215, 217, 229, 239, 251, 253, 269, 281, 289, 295, 301, 305, 307.

$x^2 + 79y^2$; $316z$ + 1, 5, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 31, 45, 49, 51, 55, 65, 67, 73, 81, 83, 87, 89, 95, 97, 99, 101, 105, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 131, 141, 143, 151, 155, 159, 163, 167, 169, 171, 173, 177, 179, 181, 183, 189, 203, 207, 209, 213, 223, 225, 231, 239, 241, 245, 247, 253, 255, 257, 259, 263, 269, 273, 275, 277, 297, 281, 283, 287, 289, 301, 309, 313.

$x^2 + 82y^2$; $328z$ + 1, 7, 9, 13, 15, 25, 29, 33, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 69, 71, 73, 79, 81, 83, 85, 91, 93, 95, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 131, 135, 139, 149, 151, 155, 157, 163, 167, 169, 175, 181, 183, 185, 187, 191, 195, 199, 201, 203, 209, 225, 229, 231, 239, 231, 239, 241, 251, 253, 261, 263, 267, 283, 289, 291, 293, 297, 301, 305, 307, 309, 311, 317, 323, 325.

$x^2 + 83y^2$; 332 + 1, 3, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 41, 49, 51, 59, 61, 63, 65, 69, 75, 77, 81, 87, 93, 95, 99, 109, 111, 113, 119, 121, 123, 127, 131, 147, 151, 153, 161, 167, 169, 173, 175, 177, 183, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 203, 207, 215, 217, 225, 227, 229, 231, 235, 241, 243, 247, 253, 259, 261, 265, 275, 277, 279, 285, 287, 289, 293, 297, 313, 317, 319, 327.

$x^2 + 85y^2$; $340z$ + 1, 9, 11, 21, 31, 37, 39, 43, 47, 49, 57, 67, 69, 71, 73, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 97, 99, 101, 103, 113, 121, 123, 127, 131, 133, 139, 149, 159, 161, 169, 173, 177, 183, 189, 193, 197, 199, 203, 211, 223, 229, 231, 233, 247, 263, 277, 279, 281, 287, 299, 307, 311, 313, 317, 321, 327, 333, 337.

$x^2 + 86y^2$; $344z$ + 1, 3, 5, 9, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 41, 45, 47, 49, 51, 57, 61, 69, 75, 77, 79, 81, 85, 89, 91, 93, 95, 97, 103, 111, 115, 121, 123, 125, 127, 131, 135, 141, 143, 145, 147, 149, 153, 155, 157, 163, 167, 169, 171, 179, 183, 185, 193, 205, 207, 211, 225, 227, 231, 235, 237, 239, 243, 245, 255, 261, 271, 273, 277, 279, 281, 285, 289, 291, 305, 309, 311, 323, 331, 333, 337.

$x^2 + 87y^2$; $348z$ + 1, 7, 13, 17, 25, 41, 47, 49, 67, 77, 89, 91, 95, 101, 103, 109, 113, 115, 119, 121, 131, 137, 139, 143, 151, 155, 169, 175, 181, 185, 187, 191, 199, 215, 221, 223, 241, 251, 263, 265, 269, 275, 277, 283, 287, 289, 293, 295, 305, 311, 313, 317, 325, 329, 343.

$x^2 + 89y^2$; $363z$ + 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 35, 43, 45, 49, 51, 53, 57, 59, 63, 69, 73, 75, 81, 83, 85, 93, 95, 97, 103, 105, 109, 115, 119, 121, 125, 127, 129, 133, 135, 143, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 169, 171, 173, 175, 177, 189, 191, 207, 211, 215, 217, 219, 225, 233, 239, 243, 245, 249, 255, 257, 265, 269, 277, 279, 285, 289, 291, 295, 301, 309, 315, 317, 319, 323, 327, 343, 354.

$x^2 + 91y^2$; $364z$ + 1, 5, 7, 9, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 59, 73, 79, 81, 83, 89, 95, 97, 107, 111, 113, 121, 125, 127, 145, 155, 165, 167, 171, 179, 183, 187, 189, 191, 201, 205, 207, 211, 213, 215, 223, 225, 227, 229, 233, 235, 241, 255, 261, 263, 265, 271, 277, 279, 289, 293, 295, 303, 307, 309, 327, 347, 349, 353, 361.

$x^2 + 93y^2$; $372z$ + 1, 17, 25, 29, 35, 43, 47, 49, 53, 55, 59, 65, 71, 77, 79, 89, 91, 95, 97, 107, 109, 115, 121, 127, 131, 133, 137, 139, 143, 151, 157, 161, 169, 185, 191, 193, 199, 205, 209, 223, 227, 247, 253, 259, 269, 271, 287, 289, 299, 305, 311, 331, 335, 349, 353, 359, 361, 365, 367.

www.rcin.org.pl

$x^2 + 94y^2$; $376z + 1, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 25, 29, 35, 43, 45, 49, 55, 63, 65, 67, 69, 71, 77, 79, 81, 85, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 107, 109, 111, 117, 119, 121, 123, 125, 133, 139, 143, 145, 153, 159, 163, 169, 171, 175, 177, 179, 181, 183, 187, 191, 203, 209, 211, 215, 219, 221, 225, 227, 229, 239, 241, 245, 247, 249, 261, 263, 271, 275, 289, 293, 301, 303, 315, 317, 319, 323, 325, 335, 337, 339, 343, 345, 349, 353, 355, 361, 373.$

$x^2 + 95y^2$; $380z + 1, 3, 9, 11, 13, 27, 33, 37, 39, 49, 53, 61, 67, 81, 97, 99, 101, 103, 107, 111, 113, 117, 119, 121, 127, 131, 139, 143, 147, 149, 159, 161, 167, 169, 173, 183, 191, 193, 199, 201, 203, 217, 223, 227, 229, 239, 243, 251, 257, 271, 287, 289, 291, 293, 297, 301, 303, 307, 309, 311, 317, 321, 329, 333, 337, 339, 349, 351, 357, 359, 363, 373.$

$y^2 + 97y^2$; $388z + 1, 7, 9, 15, 19, 23, 25, 33, 39, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 121, 123, 127, 129, 131, 133, 135, 139, 141, 143, 145, 155, 161, 169, 171, 175, 179, 185, 187, 193, 197, 199, 205, 207, 211, 215, 221, 223, 225, 229, 231, 235, 237, 239, 241, 251, 263, 269, 271, 273, 285, 289, 293, 297, 309, 311, 313, 319, 331, 341, 343, 345, 347, 351, 353, 357, 359, 361, 367, 371, 375, 377, 383, 385.$

$x^2 + 101y^2$; $404z + 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 33, 35, 37, 39, 45, 49, 51, 55, 59, 63, 65, 67, 75, 77, 81, 83, 85, 91, 97, 99, 103, 105, 111, 117, 119, 121, 125, 127, 135, 137, 139, 143, 147, 151, 153, 157, 163, 165, 167, 169, 175, 177, 181, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 221, 225, 231, 233, 243, 245, 249, 255, 259, 263, 271, 273, 275, 287, 288, 291, 295, 297, 305, 313, 315, 321, 329, 331, 335, 343, 347, 351, 357, 361, 363, 373, 375, 381, 385.$

www.rcin.org.pl

ЛИНЕЙНЫЕ ДѢЛИТЕЛИ

КВАДРАТИЧНОЙ ФОРМЫ $x^2 - ay^2$ ДЛЯ ВСѢХЪ ВЕЛИЧИНЪ a ОТЪ 1 ДО 101.

$x^2 - 2y^2$; $8z \pm 1$, 7.

$x^2 - 3y^2$; $12z \pm 1$, 11.

$x^2 - 5y^2$; $20z \pm 1$, 9, 11, 19.

$x^2 - 6y^2$; $24z \pm 1$, 5, 19, 23.

$x^2 - 7y^2$; $28z \pm 1$, 3, 9, 19, 25, 27.

$x^2 - 10y^2$; $40z \pm 1$, 3, 9, 13, 27, 31, 37, 39.

$x^2 - 11y^2$; $44z \pm 1$, 5, 7, 9, 19, 25, 35, 37, 39, 43.

$x^2 - 13y^2$; $52z \pm 1$, 3, 9, 17, 23, 25, 27, 29, 35, 43, 49, 51.

$x^2 - 14y^2$; $56z \pm 1$, 5, 9, 11, 13, 25, 31, 43, 45, 47, 51, 55.

$x^2 - 15y^2$; $60z \pm 1$, 7, 11, 17, 43, 49, 53, 59.

$x^2 - 17y^2$; $68z \pm 1$, 9, 13, 15, 19, 21, 25, 33, 35, 43, 47, 49, 53, 55, 59, 67.

$x^2 - 19y^2$; $76z \pm 1$, 3, 5, 9, 15, 17, 25, 27, 31, 45, 49, 51, 59, 61, 67, 71, 73, 75.

$x^2 - 21y^2$; $84z \pm 1$, 5, 17, 25, 37, 41, 43, 47, 59, 67, 79, 83.

$x^2 - 22y^2$; $88z \pm 1$, 3, 7, 9, 13, 21, 25, 27, 29, 39, 49, 59, 61, 63, 67, 75, 79, 81, 85, 87.

$x^2 - 23y^2$; $92z \pm 1$, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 25, 29, 41, 43, 49, 51, 63, 67, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 91.

$x^2 - 26y^2$; $104z \pm 1$, 5, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 37, 45, 49, 55, 59, 67, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 99, 103.

$x^2 - 29y^2$; $116z \pm 1$, 5, 7, 9, 13, 23, 25, 33, 35, 45, 49, 51, 53, 57, 69, 63, 65, 67, 71, 81, 91, 93, 103, 107, 109, 111, 115.

$x^2 - 30y^2$; $120z \pm 1$, 7, 13, 17, 19, 29, 37, 49, 71, 83, 91, 101, 103, 107, 113, 119.

$x^2 - 31y^2$; $124z \pm 1$, 3, 5, 9, 11, 15, 23, 25, 27, 33, 41, 43, 45, 49, 55, 69, 75, 79, 81, 83, 91, 97, 99, 101, 109, 113, 115, 119, 121, 123.

$x^2 - 33y^2$; $132z \pm 1$, 17, 25, 29, 31, 35, 37, 41, 49, 65, 67, 83, 91, 95, 97, 101, 103, 107, 115, 131.

$x^2 - 34y^2$; $136z \pm 1$, 3, 5, 9, 11, 15, 25, 27, 29, 33, 37, 45, 47, 49, 55, 61, 75, 81, 87, 89, 91, 99, 103, 107, 109, 111, 117, 121, 125, 127, 131, 133, 135.

$x^2 - 35y^2$; $140z \pm 1$, 9, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 43, 59, 67, 73, 81, 97, 107, 109, 111, 117, 121, 123, 127, 131, 139.

$x^2 - 37y^2$; $148z \pm 1$, 3, 7, 9, 11, 21, 25, 27, 33, 41, 47, 49, 53, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 95, 99, 101, 107, 115, 121, 123, 127, 137, 139, 141, 145, 147.

$x^2 - 38y^2$; $152z \pm 1$, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 29, 31, 35, 37, 43, 49, 53, 69, 71, 73, 79, 81, 83, 99, 103, 109, 115, 117, 121, 123, 127, 129, 135, 137, 139, 141, 143, 151.

$x^2 - 39y^2$; $156z \pm 1$, 5, 7, 19, 23, 25, 31, 35, 41, 49, 61, 67, 89, 95, 107, 115, 121, 125, 131, 133, 137, 149, 151, 155.

www.rcin.org.pl

$x^2 - 41y^2$; $164z + 1$, 5, 9, 21, 23, 25, 31, 33, 37, 39, 43, 45, 49, 51, 57, 59, 61, 73, 77, 81, 83, 87, 91, 103, 105, 107, 113, 115, 119, 121, 125, 127, 131, 133, 139, 141, 143, 155, 159, 163.

$x^2 - 42y^2$; $168z + 1$, 11, 13, 17, 19, 25, 29, 41, 47, 53, 61, 79, 89, 107, 121, 127, 139, 143, 149, 151, 155, 157, 167.

$x^2 - 43y^2$; $172z + 1$, 3, 7, 9, 13, 17, 19, 21, 25, 27, 39, 41, 49, 51, 53, 55, 57, 63, 71, 75, 81, 91, 97, 101, 109, 115, 117, 119, 121, 123, 131, 133, 145, 147, 151, 153, 155, 159, 163, 165, 169, 171.

$x^2 - 46y^2$; $184z + 1$, 3, 5, 7, 9, 15, 21, 25, 27, 35, 37, 41, 45, 49, 53, 59, 61, 63, 73, 75, 79, 81, 103, 105, 109, 111, 121, 123, 125, 131, 135, 139, 143, 147, 149, 157, 159, 163, 169, 175, 177, 179, 181, 183.

$x^2 - 47y^2$; $188z + 1$, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 35, 37, 39, 43, 49, 53, 61, 65, 67, 81, 87, 89, 91, 97, 99, 101, 107, 121, 123, 127, 135, 139, 145, 149, 151, 153, 157, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 177, 179, 187.

$x^2 - 51y^2$; $204z + 1$, 5, 7, 13, 25, 29, 31, 35, 41, 47, 49, 59, 65, 79, 83, 91, 113, 121, 125, 139, 145, 155, 157, 163, 169, 173, 179, 191, 197, 199, 203.

$x^2 - 53y^2$; $212z + 1$, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 25, 29, 37, 43, 47, 49, 57, 59, 63, 69, 77, 81, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 105, 107, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 131, 135, 143, 149, 153, 155, 163, 165, 169, 175, 183, 187, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 211.

$x^2 - 55y^2$; $220z + 1$, 3, 9, 13, 17, 19, 23, 27, 39, 47, 49, 51, 57, 67, 69, 73, 79, 81, 89, 103, 117, 131, 139, 141, 147, 151, 153, 163, 169, 171, 173, 181, 193, 197, 201, 203, 207, 211, 217, 219.

$x^2 - 57y^2$; $228z + 1$, 7, 25, 29, 41, 43, 49, 53, 55, 59, 61, 65, 71, 73, 85, 89, 107, 113, 115, 121, 139, 143, 155, 157, 163, 167, 169, 173, 175, 179, 185, 187, 199, 203, 221, 227.

$x^2 - 58y^2$; $232z + 1$, 3, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 37, 43, 49, 57, 61, 63, 65, 69, 71, 75, 77, 81, 85, 99, 101, 103, 111, 121, 129, 131, 133, 147, 151, 155, 157, 161, 163, 167, 169, 171, 175, 183, 189, 195, 199, 205, 207, 209, 211, 213, 221, 223, 225, 229, 231.

$x^2 - 59y^2$; $236z + 1$, 5, 9, 11, 17, 21, 23, 25, 29, 31, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 67, 81, 83, 85, 91, 99, 103, 105, 111, 115, 121, 125, 131, 133, 137, 145, 151, 153, 155, 169, 179, 181, 183, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 205, 207, 211, 213, 215, 219, 225, 227, 231, 235.

$x^2 - 61y^2$; $244z + 1$, 3, 5, 9, 13, 15, 19, 25, 27, 39, 41, 45, 47, 49, 57, 65, 73, 75, 77, 81, 83, 95, 97, 103, 107, 109, 113, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 131, 135, 137, 141, 147, 149, 161, 163, 167, 169, 171, 179, 187, 195, 197, 199, 203, 205, 217, 219, 225, 229, 231, 235, 239, 241, 243.

$x^2 - 62y^2$; $248z + 1$, 9, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 33, 35, 37, 41, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 67, 77, 79, 81, 85, 97, 103, 113, 117, 119, 121, 127, 129, 131, 135, 145, 151, 163, 167, 169, 171, 181, 187, 189, 193, 195, 197, 199, 207, 211, 213, 215, 219, 223, 225, 227, 229, 233, 235, 239, 247.

$x^2 - 65y^2$; $260z + 1$, 7, 9, 29, 33, 37, 47, 49, 51, 57, 61, 63, 67, 69, 73, 79, 81, 83, 93, 97, 101, 121, 123, 129, 131, 137, 139, 159, 163, 167, 177, 179, 181, 187, 191, 193, 197, 199, 203, 209, 211, 213, 223, 227, 231, 251, 253, 259.

$x^2 - 66y^2$; $264z + 1$, 5, 13, 17, 19, 25, 31, 41, 43, 49, 53, 59, 61, 65, 85, 95, 97, 103, 109, 125, 139, 155, 161, 167, 169, 179, 199, 203, 205, 211, 215, 221, 223, 233, 239, 245, 247, 251, 259, 263.

$x^2 - 67y^2$; $268z + 1$, 3, 7, 9, 11, 17, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 43, 49, 51, 63, 65, 73, 75, 77, 79, 81, 87, 89, 93, 95, 99, 111, 115, 119, 121, 129, 139, 147, 149, 153, 157, 169, 173, 175, 179, 181, 187, 189, 191, 193, 195, 203, 205, 217, 219, 225, 231, 235, 237, 239, 241, 243, 247, 251, 257, 259, 261, 265, 267.

$x^2 - 69y^2$; $276z + 1$, 5, 11, 13, 17, 25, 31, 49, 53, 55, 65, 73, 83, 85, 89, 107, 113, 121, 125, 127, 133, 137, 139, 143, 149, 151, 155, 163, 169, 187, 191, 193, 203, 211, 221, 223, 227, 245, 251, 259, 263, 265, 271, 275.

www.rcin.org.pl

$x^2 - 70y^2 + 280z + 1$, 3, 9, 11, 17, 23, 27, 31, 33, 37, 51, 53, 61, 69, 73, 81, 83, 93, 97, 99, 101, 111, 121, 127, 153, 159, 179, 181, 183, 187, 197, 199, 207, 211, 219, 227, 229, 243, 247, 249, 253, 257, 263, 269, 271, 277, 279.

$x^2 - 71y^2 + 284z + 1$, 5, 7, 9, 11, 23, 25, 29, 31, 35, 37, 39, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 63, 67, 73, 77, 81, 89, 99, 101, 109, 115, 121, 123, 125, 125, 127, 129, 139, 145, 155, 157, 159, 161, 163, 169, 175, 183, 185, 195, 203, 207, 211, 217, 221, 225, 227, 229, 233, 235, 237, 239, 245, 247, 249, 253, 255, 259, 261, 273, 275, 277, 279, 283.

$x^2 - 73, 292z + 1$, 3, 9, 19, 23, 25, 27, 35, 37, 41, 49, 55, 57, 61, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 85, 89, 91, 97, 105, 109, 111, 119, 121, 123, 127, 137, 143, 145, 147, 149, 155, 165, 169, 171, 173, 181, 183, 187, 195, 201, 203, 207, 211, 213, 215, 217, 221, 223, 225, 227, 231, 235, 237, 243, 251, 255, 257, 265, 267, 269, 273, 283, 289, 291.

$x^2 - 74y^2; 296z + 1$, 5, 7, 9, 13, 19, 25, 29, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 81, 91, 93, 95, 109, 117, 121, 125, 127, 131, 133, 137, 145, 151, 159, 163, 165, 169, 171, 175, 179, 187, 201, 203, 205, 215, 223, 225, 227, 231, 233, 235, 237, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 261, 263, 267, 271, 277, 283, 287, 289, 291, 295.

$x^2 - 77y^2; 308z + 1$, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 37, 41, 53, 61, 67, 71, 73, 81, 83, 87, 93, 101, 113, 117, 129, 131, 135, 137, 139, 141, 145, 153, 155, 163, 167, 169, 171, 173, 177, 179, 191, 195, 207, 215, 221, 225, 227, 235, 237, 241, 247, 255, 267, 271, 283, 285, 285, 289, 293, 295, 299, 307.

$x^2 - 78y^2; 312z + 1$, 7, 11, 23, 25, 29, 31, 37, 41, 43, 49, 53, 59, 77, 83, 85, 89, 95, 101, 109, 121, 137, 139, 151, 161, 173, 175, 191, 203, 211, 217, 223, 227, 229, 235, 253, 259, 263, 269, 271, 275, 281, 283, 287, 289, 301, 305, 311.

$x^2 - 79y^2; 316z + 1$, 5, 7, 9, 13, 15, 21, 25, 27, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 59, 63, 65, 71, 73, 75, 81, 89, 91, 97, 101, 103, 105, 107, 117, 121, 125, 127, 129, 135, 139, 141, 147, 169, 175, 177, 181, 187, 189, 191, 195, 199, 209, 211, 213, 215, 219, 225, 227, 235, 241, 243, 245, 251, 253, 257, 267, 269, 271, 273, 277, 281, 289, 291, 295, 301, 303, 307, 309, 311, 313, 315.

$x^2 - 82y^2; 328z + 1$, 3, 9, 11, 13, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 49, 53, 57, 67, 69, 73, 75, 81, 85, 87, 93, 99, 101, 103, 105, 109, 113, 117, 119, 121, 143, 147, 149, 157, 159, 169, 171, 179, 181, 185, 201, 207, 209, 211, 215, 219, 223, 225, 227, 229, 235, 241, 243, 247, 253, 255, 259, 261, 271, 275, 279, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 309, 315, 317, 319, 325, 327.

$x^2 - 83y^2; 332z + 1$, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 55, 61, 65, 67, 69, 71, 77, 79, 81, 91, 93, 103, 107, 109, 113, 115, 121, 135, 139, 143, 153, 155, 159, 161, 163, 169, 171, 173, 177, 179, 189, 193, 197, 211, 217, 219, 223, 225, 229, 239, 241, 251, 253, 255, 261, 263, 265, 267, 271, 277, 283, 285, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 303, 307, 311, 313, 315, 317, 323, 331.

$x^2 - 85y^2; 340z + 1$, 3, 7, 9, 19, 21, 23, 27, 37, 49, 57, 59, 63, 69, 73, 81, 89, 97, 101, 107, 111, 113, 121, 133, 143, 147, 149, 151, 161, 163, 167, 169, 171, 173, 177, 179, 189, 191, 193, 197, 207, 219, 227, 229, 233, 239, 243, 251, 259, 267, 271, 277, 281, 283, 291, 303, 313, 317, 319, 321, 331, 333, 337, 339.

$x^2 - 86y^2; 344z + 1$, 5, 7, 9, 11, 17, 25, 29, 35, 37, 39, 41, 45, 49, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 77, 81, 83, 85, 93, 97, 99, 107, 119, 121, 125, 139, 141, 145, 149, 151, 153, 157, 159, 169, 175, 185, 187, 191, 193, 195, 199, 203, 205, 219, 223, 225, 237, 245, 247, 251, 259, 261, 263, 267, 273, 275, 277, 281, 283, 285, 287, 289, 295, 299, 303, 305, 307, 309, 315, 319, 327, 333, 335, 337, 339, 343.

$x^2 - 87y^2; 348z + 1$, 13, 17, 19, 23, 31, 35, 41, 43, 49, 55, 59, 71, 77, 79, 83, 89, 91, 101, 107, 109, 113, 121, 127, 137, 163, 167, 169, 179, 181, 185, 211, 227, 235, 239, 241, 247, 257, 259, 265, 269, 271, 277, 289, 293, 299, 305, 307, 313, 317, 325, 329, 331, 335, 347.

$x^2 - 89y^2; 356z + 1$, 5, 9, 11, 17, 21, 25, 39, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 69, 71, 73, 79, 81, 85, 87, 91, 93, 97, 99, 105, 107, 109, 111, 121, 123, 125, 129, 131, 133, 139, 153, 157, 161, 167, 169, 173, 177, 179, 183, 187, 189, 195, 199, 203, 217, 223, 225, 227, 231, 233, 235, 245, 247, 249, 251, 257, 259, 263, 265, 269, 271, 275, 277, 283, 285, 287, 289, 299, 301, 303, 307, 309, 311, 317, 331, 335, 339, 345, 347, 351, 355.

$x^2 - 91y^2; 364z + 1$, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 25, 27, 29, 41, 45, 53, 63, 67, 71, 75, 81, 87, 99, 103, 113, 115, 121, 123, 125, 131, 135, 139, 143, 145, 151, 159, 163, 165, 175, 189, 199, 201, 205, 213, 219, 221, 225, 229, 233, 239, 241, 243, 245, 249, 251, 261, 265, 277, 283, 289, 291, 293, 311, 319, 323, 331, 335, 337, 339, 347, 349, 353, 355, 359, 361, 363.

www.rcin.org.pl

$x^2 - 93y^2$: $372z + 1$, 7, 17, 19, 23, 25, 29, 49, 53, 65, 67, 77, 83, 89, 97, 103, 109, 119, 121, 133, 137, 157, 161, 163, 167, 169, 175, 179, 185, 186, 193, 197, 203, 205, 209, 211, 215, 235, 239, 251, 253, 263, 269, 275, 283, 289, 295, 305, 307, 319, 323, 343, 347, 349, 353, 355, 361, 365, 371.

$x^2 - 94y^2$: $376z + 1$, 3, 6, 9, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 31, 39, 45, 49, 51, 59, 65, 69, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 97, 109, 115, 117, 121, 125, 127, 131, 133, 135, 145, 147, 151, 153, 155, 167, 179, 187, 189, 191, 195, 199, 207, 209, 221, 223, 225, 229, 231, 241, 243, 245, 249, 251, 255, 259, 261, 267, 279, 283, 287, 289, 291, 293, 295, 299, 301, 307, 311, 317, 325, 327, 331, 337, 345, 347, 349, 351, 353, 359, 361, 363, 367, 371, 373, 375.

$x^2 - 95y^2$: $380z + 1$, 7, 9, 13, 23, 29, 31, 33, 37, 43, 47, 49, 51, 53, 59, 61, 63, 71, 79, 81, 83, 87, 91, 97, 101, 113, 117, 121, 123, 149, 151, 163, 169, 173, 179, 187, 193, 201, 207, 211, 217, 229, 231, 257, 259, 263, 267, 279, 283, 289, 293, 297, 299, 301, 309, 317, 319, 321, 327, 329, 331, 333, 337, 343, 347, 349, 351, 357, 367, 371, 373, 379.

$x^2 - 97y^2$: $388z + 1$, 3, 9, 11, 25, 27, 31, 33, 35, 43, 47, 49, 53, 61, 65, 73, 75, 79, 81, 85, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 109, 113, 115, 119, 121, 129, 133, 141, 145, 147, 151, 159, 161, 163, 167, 169, 183, 185, 191, 193, 195, 197, 203, 205, 219, 221, 225, 227, 229, 237, 241, 243, 247, 255, 259, 267, 269, 273, 275, 279, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 303, 307, 309, 313, 315, 323, 327, 335, 339, 341, 345, 353, 355, 357, 361, 363, 377, 379, 385, 387.

$x^2 - 101y^2$: $404z + 1$, 5, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 37, 43, 45, 47, 49, 65, 75, 77, 81, 83, 85, 91, 97, 99, 105, 107, 115, 117, 121, 123, 125, 131, 137, 153, 155, 157, 159, 165, 169, 171, 177, 179, 181, 183, 185, 189, 193, 197, 201, 203, 207, 211, 215, 219, 221, 223, 225, 227, 233, 235, 239, 245, 247, 249, 251, 267, 273, 279, 281, 283, 287, 289, 297, 299, 305, 307, 313, 319, 321, 323, 327, 329, 339, 355, 357, 359, 361, 367, 371, 373, 379, 381, 383, 385, 387, 391, 395, 399, 403.

GABINET MATEMATYCZNY
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

TOWARZYSTWO NAUKOWE WARSZAWSKIE

www.rcin.org.pl

www.rcin.org.pl

www.rcin.org.pl